

■急性上気道炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類(※) (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
1	1:急性上気道炎	~4Kg	S P Tロ-チ0. 2 5 m g「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
2	1:急性上気道炎	4~6Kg	S P Tロ-チ0. 2 5 m g「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
3	1:急性上気道炎	6~8Kg	S P Tロ-チ0. 2 5 m g「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
4	1:急性上気道炎	8~10Kg	S P Tロ-チ0. 2 5 m g「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
5	1:急性上気道炎	10~12Kg	S P Tロ-チ0. 2 5 m g「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
6	1:急性上気道炎	12~14Kg	S P Tロ-チ0. 2 5 m g「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
7	1:急性上気道炎	14~16Kg	S P Tロ-チ0. 2 5 m g「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
8	1:急性上気道炎	16~18Kg	S P Tロ-チ0. 2 5 m g「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
9	1:急性上気道炎	18~20Kg	S P Tロ-チ0. 2 5 m g「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
10	1:急性上気道炎	20~23Kg	S P Tロ-チ0. 2 5 m g「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
11	1:急性上気道炎	23~26Kg	S P Tロ-チ0. 2 5 m g「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
12	1:急性上気道炎	26~30Kg	S P Tロ-チ0. 2 5 m g「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
13	1:急性上気道炎	30~35Kg	S P Tロ-チ0. 2 5 m g「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
14	1:急性上気道炎	35~40Kg	S P Tロ-チ0. 2 5 m g「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
15	1:急性上気道炎	40Kg~	S P Tロ-チ0. 2 5 m g「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
16	1:急性上気道炎	~4Kg	アスベリンシロップ0. 5%	0.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
17	1:急性上気道炎	4~6Kg	アスベリンシロップ0. 5%	0.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
18	1:急性上気道炎	6~8Kg	アスベリンシロップ0. 5%	0.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
19	1:急性上気道炎	8~10Kg	アスベリンシロップ0. 5%	2.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
20	1:急性上気道炎	10~12Kg	アスベリンシロップ0. 5%	3.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
21	1:急性上気道炎	12~14Kg	アスベリンシロップ0. 5%	4.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
22	1:急性上気道炎	14~16Kg	アスベリンシロップ0. 5%	5.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
23	1:急性上気道炎	16~18Kg	アスベリンシロップ0. 5%	6.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
24	1:急性上気道炎	18~20Kg	アスベリンシロップ0. 5%	7.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
25	1:急性上気道炎	20~23Kg	アスベリンシロップ0. 5%	8.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
26	1:急性上気道炎	23~26Kg	アスベリンシロップ0. 5%	8.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
27	1:急性上気道炎	26~30Kg	アスベリンシロップ0. 5%	8.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
28	1:急性上気道炎	30~35Kg	アスベリンシロップ0. 5%	10.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
29	1:急性上気道炎	35~40Kg	アスベリンシロップ0. 5%	10.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
30	1:急性上気道炎	40Kg~	アスベリンシロップ0. 5%	12.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
31	1:急性上気道炎	~4Kg	アスベリン散1 0%	0.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
32	1:急性上気道炎	4~6Kg	アスベリン散1 0%	0.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
33	1:急性上気道炎	6~8Kg	アスベリン散1 0%	0.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
34	1:急性上気道炎	8~10Kg	アスベリン散1 0%	0.10000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
35	1:急性上気道炎	10~12Kg	アスベリン散1 0%	0.15000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
36	1:急性上気道炎	12~14Kg	アスベリン散1 0%	0.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
37	1:急性上気道炎	14~16Kg	アスベリン散1 0%	0.25000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
38	1:急性上気道炎	16~18Kg	アスベリン散1 0%	0.30000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
39	1:急性上気道炎	18~20Kg	アスベリン散1 0%	0.30000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
40	1:急性上気道炎	20~23Kg	アスベリン散1 0%	0.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
41	1:急性上気道炎	23~26Kg	アスベリン散1 0%	0.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
42	1:急性上気道炎	26~30Kg	アスベリン散1 0%	0.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
43	1:急性上気道炎	30~35Kg	アスベリン散1 0%	0.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5

■急性上気道炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類(※) (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
44	1:急性上気道炎	35~40Kg	アスベリン散 10%	0.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
45	1:急性上気道炎	40Kg~	アスベリン散 10%	0.60000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
46	1:急性上気道炎	0ヶ月	アスベリン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
47	1:急性上気道炎	2ヶ月	アスベリン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
48	1:急性上気道炎	5ヶ月	アスベリン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
49	1:急性上気道炎	8ヶ月	アスベリン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
50	1:急性上気道炎	1~2歳	アスベリン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
51	1:急性上気道炎	3歳	アスベリン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
52	1:急性上気道炎	4歳	アスベリン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
53	1:急性上気道炎	5歳	アスベリン錠 10 10mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
54	1:急性上気道炎	6歳	アスベリン錠 10 10mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
55	1:急性上気道炎	7歳	アスベリン錠 10 10mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
56	1:急性上気道炎	8歳	アスベリン錠 10 10mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
57	1:急性上気道炎	9歳	アスベリン錠 10 10mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
58	1:急性上気道炎	10歳	アスベリン錠 10 10mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
59	1:急性上気道炎	11歳	アスベリン錠 10 10mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
60	1:急性上気道炎	12歳以上	アスベリン錠 10 10mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
61	1:急性上気道炎	0ヶ月	アスベリン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
62	1:急性上気道炎	2ヶ月	アスベリン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
63	1:急性上気道炎	5ヶ月	アスベリン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
64	1:急性上気道炎	8ヶ月	アスベリン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
65	1:急性上気道炎	1~2歳	アスベリン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
66	1:急性上気道炎	3歳	アスベリン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
67	1:急性上気道炎	4歳	アスベリン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
68	1:急性上気道炎	5歳	アスベリン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
69	1:急性上気道炎	6歳	アスベリン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
70	1:急性上気道炎	7歳	アスベリン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
71	1:急性上気道炎	8歳	アスベリン錠 20 20mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
72	1:急性上気道炎	9歳	アスベリン錠 20 20mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
73	1:急性上気道炎	10歳	アスベリン錠 20 20mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
74	1:急性上気道炎	11歳	アスベリン錠 20 20mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
75	1:急性上気道炎	12歳以上	アスベリン錠 20 20mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
76	1:急性上気道炎	~4Kg	アンヒバ坐剤小児用 100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 39度以上、不機嫌が強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 使用
77	1:急性上気道炎	4~6Kg	アンヒバ坐剤小児用 100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 39度以上、不機嫌が強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 使用
78	1:急性上気道炎	6~8Kg	アンヒバ坐剤小児用 100mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 39度以上、不機嫌が強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回2/3個使用
79	1:急性上気道炎	8~10Kg	アンヒバ坐剤小児用 100mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
80	1:急性上気道炎	10~12Kg	アンヒバ坐剤小児用 100mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
81	1:急性上気道炎	12~14Kg	アンヒバ坐剤小児用 100mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
82	1:急性上気道炎	14~16Kg	アンヒバ坐剤小児用 100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
83	1:急性上気道炎	16~18Kg	アンヒバ坐剤小児用 100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
84	1:急性上気道炎	18~20Kg	アンヒバ坐剤小児用 100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
85	1:急性上気道炎	20~23Kg	アンヒバ坐剤小児用 100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
86	1:急性上気道炎	23~26Kg	アンヒバ坐剤小児用 100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用

■急性上気道炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容				
症状	処方分類(※) (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
173	1:急性上気道炎	16~18Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 発熱時または疼痛時、8時間以上あけて使用
174	1:急性上気道炎	18~20Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 発熱時または疼痛時、8時間以上あけて使用
175	1:急性上気道炎	20~23Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 発熱時または疼痛時、8時間以上あけて使用
176	1:急性上気道炎	23~26Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 発熱時または疼痛時、8時間以上あけて使用
177	1:急性上気道炎	26~30Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 発熱時または疼痛時、8時間以上あけて使用
178	1:急性上気道炎	30~35Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 発熱時または疼痛時、8時間以上あけて使用
179	1:急性上気道炎	35~40Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 発熱時または疼痛時、8時間以上あけて使用
180	1:急性上気道炎	40Kg~	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 発熱時または疼痛時、8時間以上あけて使用
181	1:急性上気道炎	~4Kg	コカールDS 4 0 % (カロナール)	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
182	1:急性上気道炎	4~6Kg	コカールDS 4 0 % (カロナール)	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
183	1:急性上気道炎	6~8Kg	コカールDS 4 0 % (カロナール)	0.20000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
184	1:急性上気道炎	8~10Kg	コカールDS 4 0 % (カロナール)	0.25000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
185	1:急性上気道炎	10~12Kg	コカールDS 4 0 % (カロナール)	0.30000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
186	1:急性上気道炎	12~14Kg	コカールDS 4 0 % (カロナール)	0.35000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
187	1:急性上気道炎	14~16Kg	コカールDS 4 0 % (カロナール)	0.40000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
188	1:急性上気道炎	16~18Kg	コカールDS 4 0 % (カロナール)	0.45000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
189	1:急性上気道炎	18~20Kg	コカールDS 4 0 % (カロナール)	0.50000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
190	1:急性上気道炎	20~23Kg	コカールDS 4 0 % (カロナール)	0.60000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
191	1:急性上気道炎	23~26Kg	コカールDS 4 0 % (カロナール)	0.65000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
192	1:急性上気道炎	26~30Kg	コカールDS 4 0 % (カロナール)	0.75000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
193	1:急性上気道炎	30~35Kg	コカールDS 4 0 % (カロナール)	0.90000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
194	1:急性上気道炎	35~40Kg	コカールDS 4 0 % (カロナール)	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
195	1:急性上気道炎	40Kg~	コカールDS 4 0 % (カロナール)	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
196	1:急性上気道炎	0ヶ月	ムコソルバン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
197	1:急性上気道炎	2ヶ月	ムコソルバン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
198	1:急性上気道炎	5ヶ月	ムコソルバン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
199	1:急性上気道炎	8ヶ月	ムコソルバン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
200	1:急性上気道炎	1~2歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
201	1:急性上気道炎	3歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
202	1:急性上気道炎	4歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
203	1:急性上気道炎	5歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
204	1:急性上気道炎	6歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
205	1:急性上気道炎	7歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
206	1:急性上気道炎	8歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
207	1:急性上気道炎	9歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
208	1:急性上気道炎	10歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
209	1:急性上気道炎	11歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
210	1:急性上気道炎	12歳以上	ムコソルバン錠 1 5 m g	3.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
211	1:急性上気道炎	~4Kg	ムコサインD S 5 0 %	0.20000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
212	1:急性上気道炎	4~6Kg	ムコサインD S 5 0 %	0.30000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
213	1:急性上気道炎	6~8Kg	ムコサインD S 5 0 %	0.40000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
214	1:急性上気道炎	8~10Kg	ムコサインD S 5 0 %	0.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
215	1:急性上気道炎	10~12Kg	ムコサインD S 5 0 %	0.60000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5

■急性上気道炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類(※) (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
216	1:急性上気道炎	12~14Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.70000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
217	1:急性上気道炎	14~16Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.80000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
218	1:急性上気道炎	16~18Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.90000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
219	1:急性上気道炎	18~20Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
220	1:急性上気道炎	20~23Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
221	1:急性上気道炎	23~26Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
222	1:急性上気道炎	26~30Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
223	1:急性上気道炎	30~35Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
224	1:急性上気道炎	35~40Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
225	1:急性上気道炎	40Kg~	ムコダインD S 5 0 %	1.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
226	1:急性上気道炎	~4Kg	ムコダインシロップ5%	2.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
227	1:急性上気道炎	4~6Kg	ムコダインシロップ5%	3.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
228	1:急性上気道炎	6~8Kg	ムコダインシロップ5%	4.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
229	1:急性上気道炎	8~10Kg	ムコダインシロップ5%	5.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
230	1:急性上気道炎	10~12Kg	ムコダインシロップ5%	6.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
231	1:急性上気道炎	12~14Kg	ムコダインシロップ5%	7.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
232	1:急性上気道炎	14~16Kg	ムコダインシロップ5%	8.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
233	1:急性上気道炎	16~18Kg	ムコダインシロップ5%	9.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
234	1:急性上気道炎	18~20Kg	ムコダインシロップ5%	10.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
235	1:急性上気道炎	20~23Kg	ムコダインシロップ5%	10.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
236	1:急性上気道炎	23~26Kg	ムコダインシロップ5%	12.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
237	1:急性上気道炎	26~30Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
238	1:急性上気道炎	30~35Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
239	1:急性上気道炎	35~40Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
240	1:急性上気道炎	40Kg~	ムコダインシロップ5%	15.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
241	1:急性上気道炎	0ヶ月	ムコダイン錠2.50mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
242	1:急性上気道炎	2ヶ月	ムコダイン錠2.50mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
243	1:急性上気道炎	5ヶ月	ムコダイン錠2.50mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
244	1:急性上気道炎	8ヶ月	ムコダイン錠2.50mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
245	1:急性上気道炎	1~2歳	ムコダイン錠2.50mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
246	1:急性上気道炎	3歳	ムコダイン錠2.50mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
247	1:急性上気道炎	4歳	ムコダイン錠2.50mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
248	1:急性上気道炎	5歳	ムコダイン錠2.50mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
249	1:急性上気道炎	6歳	ムコダイン錠2.50mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
250	1:急性上気道炎	7歳	ムコダイン錠2.50mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
251	1:急性上気道炎	8歳	ムコダイン錠2.50mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
252	1:急性上気道炎	9歳	ムコダイン錠2.50mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
253	1:急性上気道炎	10歳	ムコダイン錠2.50mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
254	1:急性上気道炎	11歳	ムコダイン錠2.50mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
255	1:急性上気道炎	12歳以上	ムコダイン錠2.50mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
256	1:急性上気道炎	~4Kg	ムコダイン錠5.00mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
257	1:急性上気道炎	4~6Kg	ムコダイン錠5.00mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
258	1:急性上気道炎	6~8Kg	ムコダイン錠5.00mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5

■急性上気道炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類(※) (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
259	1:急性上気道炎	8~10Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
260	1:急性上気道炎	10~12Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
261	1:急性上気道炎	12~14Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
262	1:急性上気道炎	14~16Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
263	1:急性上気道炎	16~18Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
264	1:急性上気道炎	18~20Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
265	1:急性上気道炎	20~23Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
266	1:急性上気道炎	23~26Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
267	1:急性上気道炎	26~30Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
268	1:急性上気道炎	30~35Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
269	1:急性上気道炎	35~40Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
270	1:急性上気道炎	40Kg~	ムコダイン錠 5 0 0 m g	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
271	1:急性上気道炎	0ヶ月	メジコン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
272	1:急性上気道炎	2ヶ月	メジコン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
273	1:急性上気道炎	5ヶ月	メジコン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
274	1:急性上気道炎	8ヶ月	メジコン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
275	1:急性上気道炎	1~2歳	メジコン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
276	1:急性上気道炎	3歳	メジコン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
277	1:急性上気道炎	4歳	メジコン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
278	1:急性上気道炎	5歳	メジコン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
279	1:急性上気道炎	6歳	メジコン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
280	1:急性上気道炎	7歳	メジコン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
281	1:急性上気道炎	8歳	メジコン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
282	1:急性上気道炎	9歳	メジコン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
283	1:急性上気道炎	10歳	メジコン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
284	1:急性上気道炎	11歳	メジコン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
285	1:急性上気道炎	12歳以上	メジコン錠 1 5 m g	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
286	1:急性上気道炎	~4Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.10000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
287	1:急性上気道炎	4~6Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.25000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
288	1:急性上気道炎	6~8Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.30000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
289	1:急性上気道炎	8~10Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.45000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
290	1:急性上気道炎	10~12Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
291	1:急性上気道炎	12~14Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.70000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
292	1:急性上気道炎	14~16Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
293	1:急性上気道炎	16~18Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.90000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
294	1:急性上気道炎	18~20Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	1.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
295	1:急性上気道炎	20~23Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
296	1:急性上気道炎	23~26Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
297	1:急性上気道炎	26~30Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	1.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
298	1:急性上気道炎	30~35Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	1.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
299	1:急性上気道炎	35~40Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	2.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
300	1:急性上気道炎	40Kg~	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	2.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
301	1:急性上気道炎	~4Kg	小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	0.50000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5

■急性上気道炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類（※） （年齢／体重）	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 ／回数	コメント
302	1:急性上気道炎	4~6Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	1.20000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
303	1:急性上気道炎	6~8Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	1.50000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
304	1:急性上気道炎	8~10Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	2.50000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
305	1:急性上気道炎	10~12Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	3.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
306	1:急性上気道炎	12~14Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	3.50000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
307	1:急性上気道炎	14~16Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	4.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
308	1:急性上気道炎	16~18Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	4.50000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
309	1:急性上気道炎	18~20Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	5.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
310	1:急性上気道炎	20~23Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	6.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
311	1:急性上気道炎	23~26Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	6.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
312	1:急性上気道炎	26~30Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	7.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
313	1:急性上気道炎	30~35Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	9.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
314	1:急性上気道炎	35~40Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	10.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
315	1:急性上気道炎	40Kg~	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	12.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5