

■急性咽頭炎／ヘルパンギーナ選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
1	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	～4Kg	S P Tローチ0. 2 5 mg「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
2	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4～6Kg	S P Tローチ0. 2 5 mg「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
3	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6～8Kg	S P Tローチ0. 2 5 mg「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
4	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8～10Kg	S P Tローチ0. 2 5 mg「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
5	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10～12Kg	S P Tローチ0. 2 5 mg「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
6	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12～14Kg	S P Tローチ0. 2 5 mg「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
7	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	14～16Kg	S P Tローチ0. 2 5 mg「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
8	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	16～18Kg	S P Tローチ0. 2 5 mg「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
9	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	18～20Kg	S P Tローチ0. 2 5 mg「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
10	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	20～23Kg	S P Tローチ0. 2 5 mg「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
11	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	23～26Kg	S P Tローチ0. 2 5 mg「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
12	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	26～30Kg	S P Tローチ0. 2 5 mg「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
13	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	30～35Kg	S P Tローチ0. 2 5 mg「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
14	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	35～40Kg	S P Tローチ0. 2 5 mg「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
15	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	40Kg～	S P Tローチ0. 2 5 mg「明治」	15.00000	錠	3:外用	3: 1日3回	1
16	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	～4Kg	アスベリンシロップ0. 5%	0.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
17	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4～6Kg	アスベリンシロップ0. 5%	0.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
18	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6～8Kg	アスベリンシロップ0. 5%	0.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
19	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8～10Kg	アスベリンシロップ0. 5%	2.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
20	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10～12Kg	アスベリンシロップ0. 5%	3.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
21	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12～14Kg	アスベリンシロップ0. 5%	4.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
22	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	14～16Kg	アスベリンシロップ0. 5%	5.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
23	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	16～18Kg	アスベリンシロップ0. 5%	6.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
24	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	18～20Kg	アスベリンシロップ0. 5%	7.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
25	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	20～23Kg	アスベリンシロップ0. 5%	8.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
26	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	23～26Kg	アスベリンシロップ0. 5%	8.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
27	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	26～30Kg	アスベリンシロップ0. 5%	8.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
28	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	30～35Kg	アスベリンシロップ0. 5%	10.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
29	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	35～40Kg	アスベリンシロップ0. 5%	10.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
30	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	40Kg～	アスベリンシロップ0. 5%	12.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
31	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	～4Kg	アスベリン散1 0%	0.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
32	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4～6Kg	アスベリン散1 0%	0.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
33	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6～8Kg	アスベリン散1 0%	0.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
34	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8～10Kg	アスベリン散1 0%	0.10000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
35	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10～12Kg	アスベリン散1 0%	0.15000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
36	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12～14Kg	アスベリン散1 0%	0.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
37	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	14～16Kg	アスベリン散1 0%	0.25000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
38	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	16～18Kg	アスベリン散1 0%	0.30000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
39	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	18～20Kg	アスベリン散1 0%	0.35000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
40	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	20～23Kg	アスベリン散1 0%	0.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
41	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	23～26Kg	アスベリン散1 0%	0.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
42	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	26～30Kg	アスベリン散1 0%	0.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
43	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	30～35Kg	アスベリン散1 0%	0.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5

■急性咽頭炎／ヘルパンギーナ選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
44	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	35~40Kg	アスベリン散 1 0 %	0.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
45	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	40Kg~	アスベリン散 1 0 %	0.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
46	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	0ヶ月	アスベリン錠 1 0 1 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
47	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	2ヶ月	アスベリン錠 1 0 1 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
48	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	5ヶ月	アスベリン錠 1 0 1 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
49	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8ヶ月	アスベリン錠 1 0 1 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
50	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	1~2歳	アスベリン錠 1 0 1 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
51	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	3歳	アスベリン錠 1 0 1 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
52	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4歳	アスベリン錠 1 0 1 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
53	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	5歳	アスベリン錠 1 0 1 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
54	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6歳	アスベリン錠 1 0 1 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
55	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	7歳	アスベリン錠 1 0 1 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
56	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8歳	アスベリン錠 1 0 1 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
57	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	9歳	アスベリン錠 1 0 1 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
58	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10歳	アスベリン錠 1 0 1 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
59	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	11歳	アスベリン錠 1 0 1 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
60	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12歳~	アスベリン錠 1 0 1 0 mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
61	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	0ヶ月	アスベリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
62	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	2ヶ月	アスベリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
63	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	5ヶ月	アスベリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
64	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8ヶ月	アスベリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
65	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	1~2歳	アスベリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
66	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	3歳	アスベリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
67	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4歳	アスベリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
68	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	5歳	アスベリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
69	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6歳	アスベリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
70	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	7歳	アスベリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
71	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8歳	アスベリン錠 2 0 2 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
72	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	9歳	アスベリン錠 2 0 2 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
73	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10歳	アスベリン錠 2 0 2 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
74	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	11歳	アスベリン錠 2 0 2 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
75	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12歳~	アスベリン錠 2 0 2 0 mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
76	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	~4Kg	アンビバ坐剤小児用 1 0 0 mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 使用
77	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4~6Kg	アンビバ坐剤小児用 1 0 0 mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 使用
78	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6~8Kg	アンビバ坐剤小児用 1 0 0 mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	39度以上、不機嫌が強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回2/3個使用
79	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8~10Kg	アンビバ坐剤小児用 1 0 0 mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
80	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10~12Kg	アンビバ坐剤小児用 1 0 0 mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
81	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12~14Kg	アンビバ坐剤小児用 1 0 0 mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
82	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	14~16Kg	アンビバ坐剤小児用 1 0 0 mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
83	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	16~18Kg	アンビバ坐剤小児用 1 0 0 mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
84	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	18~20Kg	アンビバ坐剤小児用 1 0 0 mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
85	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	20~23Kg	アンビバ坐剤小児用 1 0 0 mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
86	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	23~26Kg	アンビバ坐剤小児用 1 0 0 mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用





■急性咽頭炎／ヘルパンギーナ選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	処方内容					
				薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
173	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	16~18Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 m g	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱または疼痛時、8時間以上あけて
174	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	18~20Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 m g	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱または疼痛時、8時間以上あけて
175	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	20~23Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 m g	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱または疼痛時、8時間以上あけて
176	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	23~26Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 m g	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱または疼痛時、8時間以上あけて
177	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	26~30Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 m g	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱または疼痛時、8時間以上あけて
178	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	30~35Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 m g	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱または疼痛時、8時間以上あけて
179	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	35~40Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 m g	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱または疼痛時、8時間以上あけて
180	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	40Kg~	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 m g	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱または疼痛時、8時間以上あけて
181	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	~4Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
182	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4~6Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
183	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6~8Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.20000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
184	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8~10Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.25000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
185	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10~12Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.30000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
186	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12~14Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.35000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
187	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	14~16Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.40000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
188	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	16~18Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.45000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
189	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	18~20Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.50000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
190	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	20~23Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.60000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
191	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	23~26Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.65000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
192	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	26~30Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.75000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
193	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	30~35Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.90000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
194	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	35~40Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
195	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	40Kg~	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
196	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	~4Kg	ダイアブ坐剤 4 4 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	0	1回0個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
197	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4~6Kg	ダイアブ坐剤 4 4 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	0	1回0個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
198	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6~8Kg	ダイアブ坐剤 4 4 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	0	1回0個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
199	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8~10Kg	ダイアブ坐剤 4 4 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4	1回2/3個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
200	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10~12Kg	ダイアブ坐剤 4 4 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4	1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
201	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12~14Kg	ダイアブ坐剤 4 4 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4	1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
202	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	14~16Kg	ダイアブ坐剤 4 4 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4	1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
203	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	16~18Kg	ダイアブ坐剤 4 4 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4	1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
204	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	18~20Kg	ダイアブ坐剤 4 4 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4	1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
205	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	20~23Kg	ダイアブ坐剤 4 4 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4	1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
206	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	23~26Kg	ダイアブ坐剤 4 4 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4	1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
207	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	26~30Kg	ダイアブ坐剤 4 4 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4	1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
208	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	30~35Kg	ダイアブ坐剤 4 4 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4	1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
209	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	35~40Kg	ダイアブ坐剤 4 4 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4	1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
210	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	40Kg~	ダイアブ坐剤 4 4 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4	1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
211	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	~4Kg	ダイアブ坐剤 6 6 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4	1回0個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
212	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4~6Kg	ダイアブ坐剤 6 6 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4	1回0個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
213	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6~8Kg	ダイアブ坐剤 6 6 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4	1回0個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
214	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8~10Kg	ダイアブ坐剤 6 6 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4	1回0個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
215	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10~12Kg	ダイアブ坐剤 6 6 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4	1回0個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)

■急性咽頭炎／ヘルパンギーナ選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
216	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12~14Kg	ダイアブ坐剤 6	6 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4 1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
217	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	14~16Kg	ダイアブ坐剤 6	6 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4 1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
218	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	16~18Kg	ダイアブ坐剤 6	6 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4 1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
219	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	18~20Kg	ダイアブ坐剤 6	6 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4 1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
220	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	20~23Kg	ダイアブ坐剤 6	6 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4 1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
221	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	23~26Kg	ダイアブ坐剤 6	6 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4 1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
222	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	26~30Kg	ダイアブ坐剤 6	6 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4 1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
223	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	30~35Kg	ダイアブ坐剤 6	6 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4 1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
224	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	35~40Kg	ダイアブ坐剤 6	6 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4 1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
225	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	40Kg~	ダイアブ坐剤 6	6 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	4 1回1個、発熱時とその8時間後に(計2回使用)
226	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	0ヶ月	トランサミンシロップ 5%		0.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
227	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	2ヶ月	トランサミンシロップ 5%		0.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
228	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	5ヶ月	トランサミンシロップ 5%		1.50000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
229	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8ヶ月	トランサミンシロップ 5%		2.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
230	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	1~2歳	トランサミンシロップ 5%		4.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
231	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	3歳	トランサミンシロップ 5%		6.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
232	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4歳	トランサミンシロップ 5%		7.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
233	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	5歳	トランサミンシロップ 5%		9.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
234	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6歳	トランサミンシロップ 5%		9.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
235	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	7歳	トランサミンシロップ 5%		10.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
236	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8歳	トランサミンシロップ 5%		11.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
237	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	9歳	トランサミンシロップ 5%		12.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
238	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10歳	トランサミンシロップ 5%		13.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
239	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	11歳	トランサミンシロップ 5%		14.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
240	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12歳~	トランサミンシロップ 5%		15.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
241	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	0ヶ月	トランサミン散 5 0%		0.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
242	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	2ヶ月	トランサミン散 5 0%		0.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
243	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	5ヶ月	トランサミン散 5 0%		0.20000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
244	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8ヶ月	トランサミン散 5 0%		0.20000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
245	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	1~2歳	トランサミン散 5 0%		0.40000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
246	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	3歳	トランサミン散 5 0%		0.60000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
247	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4歳	トランサミン散 5 0%		0.90000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
248	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	5歳	トランサミン散 5 0%		0.90000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
249	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6歳	トランサミン散 5 0%		1.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
250	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	7歳	トランサミン散 5 0%		1.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
251	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8歳	トランサミン散 5 0%		1.10000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
252	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	9歳	トランサミン散 5 0%		1.20000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
253	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10歳	トランサミン散 5 0%		1.30000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
254	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	11歳	トランサミン散 5 0%		1.40000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
255	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12歳~	トランサミン散 5 0%		1.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
256	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	0ヶ月	トランサミン錠 2 5 0 m g		0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
257	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	2ヶ月	トランサミン錠 2 5 0 m g		0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
258	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	5ヶ月	トランサミン錠 2 5 0 m g		0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5

■急性咽頭炎／ヘルパンギーナ選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
259	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8ヶ月	トランサミン錠 2.5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
260	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	1~2歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
261	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	3歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
262	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
263	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	5歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
264	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
265	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	7歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
266	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
267	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	9歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
268	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
269	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	11歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
270	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12歳~	トランサミン錠 2.5 0 mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
271	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	0ヶ月	ムコソルバン錠 1.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
272	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	2ヶ月	ムコソルバン錠 1.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
273	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	5ヶ月	ムコソルバン錠 1.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
274	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8ヶ月	ムコソルバン錠 1.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
275	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	1~2歳	ムコソルバン錠 1.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
276	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	3歳	ムコソルバン錠 1.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
277	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4歳	ムコソルバン錠 1.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
278	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	5歳	ムコソルバン錠 1.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
279	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6歳	ムコソルバン錠 1.5 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
280	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	7歳	ムコソルバン錠 1.5 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
281	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8歳	ムコソルバン錠 1.5 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
282	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	9歳	ムコソルバン錠 1.5 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
283	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10歳	ムコソルバン錠 1.5 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
284	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	11歳	ムコソルバン錠 1.5 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
285	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12歳~	ムコソルバン錠 1.5 mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
286	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	~4Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
287	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4~6Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.30000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
288	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6~8Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
289	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8~10Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
290	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10~12Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
291	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12~14Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.70000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
292	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	14~16Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
293	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	16~18Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.90000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
294	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	18~20Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
295	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	20~23Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
296	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	23~26Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
297	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	26~30Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
298	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	30~35Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
299	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	35~40Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
300	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	40Kg~	ムコダインD S 5 0 %	1.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
301	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	~4Kg	ムコダインシロップ 5 %	2.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	

■急性咽頭炎／ヘルパンギーナ選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
302	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4~6Kg	ムコダインシロップ5%	3.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
303	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6~8Kg	ムコダインシロップ5%	4.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
304	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8~10Kg	ムコダインシロップ5%	5.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
305	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10~12Kg	ムコダインシロップ5%	6.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
306	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12~14Kg	ムコダインシロップ5%	7.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
307	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	14~16Kg	ムコダインシロップ5%	8.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
308	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	16~18Kg	ムコダインシロップ5%	9.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
309	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	18~20Kg	ムコダインシロップ5%	10.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
310	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	20~23Kg	ムコダインシロップ5%	10.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
311	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	23~26Kg	ムコダインシロップ5%	12.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
312	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	26~30Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
313	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	30~35Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
314	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	35~40Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
315	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	40Kg~	ムコダインシロップ5%	15.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
316	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	0ヶ月	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
317	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	2ヶ月	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
318	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	5ヶ月	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
319	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8ヶ月	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
320	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	1~2歳	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
321	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	3歳	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
322	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4歳	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
323	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	5歳	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
324	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
325	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	7歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
326	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
327	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	9歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
328	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
329	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	11歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
330	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12歳~	ムコダイン錠250mg	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
331	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	~4Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
332	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4~6Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
333	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6~8Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
334	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8~10Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
335	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10~12Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
336	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12~14Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
337	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	14~16Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
338	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	16~18Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
339	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	18~20Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
340	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	20~23Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
341	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	23~26Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
342	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	26~30Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
343	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	30~35Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
344	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	35~40Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	



■急性咽頭炎／ヘルパンギーナ選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
345	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	40Kg~	ムコダイン錠 5 0 0 mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
346	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	0ヶ月	メジコン錠 1 5 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
347	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	2ヶ月	メジコン錠 1 5 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
348	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	5ヶ月	メジコン錠 1 5 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
349	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8ヶ月	メジコン錠 1 5 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
350	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	1~2歳	メジコン錠 1 5 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
351	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	3歳	メジコン錠 1 5 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
352	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4歳	メジコン錠 1 5 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
353	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	5歳	メジコン錠 1 5 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
354	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6歳	メジコン錠 1 5 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
355	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	7歳	メジコン錠 1 5 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
356	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8歳	メジコン錠 1 5 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
357	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	9歳	メジコン錠 1 5 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
358	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10歳	メジコン錠 1 5 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
359	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	11歳	メジコン錠 1 5 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
360	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12歳~	メジコン錠 1 5 mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
361	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	~4Kg	ロキソニン錠 6 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	0	
362	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4~6Kg	ロキソニン錠 6 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	0	
363	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6~8Kg	ロキソニン錠 6 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	0	
364	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8~10Kg	ロキソニン錠 6 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	0	
365	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10~12Kg	ロキソニン錠 6 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	0	
366	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12~14Kg	ロキソニン錠 6 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	0	
367	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	14~16Kg	ロキソニン錠 6 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	0	
368	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	16~18Kg	ロキソニン錠 6 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	0	
369	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	18~20Kg	ロキソニン錠 6 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	0	
370	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	20~23Kg	ロキソニン錠 6 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	0	
371	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	23~26Kg	ロキソニン錠 6 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	0	
372	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	26~30Kg	ロキソニン錠 6 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	0	
373	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	30~35Kg	ロキソニン錠 6 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	0	
374	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	35~40Kg	ロキソニン錠 6 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	0	
375	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	40Kg~	ロキソニン錠 6 0 mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	疼痛強い時または発熱時、8時間以上あけて使用
376	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	~4Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.10000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
377	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4~6Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.25000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
378	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6~8Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.30000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
379	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8~10Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.45000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
380	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10~12Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
381	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12~14Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.70000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
382	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	14~16Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
383	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	16~18Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.90000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
384	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	18~20Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	1.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
385	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	20~23Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
386	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	23~26Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
387	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	26~30Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	1.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	

■急性咽頭炎／ヘルパンギーナ選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
388	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	30~35Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	1.80000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
389	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	35~40Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	2.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
390	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	40Kg~	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	2.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
391	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	~4Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	0.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
392	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	4~6Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	1.20000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
393	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	6~8Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	1.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
394	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	8~10Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	2.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
395	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	10~12Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	3.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
396	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	12~14Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	3.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
397	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	14~16Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	4.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
398	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	16~18Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	4.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
399	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	18~20Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	5.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
400	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	20~23Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	6.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
401	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	23~26Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	6.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
402	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	26~30Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	7.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
403	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	30~35Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	9.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
404	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	35~40Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	10.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
405	2:急性咽頭炎／ヘルパンギーナ	40Kg~	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	12.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5