

■急性気管支炎／細菌性肺炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
1	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	～4Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3	処方後、すぐ開始
2	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4～6Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3	処方後、すぐ開始
3	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6～8Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3	処方後、すぐ開始
4	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8～10Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3	処方後、すぐ開始
5	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10～12Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3	処方後、すぐ開始
6	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12～14Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3	処方後、すぐ開始
7	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14～16Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3	処方後、すぐ開始
8	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16～18Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	2.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3	処方後、すぐ開始
9	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18～20Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	2.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3	処方後、すぐ開始
10	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20～23Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	2.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3	処方後、すぐ開始
11	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23～26Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	2.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3	処方後、すぐ開始
12	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26～30Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	3.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3	処方後、すぐ開始
13	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30～35Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	3.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3	処方後、すぐ開始
14	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35～40Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	4.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3	処方後、すぐ開始
15	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg～	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	5.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3	処方後、すぐ開始
16	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	～4Kg	アスベリンシロップ0.5%	0.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
17	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4～6Kg	アスベリンシロップ0.5%	0.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
18	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6～8Kg	アスベリンシロップ0.5%	0.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
19	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8～10Kg	アスベリンシロップ0.5%	2.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
20	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10～12Kg	アスベリンシロップ0.5%	3.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
21	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12～14Kg	アスベリンシロップ0.5%	4.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
22	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14～16Kg	アスベリンシロップ0.5%	5.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
23	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16～18Kg	アスベリンシロップ0.5%	6.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
24	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18～20Kg	アスベリンシロップ0.5%	7.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
25	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20～23Kg	アスベリンシロップ0.5%	8.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
26	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23～26Kg	アスベリンシロップ0.5%	8.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
27	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26～30Kg	アスベリンシロップ0.5%	8.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
28	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30～35Kg	アスベリンシロップ0.5%	10.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
29	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35～40Kg	アスベリンシロップ0.5%	10.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
30	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg～	アスベリンシロップ0.5%	12.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
31	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	～4Kg	アスベリン散10%	0.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
32	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4～6Kg	アスベリン散10%	0.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
33	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6～8Kg	アスベリン散10%	0.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
34	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8～10Kg	アスベリン散10%	0.10000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
35	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10～12Kg	アスベリン散10%	0.15000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
36	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12～14Kg	アスベリン散10%	0.20000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
37	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14～16Kg	アスベリン散10%	0.25000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
38	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16～18Kg	アスベリン散10%	0.30000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
39	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18～20Kg	アスベリン散10%	0.35000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
40	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20～23Kg	アスベリン散10%	0.40000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
41	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23～26Kg	アスベリン散10%	0.40000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
42	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26～30Kg	アスベリン散10%	0.40000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
43	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30～35Kg	アスベリン散10%	0.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	

■急性気管支炎／細菌性肺炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
44	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	アスピリン散 1 0 %	0.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
45	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	アスピリン散 1 0 %	0.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
46	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	0ヶ月	アスピリン錠 1 0 1 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
47	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	2ヶ月	アスピリン錠 1 0 1 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
48	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	5ヶ月	アスピリン錠 1 0 1 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
49	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8ヶ月	アスピリン錠 1 0 1 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
50	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	1~2歳	アスピリン錠 1 0 1 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
51	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	3歳	アスピリン錠 1 0 1 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
52	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4歳	アスピリン錠 1 0 1 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
53	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	5歳	アスピリン錠 1 0 1 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
54	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6歳	アスピリン錠 1 0 1 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
55	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	7歳	アスピリン錠 1 0 1 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
56	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8歳	アスピリン錠 1 0 1 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
57	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	9歳	アスピリン錠 1 0 1 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
58	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10歳	アスピリン錠 1 0 1 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
59	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	11歳	アスピリン錠 1 0 1 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
60	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12歳	アスピリン錠 1 0 1 0 mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
61	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	0ヶ月	アスピリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
62	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	2ヶ月	アスピリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
63	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	5ヶ月	アスピリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
64	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8ヶ月	アスピリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
65	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	1~2歳	アスピリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
66	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	3歳	アスピリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
67	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4歳	アスピリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
68	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	5歳	アスピリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
69	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6歳	アスピリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
70	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	7歳	アスピリン錠 2 0 2 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
71	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8歳	アスピリン錠 2 0 2 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
72	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	9歳	アスピリン錠 2 0 2 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
73	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10歳	アスピリン錠 2 0 2 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
74	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	11歳	アスピリン錠 2 0 2 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
75	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12歳	アスピリン錠 2 0 2 0 mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
76	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 使用
77	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 使用
78	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 使用
79	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
80	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
81	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
82	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
83	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
84	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
85	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
86	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用

■急性気管支炎／細菌性肺炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
130	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	オゼックス細粒小児用 15% 150mg	1.60000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
131	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	オゼックス細粒小児用 15% 150mg	1.90000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
132	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	オゼックス細粒小児用 15% 150mg	2.10000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
133	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	オゼックス細粒小児用 15% 150mg	2.40000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
134	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	オゼックス細粒小児用 15% 150mg	2.40000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
135	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	オゼックス細粒小児用 15% 150mg	2.40000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
136	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	オゼックス錠 150 150mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
137	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	オゼックス錠 150 150mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
138	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	オゼックス錠 150 150mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
139	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	オゼックス錠 150 150mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
140	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	オゼックス錠 150 150mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
141	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	オゼックス錠 150 150mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
142	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	オゼックス錠 150 150mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
143	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	オゼックス錠 150 150mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
144	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	オゼックス錠 150 150mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
145	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	オゼックス錠 150 150mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
146	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	オゼックス錠 150 150mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
147	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	オゼックス錠 150 150mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
148	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	オゼックス錠 150 150mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
149	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	オゼックス錠 150 150mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
150	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	オゼックス錠 150 150mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
151	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	オゼックス錠 75 75mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
152	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	オゼックス錠 75 75mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
153	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	オゼックス錠 75 75mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
154	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	オゼックス錠 75 75mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
155	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	オゼックス錠 75 75mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
156	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	オゼックス錠 75 75mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
157	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	オゼックス錠 75 75mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
158	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	オゼックス錠 75 75mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
159	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	オゼックス錠 75 75mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
160	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	オゼックス錠 75 75mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
161	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	オゼックス錠 75 75mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
162	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	オゼックス錠 75 75mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
163	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	オゼックス錠 75 75mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
164	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	オゼックス錠 75 75mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
165	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	オゼックス錠 75 75mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
166	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	カロナルシロップ 2%	0.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
167	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	カロナルシロップ 2%	0.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
168	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	カロナルシロップ 2%	4.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
169	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	カロナルシロップ 2%	5.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
170	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	カロナルシロップ 2%	6.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
171	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	カロナルシロップ 2%	7.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
172	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	カロナルシロップ 2%	8.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて

■急性気管支炎／細菌性肺炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
216	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱時または疼痛時、8時間以上あけて
217	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱時または疼痛時、8時間以上あけて
218	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱時または疼痛時、8時間以上あけて
219	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱時または疼痛時、8時間以上あけて
220	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱時または疼痛時、8時間以上あけて
221	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱時または疼痛時、8時間以上あけて
222	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱時または疼痛時、8時間以上あけて
223	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱時または疼痛時、8時間以上あけて
224	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱時または疼痛時、8時間以上あけて
225	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	カロナール錠 5 0 0 5 0 0 mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	発熱時または疼痛時、8時間以上あけて
226	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	0.30000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
227	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	0.40000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
228	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	0.60000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
229	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	0.80000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
230	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	1.00000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
231	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	1.20000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
232	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	1.40000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
233	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	1.60000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
234	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	1.80000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
235	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	2.00000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
236	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	2.30000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
237	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	2.60000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
238	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	3.00000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
239	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	3.00000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
240	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	3.00000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
241	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
242	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
243	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
244	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
245	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
246	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
247	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
248	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
249	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
250	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
251	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
252	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
253	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
254	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
255	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
256	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
257	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
258	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	

■急性気管支炎／細菌性肺炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
259	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	クラリス錠 5 0小児用 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
260	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	クラリス錠 5 0小児用 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
261	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	クラリス錠 5 0小児用 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
262	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	クラリス錠 5 0小児用 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
263	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	クラリス錠 5 0小児用 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
264	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	クラリス錠 5 0小児用 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
265	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	クラリス錠 5 0小児用 5 0 m g	4.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
266	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	クラリス錠 5 0小児用 5 0 m g	4.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
267	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	クラリス錠 5 0小児用 5 0 m g	4.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
268	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	クラリス錠 5 0小児用 5 0 m g	4.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
269	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	クラリス錠 5 0小児用 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
270	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	クラリス錠 5 0小児用 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
271	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	ケフラルカプセル 2 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
272	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	ケフラルカプセル 2 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
273	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	ケフラルカプセル 2 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
274	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	ケフラルカプセル 2 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
275	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	ケフラルカプセル 2 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
276	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	ケフラルカプセル 2 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
277	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	ケフラルカプセル 2 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
278	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	ケフラルカプセル 2 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
279	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	ケフラルカプセル 2 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
280	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	ケフラルカプセル 2 5 0 m g	3.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
281	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	ケフラルカプセル 2 5 0 m g	3.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
282	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	ケフラルカプセル 2 5 0 m g	3.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
283	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	ケフラルカプセル 2 5 0 m g	3.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
284	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	ケフラルカプセル 2 5 0 m g	3.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
285	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	ケフラルカプセル 2 5 0 m g	3.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
286	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	0.90000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
287	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
288	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	1.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
289	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	2.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
290	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	3.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
291	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	3.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
292	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	4.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
293	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	4.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
294	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	5.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
295	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	6.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
296	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	6.90000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
297	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	7.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
298	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	7.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
299	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	7.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
300	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	7.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
301	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	コカルDS 4 0 % (カロナール)	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて

■急性気管支炎／細菌性肺炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
302	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
303	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.20000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
304	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.25000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
305	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.30000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
306	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.35000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
307	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.40000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
308	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.45000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
309	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.50000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
310	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.60000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
311	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.65000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
312	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.75000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
313	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.90000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
314	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
315	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	コカルDS 4 0%(カロナール)	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
316	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	ザワシリン錠 2 5 0 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
317	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	ザワシリン錠 2 5 0 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
318	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	ザワシリン錠 2 5 0 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
319	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	ザワシリン錠 2 5 0 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
320	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	ザワシリン錠 2 5 0 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
321	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	ザワシリン錠 2 5 0 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
322	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	ザワシリン錠 2 5 0 2 5 0 m g	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
323	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	ザワシリン錠 2 5 0 2 5 0 m g	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
324	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	ザワシリン錠 2 5 0 2 5 0 m g	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
325	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	ザワシリン錠 2 5 0 2 5 0 m g	4.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	朝1錠、昼1錠、夕2錠
326	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	ザワシリン錠 2 5 0 2 5 0 m g	4.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	朝1錠、昼1錠、夕2錠
327	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	ザワシリン錠 2 5 0 2 5 0 m g	5.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	朝2錠、昼1錠、夕2錠
328	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	ザワシリン錠 2 5 0 2 5 0 m g	5.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	朝2錠、昼1錠、夕2錠
329	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	ザワシリン錠 2 5 0 2 5 0 m g	6.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
330	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	ザワシリン錠 2 5 0 2 5 0 m g	6.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
331	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	ジスロマック細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	0.30000	g	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
332	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	ジスロマック細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	0.40000	g	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
333	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	ジスロマック細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	0.60000	g	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
334	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	ジスロマック細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	0.80000	g	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
335	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	ジスロマック細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	1.00000	g	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
336	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	ジスロマック細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	1.20000	g	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
337	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	ジスロマック細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	1.50000	g	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
338	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	ジスロマック細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	1.80000	g	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
339	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	ジスロマック細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	2.00000	g	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
340	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	ジスロマック細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	2.20000	g	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
341	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	ジスロマック細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	2.50000	g	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
342	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	ジスロマック細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	2.80000	g	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
343	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	ジスロマック細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	3.00000	g	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
344	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	ジスロマック細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	3.50000	g	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始

■急性気管支炎／細菌性肺炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
345	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	ジスロマック細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	4.00000	g	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
346	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	ジスロマック錠 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
347	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	ジスロマック錠 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
348	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	ジスロマック錠 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
349	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	ジスロマック錠 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
350	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	ジスロマック錠 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
351	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	ジスロマック錠 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
352	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	ジスロマック錠 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
353	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	ジスロマック錠 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
354	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	ジスロマック錠 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
355	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	ジスロマック錠 2 5 0 m g	1.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
356	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	ジスロマック錠 2 5 0 m g	1.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
357	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	ジスロマック錠 2 5 0 m g	1.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
358	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	ジスロマック錠 2 5 0 m g	1.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
359	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	ジスロマック錠 2 5 0 m g	1.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
360	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	ジスロマック錠 2 5 0 m g	2.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	3	処方後内服開始
361	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	ピオフェルミンR散	0.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
362	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	ピオフェルミンR散	0.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
363	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	ピオフェルミンR散	0.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
364	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	ピオフェルミンR散	0.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
365	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	ピオフェルミンR散	0.90000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
366	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	ピオフェルミンR散	1.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
367	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	ピオフェルミンR散	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
368	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	ピオフェルミンR散	1.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
369	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	ピオフェルミンR散	1.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
370	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	ピオフェルミンR散	1.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
371	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	ピオフェルミンR散	2.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
372	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	ピオフェルミンR散	2.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
373	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	ピオフェルミンR散	3.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
374	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	ピオフェルミンR散	3.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
375	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	ピオフェルミンR散	3.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
376	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	0ヶ月	ピオフェルミンR錠	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
377	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	2ヶ月	ピオフェルミンR錠	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
378	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	5ヶ月	ピオフェルミンR錠	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
379	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8ヶ月	ピオフェルミンR錠	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
380	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	1~2歳	ピオフェルミンR錠	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
381	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	3歳	ピオフェルミンR錠	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
382	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4歳	ピオフェルミンR錠	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
383	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	5歳	ピオフェルミンR錠	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
384	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6歳	ピオフェルミンR錠	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
385	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	7歳	ピオフェルミンR錠	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
386	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8歳	ピオフェルミンR錠	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
387	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	9歳	ピオフェルミンR錠	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	

■急性気管支炎／細菌性肺炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢		選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
388	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10歳	ピオフェルミンR錠	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
389	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	11歳	ピオフェルミンR錠	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
390	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12歳	ピオフェルミンR錠	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
391	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	フロモックス錠100mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
392	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	フロモックス錠100mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
393	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	フロモックス錠100mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
394	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	フロモックス錠100mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
395	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	フロモックス錠100mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
396	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	フロモックス錠100mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
397	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	フロモックス錠100mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
398	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	フロモックス錠100mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
399	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	フロモックス錠100mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
400	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	フロモックス錠100mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
401	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	フロモックス錠100mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
402	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	フロモックス錠100mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
403	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	フロモックス錠100mg	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
404	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	フロモックス錠100mg	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
405	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	フロモックス錠100mg	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
406	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	フロモックス錠75mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
407	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	フロモックス錠75mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
408	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	フロモックス錠75mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
409	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	フロモックス錠75mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
410	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	フロモックス錠75mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
411	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	フロモックス錠75mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
412	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	フロモックス錠75mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
413	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	フロモックス錠75mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
414	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	フロモックス錠75mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
415	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	フロモックス錠75mg	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
416	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	フロモックス錠75mg	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
417	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	フロモックス錠75mg	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
418	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	フロモックス錠75mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
419	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	フロモックス錠75mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
420	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	フロモックス錠75mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
421	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	5ヶ月	ホクナリンテープ0.5mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
422	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8ヶ月	ホクナリンテープ0.5mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
423	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	1~2歳	ホクナリンテープ0.5mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
424	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	3歳	ホクナリンテープ0.5mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
425	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4歳	ホクナリンテープ0.5mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
426	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	1~2歳	ホクナリンテープ1mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
427	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	3歳	ホクナリンテープ1mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
428	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4歳	ホクナリンテープ1mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
429	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	5歳	ホクナリンテープ1mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
430	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6歳	ホクナリンテープ1mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0

■急性気管支炎／細菌性肺炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
431	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	7歳	ホクナリンテープ1mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
432	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8歳	ホクナリンテープ1mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
433	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	9歳	ホクナリンテープ1mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
434	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10歳	ホクナリンテープ1mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
435	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	11歳	ホクナリンテープ1mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
436	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12歳	ホクナリンテープ1mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
437	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	7歳	ホクナリンテープ2mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
438	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8歳	ホクナリンテープ2mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
439	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	9歳	ホクナリンテープ2mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
440	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10歳	ホクナリンテープ2mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
441	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	11歳	ホクナリンテープ2mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
442	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12歳	ホクナリンテープ2mg	5.00000	枚	3:外用	49:1日1回就寝前に	0
443	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トロー」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
444	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トロー」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
445	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トロー」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
446	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トロー」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
447	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トロー」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
448	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トロー」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
449	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トロー」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
450	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トロー」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
451	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トロー」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
452	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トロー」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
453	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トロー」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
454	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トロー」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
455	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トロー」	1.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
456	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トロー」	1.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
457	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トロー」	1.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
458	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	ミノマイシン錠50mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
459	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	ミノマイシン錠50mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
460	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	ミノマイシン錠50mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
461	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	ミノマイシン錠50mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
462	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	ミノマイシン錠50mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
463	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	ミノマイシン錠50mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
464	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	ミノマイシン錠50mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
465	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	ミノマイシン錠50mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
466	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	ミノマイシン錠50mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
467	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	ミノマイシン錠50mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
468	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	ミノマイシン錠50mg	1.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
469	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	ミノマイシン錠50mg	1.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
470	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	ミノマイシン錠50mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
471	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	ミノマイシン錠50mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
472	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	ミノマイシン錠50mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5 処方後内服開始
473	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	0ヶ月	ムコソルバン錠15mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5

■急性気管支炎／細菌性肺炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
474	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	2ヶ月	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
475	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	5ヶ月	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
476	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8ヶ月	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
477	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	1~2歳	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
478	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	3歳	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
479	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4歳	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
480	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	5歳	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
481	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
482	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	7歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
483	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
484	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	9歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
485	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
486	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	11歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
487	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12歳	ムコソルバン錠 1.5mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
488	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	ムコダインDS 50%	0.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
489	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	ムコダインDS 50%	0.30000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
490	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	ムコダインDS 50%	0.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
491	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	ムコダインDS 50%	0.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
492	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	ムコダインDS 50%	0.60000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
493	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	ムコダインDS 50%	0.70000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
494	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	ムコダインDS 50%	0.80000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
495	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	ムコダインDS 50%	0.90000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
496	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	ムコダインDS 50%	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
497	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	ムコダインDS 50%	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
498	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	ムコダインDS 50%	1.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
499	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	ムコダインDS 50%	1.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
500	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	ムコダインDS 50%	1.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
501	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	ムコダインDS 50%	1.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
502	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	ムコダインDS 50%	1.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
503	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	ムコダインシロップ5%	2.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
504	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	ムコダインシロップ5%	3.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
505	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	ムコダインシロップ5%	4.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
506	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	ムコダインシロップ5%	5.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
507	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	ムコダインシロップ5%	6.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
508	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	ムコダインシロップ5%	7.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
509	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	ムコダインシロップ5%	8.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
510	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	ムコダインシロップ5%	9.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
511	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	ムコダインシロップ5%	10.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
512	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	ムコダインシロップ5%	10.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
513	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	ムコダインシロップ5%	12.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
514	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
515	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
516	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5

■急性気管支炎／細菌性肺炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
517	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	ムコダインシロップ 5%	15.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
518	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	0ヶ月	ムコダイン錠 2.5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
519	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	2ヶ月	ムコダイン錠 2.5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
520	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	5ヶ月	ムコダイン錠 2.5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
521	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8ヶ月	ムコダイン錠 2.5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
522	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	1~2歳	ムコダイン錠 2.5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
523	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	3歳	ムコダイン錠 2.5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
524	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4歳	ムコダイン錠 2.5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
525	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	5歳	ムコダイン錠 2.5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
526	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6歳	ムコダイン錠 2.5 0 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
527	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	7歳	ムコダイン錠 2.5 0 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
528	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8歳	ムコダイン錠 2.5 0 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
529	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	9歳	ムコダイン錠 2.5 0 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
530	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10歳	ムコダイン錠 2.5 0 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
531	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	11歳	ムコダイン錠 2.5 0 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
532	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12歳	ムコダイン錠 2.5 0 m g	3.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
533	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
534	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
535	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
536	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
537	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
538	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
539	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
540	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
541	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
542	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
543	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
544	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
545	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
546	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
547	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	ムコダイン錠 5 0 0 m g	3.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
548	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	メイアクトMS小児用細粒 1 0 % 1 0 0 m g	0.30000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
549	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	メイアクトMS小児用細粒 1 0 % 1 0 0 m g	0.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
550	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	メイアクトMS小児用細粒 1 0 % 1 0 0 m g	0.70000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
551	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	メイアクトMS小児用細粒 1 0 % 1 0 0 m g	0.90000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
552	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	メイアクトMS小児用細粒 1 0 % 1 0 0 m g	1.10000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
553	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	メイアクトMS小児用細粒 1 0 % 1 0 0 m g	1.30000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
554	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	メイアクトMS小児用細粒 1 0 % 1 0 0 m g	1.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
555	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	メイアクトMS小児用細粒 1 0 % 1 0 0 m g	1.70000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
556	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	メイアクトMS小児用細粒 1 0 % 1 0 0 m g	1.80000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
557	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	メイアクトMS小児用細粒 1 0 % 1 0 0 m g	2.10000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
558	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	メイアクトMS小児用細粒 1 0 % 1 0 0 m g	2.40000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
559	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	メイアクトMS小児用細粒 1 0 % 1 0 0 m g	2.70000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5

■急性気管支炎／細菌性肺炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
560	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
561	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
562	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
563	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	0ヶ月	メジコン錠 15mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
564	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	2ヶ月	メジコン錠 15mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
565	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	5ヶ月	メジコン錠 15mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
566	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8ヶ月	メジコン錠 15mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
567	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	1~2歳	メジコン錠 15mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
568	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	3歳	メジコン錠 15mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
569	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4歳	メジコン錠 15mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
570	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	5歳	メジコン錠 15mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
571	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6歳	メジコン錠 15mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
572	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	7歳	メジコン錠 15mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
573	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8歳	メジコン錠 15mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
574	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	9歳	メジコン錠 15mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
575	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10歳	メジコン錠 15mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
576	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	11歳	メジコン錠 15mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
577	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12歳	メジコン錠 15mg	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
578	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	0.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
579	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	2.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
580	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	3.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
581	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	4.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
582	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	5.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
583	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	6.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
584	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	7.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
585	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	8.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
586	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	9.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
587	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	10.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
588	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	10.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
589	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	10.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
590	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	10.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
591	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	10.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
592	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	メブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	10.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
593	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	メブチンドライシロップ0.005%	0.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
594	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	メブチンドライシロップ0.005%	0.20000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
595	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	メブチンドライシロップ0.005%	0.30000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
596	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	メブチンドライシロップ0.005%	0.40000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
597	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	メブチンドライシロップ0.005%	0.50000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
598	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	メブチンドライシロップ0.005%	0.60000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
599	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	メブチンドライシロップ0.005%	0.70000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
600	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	メブチンドライシロップ0.005%	0.80000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
601	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	メブチンドライシロップ0.005%	0.90000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
602	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	メブチンドライシロップ0.005%	1.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	

■急性気管支炎／細菌性肺炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

	処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
603	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	メブチンドライシロップ0.005%	1.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
604	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	メブチンドライシロップ0.005%	1.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
605	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	メブチンドライシロップ0.005%	1.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
606	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	メブチンドライシロップ0.005%	1.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
607	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	メブチンドライシロップ0.005%	1.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
608	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	メブチンミニ錠2.5μg 0.025mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
609	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	メブチンミニ錠2.5μg 0.025mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
610	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	メブチンミニ錠2.5μg 0.025mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
611	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	メブチンミニ錠2.5μg 0.025mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
612	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	メブチンミニ錠2.5μg 0.025mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
613	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	メブチンミニ錠2.5μg 0.025mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
614	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	メブチンミニ錠2.5μg 0.025mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
615	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	メブチンミニ錠2.5μg 0.025mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
616	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	メブチンミニ錠2.5μg 0.025mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
617	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	メブチンミニ錠2.5μg 0.025mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
618	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	メブチンミニ錠2.5μg 0.025mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
619	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	メブチンミニ錠2.5μg 0.025mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
620	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	メブチンミニ錠2.5μg 0.025mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
621	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	メブチンミニ錠2.5μg 0.025mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
622	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	メブチンミニ錠2.5μg 0.025mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
623	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	0.45000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
624	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
625	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	1.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
626	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	2.25000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
627	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	2.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
628	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
629	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	3.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
630	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	3.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
631	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	4.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
632	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
633	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	5.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
634	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	6.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
635	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
636	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
637	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
638	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	0.10000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
639	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	0.25000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
640	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	0.30000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
641	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	0.45000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
642	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	0.60000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
643	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	0.70000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
644	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	0.80000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
645	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	0.90000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	

■急性気管支炎／細菌性肺炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
646	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
647	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	1.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
648	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	1.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
649	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	1.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
650	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	1.80000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
651	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	2.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
652	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	2.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
653	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	~4Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	0.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
654	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	4~6Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	1.20000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
655	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	6~8Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	1.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
656	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	8~10Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	2.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
657	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	10~12Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	3.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
658	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	12~14Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	3.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
659	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	14~16Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	4.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
660	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	16~18Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	4.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
661	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	18~20Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	5.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
662	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	20~23Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	6.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
663	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	23~26Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	6.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
664	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	26~30Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	7.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
665	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	30~35Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	9.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
666	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	35~40Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	10.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
667	3:急性気管支炎／細菌性肺炎	40Kg~	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	12.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	