

■喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
87	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
88	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
89	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
90	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
91	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	0.30000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
92	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	0.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
93	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	0.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
94	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	0.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
95	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	1.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
96	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
97	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	1.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
98	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	1.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
99	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	1.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
100	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	2.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
101	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	2.30000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
102	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	2.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
103	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	3.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
104	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	3.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
105	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	3.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
106	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
107	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
108	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
109	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
110	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
111	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
112	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
113	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
114	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
115	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
116	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
117	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
118	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
119	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
120	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
121	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
122	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
123	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
124	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
125	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
126	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
127	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
128	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
129	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	

■喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢		選択した症状、薬剤から表示される処方内容							
130	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	クラリス錠 5 0小児用 5 0mg	4.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	5
131	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	クラリス錠 5 0小児用 5 0mg	4.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	5
132	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	クラリス錠 5 0小児用 5 0mg	4.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	5
133	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	クラリス錠 5 0小児用 5 0mg	4.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	5
134	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	クラリス錠 5 0小児用 5 0mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	5
135	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	クラリス錠 5 0小児用 5 0mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	5
136	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
137	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
138	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.20000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
139	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.25000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
140	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.30000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
141	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.35000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
142	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.40000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
143	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.45000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
144	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.50000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
145	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.60000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
146	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.65000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
147	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.75000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
148	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.90000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
149	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
150	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	コカルDS 4 0%(カロナール)	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
151	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	ザワリン錠 2 5 0 2 5 0mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
152	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	ザワリン錠 2 5 0 2 5 0mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
153	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	ザワリン錠 2 5 0 2 5 0mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
154	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	ザワリン錠 2 5 0 2 5 0mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
155	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	ザワリン錠 2 5 0 2 5 0mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
156	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	ザワリン錠 2 5 0 2 5 0mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
157	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	ザワリン錠 2 5 0 2 5 0mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
158	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	ザワリン錠 2 5 0 2 5 0mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
159	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	ザワリン錠 2 5 0 2 5 0mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
160	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	ザワリン錠 2 5 0 2 5 0mg	4.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	朝1錠、昼1錠、夕2錠
161	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	ザワリン錠 2 5 0 2 5 0mg	4.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	朝1錠、昼1錠、夕2錠
162	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	ザワリン錠 2 5 0 2 5 0mg	5.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	朝2錠、昼1錠、夕2錠
163	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	ザワリン錠 2 5 0 2 5 0mg	5.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	朝2錠、昼1錠、夕2錠
164	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	ザワリン錠 2 5 0 2 5 0mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
165	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	ザワリン錠 2 5 0 2 5 0mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
166	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1%	1.50000	m L	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
167	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1%	2.00000	m L	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
168	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1%	3.00000	m L	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
169	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1%	4.00000	m L	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
170	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1%	5.00000	m L	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
171	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1%	6.00000	m L	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
172	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1%	7.00000	m L	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用

■喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
173	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	デカドロンエリキシル0.01%	8.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
174	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	デカドロンエリキシル0.01%	9.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
175	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	デカドロンエリキシル0.01%	10.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
176	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	デカドロンエリキシル0.01%	15.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
177	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	デカドロンエリキシル0.01%	20.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
178	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	デカドロンエリキシル0.01%	20.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
179	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	デカドロンエリキシル0.01%	30.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
180	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	デカドロンエリキシル0.01%	30.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
181	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	デカドロン錠0.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
182	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	デカドロン錠0.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
183	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	デカドロン錠0.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
184	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	デカドロン錠0.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
185	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	デカドロン錠0.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
186	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	デカドロン錠0.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
187	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	デカドロン錠0.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
188	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	デカドロン錠0.5mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
189	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	デカドロン錠0.5mg	4.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
190	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	デカドロン錠0.5mg	4.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
191	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	デカドロン錠0.5mg	4.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
192	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	デカドロン錠0.5mg	4.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
193	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	デカドロン錠0.5mg	6.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
194	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	デカドロン錠0.5mg	6.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
195	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	デカドロン錠0.5mg	6.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	1回目はすぐ服用
196	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	デカドロン錠0.5mg(粉砕)	1.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	粉砕、1回目はすぐ服用
197	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	デカドロン錠0.5mg(粉砕)	1.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	粉砕、1回目はすぐ服用
198	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	デカドロン錠0.5mg(粉砕)	1.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	粉砕、1回目はすぐ服用
199	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	デカドロン錠0.5mg(粉砕)	1.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	粉砕、1回目はすぐ服用
200	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	デカドロン錠0.5mg(粉砕)	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	粉砕、1回目はすぐ服用
201	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	デカドロン錠0.5mg(粉砕)	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	粉砕、1回目はすぐ服用
202	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	デカドロン錠0.5mg(粉砕)	3.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	粉砕、1回目はすぐ服用
203	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	デカドロン錠0.5mg(粉砕)	3.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	粉砕、1回目はすぐ服用
204	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	デカドロン錠0.5mg(粉砕)	3.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	粉砕、1回目はすぐ服用
205	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	デカドロン錠0.5mg(粉砕)	4.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	粉砕、1回目はすぐ服用
206	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	デカドロン錠0.5mg(粉砕)	4.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	粉砕、1回目はすぐ服用
207	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	デカドロン錠0.5mg(粉砕)	4.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	粉砕、1回目はすぐ服用
208	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	デカドロン錠0.5mg(粉砕)	6.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	粉砕、1回目はすぐ服用
209	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	デカドロン錠0.5mg(粉砕)	6.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	粉砕、1回目はすぐ服用
210	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	デカドロン錠0.5mg(粉砕)	6.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	3	粉砕、1回目はすぐ服用
211	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	0ヶ月	ムコソルバン錠1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
212	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	2ヶ月	ムコソルバン錠1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
213	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	5ヶ月	ムコソルバン錠1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
214	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8ヶ月	ムコソルバン錠1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
215	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	1~2歳	ムコソルバン錠1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	

■喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢		選択した症状、薬剤から表示される処方内容							
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
216	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	3歳	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
217	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4歳	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
218	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	5歳	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
219	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
220	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	7歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
221	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
222	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	9歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
223	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
224	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	11歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
225	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12歳	ムコソルバン錠 1.5mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
226	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	ムコダインD S 5.0%	0.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
227	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	ムコダインD S 5.0%	0.30000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
228	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	ムコダインD S 5.0%	0.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
229	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	ムコダインD S 5.0%	0.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
230	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	ムコダインD S 5.0%	0.60000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
231	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	ムコダインD S 5.0%	0.70000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
232	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	ムコダインD S 5.0%	0.80000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
233	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	ムコダインD S 5.0%	0.90000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
234	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	ムコダインD S 5.0%	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
235	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	ムコダインD S 5.0%	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
236	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	ムコダインD S 5.0%	1.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
237	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	ムコダインD S 5.0%	1.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
238	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	ムコダインD S 5.0%	1.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
239	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	ムコダインD S 5.0%	1.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
240	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	ムコダインD S 5.0%	1.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
241	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	ムコダインシロップ 5%	2.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
242	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	ムコダインシロップ 5%	3.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
243	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	ムコダインシロップ 5%	4.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
244	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	ムコダインシロップ 5%	5.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
245	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	ムコダインシロップ 5%	6.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
246	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	ムコダインシロップ 5%	7.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
247	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	ムコダインシロップ 5%	8.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
248	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	ムコダインシロップ 5%	9.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
249	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	ムコダインシロップ 5%	10.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
250	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	ムコダインシロップ 5%	10.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
251	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	ムコダインシロップ 5%	12.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
252	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	ムコダインシロップ 5%	14.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
253	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	ムコダインシロップ 5%	14.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
254	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	ムコダインシロップ 5%	14.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
255	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	ムコダインシロップ 5%	15.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
256	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	0ヶ月	ムコダイン錠 2.50mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
257	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	2ヶ月	ムコダイン錠 2.50mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	
258	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	5ヶ月	ムコダイン錠 2.50mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5	

■喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
259	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8ヶ月	ムコダイン錠 2.50mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
260	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	3歳	ムコダイン錠 2.50mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
261	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4歳	ムコダイン錠 2.50mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
262	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	5歳	ムコダイン錠 2.50mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
263	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6歳	ムコダイン錠 2.50mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
264	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	7歳	ムコダイン錠 2.50mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
265	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8歳	ムコダイン錠 2.50mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
266	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	9歳	ムコダイン錠 2.50mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
267	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	1~2歳	ムコダイン錠 2.50mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
268	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10歳	ムコダイン錠 2.50mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
269	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	11歳	ムコダイン錠 2.50mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
270	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12歳	ムコダイン錠 2.50mg	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
271	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	ムコダイン錠 5.00mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
272	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	ムコダイン錠 5.00mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
273	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	ムコダイン錠 5.00mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
274	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	ムコダイン錠 5.00mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
275	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	ムコダイン錠 5.00mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
276	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	ムコダイン錠 5.00mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
277	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	ムコダイン錠 5.00mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
278	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	ムコダイン錠 5.00mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
279	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	ムコダイン錠 5.00mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
280	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	ムコダイン錠 5.00mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
281	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	ムコダイン錠 5.00mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
282	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	ムコダイン錠 5.00mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
283	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	ムコダイン錠 5.00mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
284	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	ムコダイン錠 5.00mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
285	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	ムコダイン錠 5.00mg	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
286	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	メリアクトMS小児用細粒 10% 100mg	0.27000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
287	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	メリアクトMS小児用細粒 10% 100mg	0.36000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
288	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	メリアクトMS小児用細粒 10% 100mg	0.54000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
289	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	メリアクトMS小児用細粒 10% 100mg	0.72000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
290	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	メリアクトMS小児用細粒 10% 100mg	0.90000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
291	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	メリアクトMS小児用細粒 10% 100mg	1.08000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
292	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	メリアクトMS小児用細粒 10% 100mg	1.26000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
293	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	メリアクトMS小児用細粒 10% 100mg	1.44000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
294	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	メリアクトMS小児用細粒 10% 100mg	1.62000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
295	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	メリアクトMS小児用細粒 10% 100mg	1.80000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
296	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	メリアクトMS小児用細粒 10% 100mg	2.07000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
297	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	メリアクトMS小児用細粒 10% 100mg	2.34000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
298	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	メリアクトMS小児用細粒 10% 100mg	2.70000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
299	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	メリアクトMS小児用細粒 10% 100mg	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
300	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	メリアクトMS小児用細粒 10% 100mg	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
301	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	メプチンシロップ 5μg/mL 0.0005%	0.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	

■喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容				
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
302	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	ムブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	2.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
303	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	ムブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	3.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
304	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	ムブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	4.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
305	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	ムブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	5.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
306	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	ムブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	6.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
307	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	ムブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	7.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
308	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	ムブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	8.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
309	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	ムブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	9.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
310	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	ムブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	10.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
311	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	ムブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	10.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
312	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	ムブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	10.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
313	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	ムブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	10.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
314	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	ムブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	10.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
315	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	ムブチンシロップ5μg/mL 0.0005%	10.00000	mL	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
316	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	ムブチンシロップ0.0005%	0.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
317	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	ムブチンシロップ0.005%	0.20000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
318	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	ムブチンシロップ0.005%	0.30000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
319	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	ムブチンシロップ0.005%	0.40000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
320	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	ムブチンシロップ0.005%	0.50000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
321	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	ムブチンシロップ0.005%	0.60000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
322	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	ムブチンシロップ0.005%	0.70000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
323	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	ムブチンシロップ0.005%	0.80000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
324	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	ムブチンシロップ0.005%	0.90000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
325	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	ムブチンシロップ0.005%	1.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
326	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	ムブチンシロップ0.005%	1.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
327	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	ムブチンシロップ0.005%	1.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
328	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	ムブチンシロップ0.005%	1.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
329	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	ムブチンシロップ0.005%	1.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
330	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	ムブチンシロップ0.005%	1.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
331	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	ムブチンニ錠2.5μg 0.025mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
332	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	ムブチンニ錠2.5μg 0.025mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
333	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	ムブチンニ錠2.5μg 0.025mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
334	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	ムブチンニ錠2.5μg 0.025mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
335	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	ムブチンニ錠2.5μg 0.025mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
336	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	ムブチンニ錠2.5μg 0.025mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
337	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	ムブチンニ錠2.5μg 0.025mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
338	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	ムブチンニ錠2.5μg 0.025mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
339	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	ムブチンニ錠2.5μg 0.025mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
340	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	ムブチンニ錠2.5μg 0.025mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
341	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	ムブチンニ錠2.5μg 0.025mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
342	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	ムブチンニ錠2.5μg 0.025mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
343	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	ムブチンニ錠2.5μg 0.025mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
344	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	ムブチンニ錠2.5μg 0.025mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5

■喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容				
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
345	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	ムブチン錠2.5μg 0.025mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
346	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	ムブチン錠5.0μg 0.05mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
347	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	ムブチン錠5.0μg 0.05mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
348	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	ムブチン錠5.0μg 0.05mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
349	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	ムブチン錠5.0μg 0.05mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
350	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	ムブチン錠5.0μg 0.05mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
351	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	ムブチン錠5.0μg 0.05mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
352	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	ムブチン錠5.0μg 0.05mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
353	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	ムブチン錠5.0μg 0.05mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
354	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	ムブチン錠5.0μg 0.05mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
355	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	ムブチン錠5.0μg 0.05mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
356	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	ムブチン錠5.0μg 0.05mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
357	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	ムブチン錠5.0μg 0.05mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
358	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	ムブチン錠5.0μg 0.05mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
359	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	ムブチン錠5.0μg 0.05mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
360	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	ムブチン錠5.0μg 0.05mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
361	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	0.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
362	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
363	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	1.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
364	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	2.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
365	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	2.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
366	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
367	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	3.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
368	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	4.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
369	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	4.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
370	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
371	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	5.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
372	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	6.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
373	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
374	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
375	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	ワイドシリン細粒2.0% 2.00mg	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
376	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	0.10000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
377	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	0.25000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
378	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	0.30000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
379	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	0.45000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
380	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	0.60000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
381	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	0.70000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
382	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	0.80000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
383	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	0.90000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
384	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
385	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	1.20000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
386	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	1.20000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
387	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	小児用ムコソルバンD S1.5%	1.40000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5

■喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
388	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	1.80000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
389	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	2.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
390	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	2.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
391	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	~4Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	0.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
392	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	4~6Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	1.20000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
393	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	6~8Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	1.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
394	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	8~10Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	2.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
395	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	10~12Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	3.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
396	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	12~14Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	3.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
397	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	14~16Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	4.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
398	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	16~18Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	4.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
399	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	18~20Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	5.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
400	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	20~23Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	6.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
401	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	23~26Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	6.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
402	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	26~30Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	7.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
403	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	30~35Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	9.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
404	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	35~40Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	10.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
405	4:喘息性気管支炎／急性細気管支炎／RSウイルス感染症	40Kg~	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	12.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	