

■ 気管支喘息選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
1	5:気管支喘息	0ヶ月	アドエア100ディスクス28吸入用 28プリストア	0.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	
2	5:気管支喘息	2ヶ月	アドエア100ディスクス28吸入用 28プリストア	0.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	
3	5:気管支喘息	5ヶ月	アドエア100ディスクス28吸入用 28プリストア	0.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	
4	5:気管支喘息	8ヶ月	アドエア100ディスクス28吸入用 28プリストア	0.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	
5	5:気管支喘息	1~2歳	アドエア100ディスクス28吸入用 28プリストア	0.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	
6	5:気管支喘息	3歳	アドエア100ディスクス28吸入用 28プリストア	0.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	
7	5:気管支喘息	4歳	アドエア100ディスクス28吸入用 28プリストア	0.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	
8	5:気管支喘息	5歳	アドエア100ディスクス28吸入用 28プリストア	1.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	
9	5:気管支喘息	6歳	アドエア100ディスクス28吸入用 28プリストア	1.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	
10	5:気管支喘息	7歳	アドエア100ディスクス28吸入用 28プリストア	1.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	
11	5:気管支喘息	8歳	アドエア100ディスクス28吸入用 28プリストア	1.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	
12	5:気管支喘息	9歳	アドエア100ディスクス28吸入用 28プリストア	1.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	
13	5:気管支喘息	10歳	アドエア100ディスクス28吸入用 28プリストア	1.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	
14	5:気管支喘息	11歳	アドエア100ディスクス28吸入用 28プリストア	1.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	
15	5:気管支喘息	12歳~	アドエア100ディスクス28吸入用 28プリストア	1.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	
16	5:気管支喘息	0ヶ月	アドエア100ディスクス60吸入用 60プリストア	0.00000	キット	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
17	5:気管支喘息	2ヶ月	アドエア100ディスクス60吸入用 60プリストア	0.00000	キット	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
18	5:気管支喘息	5ヶ月	アドエア100ディスクス60吸入用 60プリストア	0.00000	キット	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
19	5:気管支喘息	8ヶ月	アドエア100ディスクス60吸入用 60プリストア	0.00000	キット	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
20	5:気管支喘息	1~2歳	アドエア100ディスクス60吸入用 60プリストア	0.00000	キット	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
21	5:気管支喘息	3歳	アドエア100ディスクス60吸入用 60プリストア	0.00000	キット	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
22	5:気管支喘息	4歳	アドエア100ディスクス60吸入用 60プリストア	0.00000	キット	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
23	5:気管支喘息	5歳	アドエア100ディスクス60吸入用 60プリストア	0.00000	キット	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
24	5:気管支喘息	6歳	アドエア100ディスクス60吸入用 60プリストア	1.00000	キット	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
25	5:気管支喘息	7歳	アドエア100ディスクス60吸入用 60プリストア	1.00000	キット	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
26	5:気管支喘息	8歳	アドエア100ディスクス60吸入用 60プリストア	1.00000	キット	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
27	5:気管支喘息	9歳	アドエア100ディスクス60吸入用 60プリストア	1.00000	キット	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
28	5:気管支喘息	10歳	アドエア100ディスクス60吸入用 60プリストア	1.00000	キット	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
29	5:気管支喘息	11歳	アドエア100ディスクス60吸入用 60プリストア	1.00000	キット	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
30	5:気管支喘息	12歳~	アドエア100ディスクス60吸入用 60プリストア	1.00000	キット	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
31	5:気管支喘息	0ヶ月	アドエア50エアソール120吸入用 12.0g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1	1回1吸入
32	5:気管支喘息	2ヶ月	アドエア50エアソール120吸入用 12.0g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1	1回1吸入
33	5:気管支喘息	5ヶ月	アドエア50エアソール120吸入用 12.0g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1	1回1吸入
34	5:気管支喘息	8ヶ月	アドエア50エアソール120吸入用 12.0g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1	1回1吸入
35	5:気管支喘息	1~2歳	アドエア50エアソール120吸入用 12.0g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1	1回1吸入
36	5:気管支喘息	3歳	アドエア50エアソール120吸入用 12.0g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1	1回1吸入
37	5:気管支喘息	4歳	アドエア50エアソール120吸入用 12.0g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1	1回1吸入
38	5:気管支喘息	5歳	アドエア50エアソール120吸入用 12.0g	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
39	5:気管支喘息	6歳	アドエア50エアソール120吸入用 12.0g	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
40	5:気管支喘息	7歳	アドエア50エアソール120吸入用 12.0g	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	1回1吸入
41	5:気管支喘息	8歳	アドエア50エアソール120吸入用 12.0g	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	1回2吸入
42	5:気管支喘息	10歳	アドエア50エアソール120吸入用 12.0g	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	1回2吸入
43	5:気管支喘息	11歳	アドエア50エアソール120吸入用 12.0g	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	1回2吸入

■気管支喘息選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
44	5:気管支喘息	12歳~	アドエア5 0エアゾール1 2 0吸入用 1 2 . 0 g	1.00000	瓶	3:外用	4: 1 日 2 回	1 1回2吸入
45	5:気管支喘息	9歳	アドエア5 0エアゾール1 2 0吸入用 1 2 . 0 g	1.00000	瓶	3:外用	4: 1 日 2 回	1 1回2吸入
46	5:気管支喘息	~4Kg	インタール吸入液 1% 2 mL	15.00000	管	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1管吸入 (1時間以上あけて、1日4回まで)
47	5:気管支喘息	4~6Kg	インタール吸入液 1% 2 mL	15.00000	管	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1管吸入 (1時間以上あけて、1日4回まで)
48	5:気管支喘息	6~8Kg	インタール吸入液 1% 2 mL	15.00000	管	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1管吸入 (1時間以上あけて、1日4回まで)
49	5:気管支喘息	8~10Kg	インタール吸入液 1% 2 mL	15.00000	管	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1管吸入 (1時間以上あけて、1日4回まで)
50	5:気管支喘息	10~12Kg	インタール吸入液 1% 2 mL	15.00000	管	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1管吸入 (1時間以上あけて、1日4回まで)
51	5:気管支喘息	12~14Kg	インタール吸入液 1% 2 mL	15.00000	管	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1管吸入 (1時間以上あけて、1日4回まで)
52	5:気管支喘息	14~16Kg	インタール吸入液 1% 2 mL	15.00000	管	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1管吸入 (1時間以上あけて、1日4回まで)
53	5:気管支喘息	16~18Kg	インタール吸入液 1% 2 mL	15.00000	管	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1管吸入 (1時間以上あけて、1日4回まで)
54	5:気管支喘息	18~20Kg	インタール吸入液 1% 2 mL	15.00000	管	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1管吸入 (1時間以上あけて、1日4回まで)
55	5:気管支喘息	20~23Kg	インタール吸入液 1% 2 mL	15.00000	管	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1管吸入 (1時間以上あけて、1日4回まで)
56	5:気管支喘息	23~26Kg	インタール吸入液 1% 2 mL	15.00000	管	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1管吸入 (1時間以上あけて、1日4回まで)
57	5:気管支喘息	26~30Kg	インタール吸入液 1% 2 mL	15.00000	管	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1管吸入 (1時間以上あけて、1日4回まで)
58	5:気管支喘息	30~35Kg	インタール吸入液 1% 2 mL	15.00000	管	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1管吸入 (1時間以上あけて、1日4回まで)
59	5:気管支喘息	35~40Kg	インタール吸入液 1% 2 mL	15.00000	管	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1管吸入 (1時間以上あけて、1日4回まで)
60	5:気管支喘息	40Kg~	インタール吸入液 1% 2 mL	15.00000	管	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1管吸入 (1時間以上あけて、1日4回まで)
61	5:気管支喘息	~4Kg	オノドライシロップ 1 0 %	0.21000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	28
62	5:気管支喘息	4~6Kg	オノドライシロップ 1 0 %	0.28000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	28
63	5:気管支喘息	6~8Kg	オノドライシロップ 1 0 %	0.42000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	28
64	5:気管支喘息	8~10Kg	オノドライシロップ 1 0 %	0.56000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	28
65	5:気管支喘息	10~12Kg	オノドライシロップ 1 0 %	0.70000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	28
66	5:気管支喘息	12~14Kg	オノドライシロップ 1 0 %	0.84000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	28
67	5:気管支喘息	14~16Kg	オノドライシロップ 1 0 %	0.98000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	28
68	5:気管支喘息	16~18Kg	オノドライシロップ 1 0 %	1.12000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	28
69	5:気管支喘息	18~20Kg	オノドライシロップ 1 0 %	1.26000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	28
70	5:気管支喘息	20~23Kg	オノドライシロップ 1 0 %	1.40000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	28
71	5:気管支喘息	23~26Kg	オノドライシロップ 1 0 %	1.61000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	28
72	5:気管支喘息	26~30Kg	オノドライシロップ 1 0 %	1.82000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	28
73	5:気管支喘息	30~35Kg	オノドライシロップ 1 0 %	2.10000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	28
74	5:気管支喘息	35~40Kg	オノドライシロップ 1 0 %	2.45000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	28
75	5:気管支喘息	40Kg~	オノドライシロップ 1 0 %	2.80000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	28
76	5:気管支喘息	0ヶ月	キプレスチュアブル錠 5 m g	0.00000	錠	1:内服	7: 1 日 1 回夜に	28
77	5:気管支喘息	2ヶ月	キプレスチュアブル錠 5 m g	0.00000	錠	1:内服	7: 1 日 1 回夜に	28
78	5:気管支喘息	5ヶ月	キプレスチュアブル錠 5 m g	0.00000	錠	1:内服	7: 1 日 1 回夜に	28
79	5:気管支喘息	8ヶ月	キプレスチュアブル錠 5 m g	0.00000	錠	1:内服	7: 1 日 1 回夜に	28
80	5:気管支喘息	1~2歳	キプレスチュアブル錠 5 m g	0.00000	錠	1:内服	7: 1 日 1 回夜に	28
81	5:気管支喘息	3歳	キプレスチュアブル錠 5 m g	0.00000	錠	1:内服	7: 1 日 1 回夜に	28
82	5:気管支喘息	4歳	キプレスチュアブル錠 5 m g	0.00000	錠	1:内服	7: 1 日 1 回夜に	28
83	5:気管支喘息	5歳	キプレスチュアブル錠 5 m g	0.00000	錠	1:内服	7: 1 日 1 回夜に	28
84	5:気管支喘息	6歳	キプレスチュアブル錠 5 m g	1.00000	錠	1:内服	7: 1 日 1 回夜に	28
85	5:気管支喘息	7歳	キプレスチュアブル錠 5 m g	1.00000	錠	1:内服	7: 1 日 1 回夜に	28
86	5:気管支喘息	8歳	キプレスチュアブル錠 5 m g	1.00000	錠	1:内服	7: 1 日 1 回夜に	28

■気管支喘息選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
87	5:気管支喘息	9歳	キプレスチュアブル錠 5mg	1.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
88	5:気管支喘息	10歳	キプレスチュアブル錠 5mg	1.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
89	5:気管支喘息	11歳	キプレスチュアブル錠 5mg	1.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
90	5:気管支喘息	12歳~	キプレスチュアブル錠 5mg	1.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
91	5:気管支喘息	0ヶ月	キプレス細粒 4mg	0.00000	包	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
92	5:気管支喘息	2ヶ月	キプレス細粒 4mg	0.00000	包	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
93	5:気管支喘息	5ヶ月	キプレス細粒 4mg	0.00000	包	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
94	5:気管支喘息	8ヶ月	キプレス細粒 4mg	1.00000	包	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
95	5:気管支喘息	1~2歳	キプレス細粒 4mg	1.00000	包	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
96	5:気管支喘息	3歳	キプレス細粒 4mg	1.00000	包	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
97	5:気管支喘息	4歳	キプレス細粒 4mg	1.00000	包	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
98	5:気管支喘息	5歳	キプレス細粒 4mg	1.00000	包	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
99	5:気管支喘息	6歳	キプレス細粒 4mg	0.00000	包	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
100	5:気管支喘息	7歳	キプレス細粒 4mg	0.00000	包	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
101	5:気管支喘息	8歳	キプレス細粒 4mg	0.00000	包	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
102	5:気管支喘息	9歳	キプレス細粒 4mg	0.00000	包	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
103	5:気管支喘息	10歳	キプレス細粒 4mg	0.00000	包	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
104	5:気管支喘息	11歳	キプレス細粒 4mg	0.00000	包	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
105	5:気管支喘息	12歳~	キプレス細粒 4mg	0.00000	包	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
106	5:気管支喘息	0ヶ月	キプレス錠 10mg	0.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
107	5:気管支喘息	2ヶ月	キプレス錠 10mg	0.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
108	5:気管支喘息	5ヶ月	キプレス錠 10mg	0.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
109	5:気管支喘息	8ヶ月	キプレス錠 10mg	0.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
110	5:気管支喘息	1~2歳	キプレス錠 10mg	0.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
111	5:気管支喘息	3歳	キプレス錠 10mg	0.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
112	5:気管支喘息	4歳	キプレス錠 10mg	0.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
113	5:気管支喘息	5歳	キプレス錠 10mg	0.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
114	5:気管支喘息	6歳	キプレス錠 10mg	0.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
115	5:気管支喘息	7歳	キプレス錠 10mg	0.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
116	5:気管支喘息	8歳	キプレス錠 10mg	0.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
117	5:気管支喘息	9歳	キプレス錠 10mg	0.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
118	5:気管支喘息	10歳	キプレス錠 10mg	1.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
119	5:気管支喘息	11歳	キプレス錠 10mg	1.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
120	5:気管支喘息	12歳~	キプレス錠 10mg	1.00000	錠	1:内服	7: 1日 1回夜に	28
121	5:気管支喘息	0ヶ月	キュバール100エアゾール 15mg 8.7g (高用量400µg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10: 1日 2回朝夕に	1 1回2吸入
122	5:気管支喘息	2ヶ月	キュバール100エアゾール 15mg 8.7g (高用量400µg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10: 1日 2回朝夕に	1 1回2吸入
123	5:気管支喘息	5ヶ月	キュバール100エアゾール 15mg 8.7g (高用量400µg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10: 1日 2回朝夕に	1 1回2吸入
124	5:気管支喘息	8ヶ月	キュバール100エアゾール 15mg 8.7g (高用量400µg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10: 1日 2回朝夕に	1 1回2吸入
125	5:気管支喘息	1~2歳	キュバール100エアゾール 15mg 8.7g (高用量400µg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10: 1日 2回朝夕に	1 1回2吸入
126	5:気管支喘息	3歳	キュバール100エアゾール 15mg 8.7g (高用量400µg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10: 1日 2回朝夕に	1 1回2吸入
127	5:気管支喘息	4歳	キュバール100エアゾール 15mg 8.7g (高用量400µg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10: 1日 2回朝夕に	1 1回2吸入
128	5:気管支喘息	5歳	キュバール100エアゾール 15mg 8.7g (高用量400µg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10: 1日 2回朝夕に	1 1回2吸入
129	5:気管支喘息	6歳	キュバール100エアゾール 15mg 8.7g (高用量400µg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10: 1日 2回朝夕に	1 1回2吸入

■気管支喘息選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
130	5:気管支喘息	7歳	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (高用量400μg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回2吸入
131	5:気管支喘息	8歳	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (高用量400μg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回2吸入
132	5:気管支喘息	9歳	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (高用量400μg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回2吸入
133	5:気管支喘息	10歳	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (高用量400μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回2吸入
134	5:気管支喘息	11歳	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (高用量400μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回2吸入
135	5:気管支喘息	12歳~	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (高用量400μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回2吸入
136	5:気管支喘息	0ヶ月	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (中用量200μg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
137	5:気管支喘息	2ヶ月	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (中用量200μg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
138	5:気管支喘息	5ヶ月	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (中用量200μg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
139	5:気管支喘息	8ヶ月	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (中用量200μg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
140	5:気管支喘息	1~2歳	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (中用量200μg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
141	5:気管支喘息	3歳	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (中用量200μg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
142	5:気管支喘息	4歳	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (中用量200μg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
143	5:気管支喘息	5歳	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (中用量200μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
144	5:気管支喘息	6歳	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (中用量200μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
145	5:気管支喘息	7歳	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (中用量200μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
146	5:気管支喘息	8歳	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (中用量200μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
147	5:気管支喘息	9歳	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (中用量200μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
148	5:気管支喘息	10歳	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (中用量200μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
149	5:気管支喘息	11歳	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (中用量200μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
150	5:気管支喘息	12歳~	キュバル100エアゾール 15mg 8.7g (中用量200μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
151	5:気管支喘息	0ヶ月	キュバル50エアゾール 7mg 8.7g (低用量100μg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
152	5:気管支喘息	2ヶ月	キュバル50エアゾール 7mg 8.7g (低用量100μg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
153	5:気管支喘息	5ヶ月	キュバル50エアゾール 7mg 8.7g (低用量100μg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
154	5:気管支喘息	8ヶ月	キュバル50エアゾール 7mg 8.7g (低用量100μg/d)	0.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
155	5:気管支喘息	1~2歳	キュバル50エアゾール 7mg 8.7g (低用量100μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
156	5:気管支喘息	3歳	キュバル50エアゾール 7mg 8.7g (低用量100μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
157	5:気管支喘息	4歳	キュバル50エアゾール 7mg 8.7g (低用量100μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
158	5:気管支喘息	5歳	キュバル50エアゾール 7mg 8.7g (低用量100μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
159	5:気管支喘息	6歳	キュバル50エアゾール 7mg 8.7g (低用量100μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
160	5:気管支喘息	7歳	キュバル50エアゾール 7mg 8.7g (低用量100μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
161	5:気管支喘息	8歳	キュバル50エアゾール 7mg 8.7g (低用量100μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
162	5:気管支喘息	9歳	キュバル50エアゾール 7mg 8.7g (低用量100μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
163	5:気管支喘息	10歳	キュバル50エアゾール 7mg 8.7g (低用量100μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
164	5:気管支喘息	11歳	キュバル50エアゾール 7mg 8.7g (低用量100μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
165	5:気管支喘息	12歳~	キュバル50エアゾール 7mg 8.7g (低用量100μg/d)	1.00000	瓶	3:外用	10:1日2回朝夕に	1	1回1吸入
166	5:気管支喘息	0ヶ月	シムピコートタービュヘイラー30吸入	0.00000	キット	3:外用	4:1日2回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可(1回に3吸入まで)
167	5:気管支喘息	2ヶ月	シムピコートタービュヘイラー30吸入	0.00000	キット	3:外用	4:1日2回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可(1回に3吸入まで)
168	5:気管支喘息	5ヶ月	シムピコートタービュヘイラー30吸入	0.00000	キット	3:外用	4:1日2回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可(1回に3吸入まで)
169	5:気管支喘息	8ヶ月	シムピコートタービュヘイラー30吸入	0.00000	キット	3:外用	4:1日2回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可(1回に3吸入まで)
170	5:気管支喘息	1~2歳	シムピコートタービュヘイラー30吸入	0.00000	キット	3:外用	4:1日2回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可(1回に3吸入まで)
171	5:気管支喘息	3歳	シムピコートタービュヘイラー30吸入	0.00000	キット	3:外用	4:1日2回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可(1回に3吸入まで)
172	5:気管支喘息	4歳	シムピコートタービュヘイラー30吸入	0.00000	キット	3:外用	4:1日2回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可(1回に3吸入まで)

■気管支喘息選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
173	5:気管支喘息	5歳	シムビコートタービュヘイラー 3 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可 (1回に3吸入まで)
174	5:気管支喘息	6歳	シムビコートタービュヘイラー 3 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可 (1回に3吸入まで)
175	5:気管支喘息	7歳	シムビコートタービュヘイラー 3 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可 (1回に3吸入まで)
176	5:気管支喘息	8歳	シムビコートタービュヘイラー 3 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可 (1回に3吸入まで)
177	5:気管支喘息	9歳	シムビコートタービュヘイラー 3 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可 (1回に3吸入まで)
178	5:気管支喘息	10歳	シムビコートタービュヘイラー 3 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可 (1回に3吸入まで)
179	5:気管支喘息	11歳	シムビコートタービュヘイラー 3 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可 (1回に3吸入まで)
180	5:気管支喘息	12歳~	シムビコートタービュヘイラー 3 0 吸入	1.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可 (1回に3吸入まで)
181	5:気管支喘息	0ヶ月	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可、1回3吸入まで
182	5:気管支喘息	2ヶ月	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可、1回3吸入まで
183	5:気管支喘息	5ヶ月	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可、1回3吸入まで
184	5:気管支喘息	8ヶ月	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可、1回3吸入まで
185	5:気管支喘息	1~2歳	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可、1回3吸入まで
186	5:気管支喘息	3歳	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可、1回3吸入まで
187	5:気管支喘息	4歳	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可、1回3吸入まで
188	5:気管支喘息	5歳	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可、1回3吸入まで
189	5:気管支喘息	6歳	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可、1回3吸入まで
190	5:気管支喘息	7歳	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可、1回3吸入まで
191	5:気管支喘息	8歳	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可、1回3吸入まで
192	5:気管支喘息	9歳	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可、1回3吸入まで
193	5:気管支喘息	10歳	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可、1回3吸入まで
194	5:気管支喘息	11歳	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入	0.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可、1回3吸入まで
195	5:気管支喘息	12歳~	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入	1.00000	キット	3:外用	4: 1 日 2 回	0	1回1吸入、ひどいとき連続吸入可、1回3吸入まで
196	5:気管支喘息	0ヶ月	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (中用量 5 0 0 μ g / d)	0.00000	管	3:外用	10: 1 日 2 回朝夕に	1	1回1管吸入
197	5:気管支喘息	2ヶ月	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (中用量 5 0 0 μ g / d)	0.00000	管	3:外用	10: 1 日 2 回朝夕に	1	1回1管吸入
198	5:気管支喘息	5ヶ月	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (中用量 5 0 0 μ g / d)	0.00000	管	3:外用	10: 1 日 2 回朝夕に	1	1回1管吸入
199	5:気管支喘息	8ヶ月	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (中用量 5 0 0 μ g / d)	0.00000	管	3:外用	10: 1 日 2 回朝夕に	1	1回1管吸入
200	5:気管支喘息	1~2歳	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (中用量 5 0 0 μ g / d)	56.00000	管	3:外用	10: 1 日 2 回朝夕に	1	1回1管吸入
201	5:気管支喘息	3歳	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (中用量 5 0 0 μ g / d)	56.00000	管	3:外用	10: 1 日 2 回朝夕に	1	1回1管吸入
202	5:気管支喘息	4歳	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (中用量 5 0 0 μ g / d)	56.00000	管	3:外用	10: 1 日 2 回朝夕に	1	1回1管吸入
203	5:気管支喘息	5歳	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (中用量 5 0 0 μ g / d)	56.00000	管	3:外用	10: 1 日 2 回朝夕に	1	1回1管吸入
204	5:気管支喘息	6歳	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (中用量 5 0 0 μ g / d)	56.00000	管	3:外用	10: 1 日 2 回朝夕に	1	1回1管吸入
205	5:気管支喘息	7歳	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (中用量 5 0 0 μ g / d)	56.00000	管	3:外用	10: 1 日 2 回朝夕に	1	1回1管吸入
206	5:気管支喘息	8歳	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (中用量 5 0 0 μ g / d)	56.00000	管	3:外用	10: 1 日 2 回朝夕に	1	1回1管吸入
207	5:気管支喘息	9歳	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (中用量 5 0 0 μ g / d)	56.00000	管	3:外用	10: 1 日 2 回朝夕に	1	1回1管吸入
208	5:気管支喘息	10歳	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (中用量 5 0 0 μ g / d)	56.00000	管	3:外用	10: 1 日 2 回朝夕に	1	1回1管吸入
209	5:気管支喘息	11歳	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (中用量 5 0 0 μ g / d)	56.00000	管	3:外用	10: 1 日 2 回朝夕に	1	1回1管吸入
210	5:気管支喘息	12歳~	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (中用量 5 0 0 μ g / d)	56.00000	管	3:外用	10: 1 日 2 回朝夕に	1	1回1管吸入
211	5:気管支喘息	0ヶ月	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (低用量 2 5 0 μ g / d)	28.00000	管	3:外用	6: 1 日 1 回夕食後に	1	1回1管吸入
212	5:気管支喘息	2ヶ月	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (低用量 2 5 0 μ g / d)	28.00000	管	3:外用	6: 1 日 1 回夕食後に	1	1回1管吸入
213	5:気管支喘息	5ヶ月	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (低用量 2 5 0 μ g / d)	28.00000	管	3:外用	6: 1 日 1 回夕食後に	1	1回1管吸入
214	5:気管支喘息	8ヶ月	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (低用量 2 5 0 μ g / d)	28.00000	管	3:外用	6: 1 日 1 回夕食後に	1	1回1管吸入
215	5:気管支喘息	1~2歳	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L (低用量 2 5 0 μ g / d)	28.00000	管	3:外用	6: 1 日 1 回夕食後に	1	1回1管吸入

■気管支喘息選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容				
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
216	5:気管支喘息	3歳	バルミコート吸入液0. 25mg 2mL (低用量250μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
217	5:気管支喘息	4歳	バルミコート吸入液0. 25mg 2mL (低用量250μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
218	5:気管支喘息	5歳	バルミコート吸入液0. 25mg 2mL (低用量250μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
219	5:気管支喘息	6歳	バルミコート吸入液0. 25mg 2mL (低用量250μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
220	5:気管支喘息	7歳	バルミコート吸入液0. 25mg 2mL (低用量250μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
221	5:気管支喘息	8歳	バルミコート吸入液0. 25mg 2mL (低用量250μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
222	5:気管支喘息	9歳	バルミコート吸入液0. 25mg 2mL (低用量250μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
223	5:気管支喘息	10歳	バルミコート吸入液0. 25mg 2mL (低用量250μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
224	5:気管支喘息	11歳	バルミコート吸入液0. 25mg 2mL (低用量250μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
225	5:気管支喘息	12歳~	バルミコート吸入液0. 25mg 2mL (低用量250μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
226	5:気管支喘息	0ヶ月	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (高用量1000μg/d)	0.00000	管	3:外用	10: 1日2回朝夕に	1 1回1管吸入
227	5:気管支喘息	2ヶ月	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (高用量1000μg/d)	0.00000	管	3:外用	10: 1日2回朝夕に	1 1回1管吸入
228	5:気管支喘息	5ヶ月	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (高用量1000μg/d)	0.00000	管	3:外用	10: 1日2回朝夕に	1 1回1管吸入
229	5:気管支喘息	8ヶ月	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (高用量1000μg/d)	0.00000	管	3:外用	10: 1日2回朝夕に	1 1回1管吸入
230	5:気管支喘息	1~2歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (高用量1000μg/d)	0.00000	管	3:外用	10: 1日2回朝夕に	1 1回1管吸入
231	5:気管支喘息	3歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (高用量1000μg/d)	56.00000	管	3:外用	10: 1日2回朝夕に	1 1回1管吸入
232	5:気管支喘息	4歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (高用量1000μg/d)	56.00000	管	3:外用	10: 1日2回朝夕に	1 1回1管吸入
233	5:気管支喘息	5歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (高用量1000μg/d)	56.00000	管	3:外用	10: 1日2回朝夕に	1 1回1管吸入
234	5:気管支喘息	6歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (高用量1000μg/d)	56.00000	管	3:外用	10: 1日2回朝夕に	1 1回1管吸入
235	5:気管支喘息	7歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (高用量1000μg/d)	56.00000	管	3:外用	10: 1日2回朝夕に	1 1回1管吸入
236	5:気管支喘息	8歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (高用量1000μg/d)	56.00000	管	3:外用	10: 1日2回朝夕に	1 1回1管吸入
237	5:気管支喘息	9歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (高用量1000μg/d)	56.00000	管	3:外用	10: 1日2回朝夕に	1 1回1管吸入
238	5:気管支喘息	10歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (高用量1000μg/d)	56.00000	管	3:外用	10: 1日2回朝夕に	1 1回1管吸入
239	5:気管支喘息	11歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (高用量1000μg/d)	56.00000	管	3:外用	10: 1日2回朝夕に	1 1回1管吸入
240	5:気管支喘息	12歳~	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (高用量1000μg/d)	56.00000	管	3:外用	10: 1日2回朝夕に	1 1回1管吸入
241	5:気管支喘息	0ヶ月	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (中用量500μg/d)	0.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
242	5:気管支喘息	2ヶ月	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (中用量500μg/d)	0.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
243	5:気管支喘息	5ヶ月	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (中用量500μg/d)	0.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
244	5:気管支喘息	8ヶ月	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (中用量500μg/d)	0.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
245	5:気管支喘息	1~2歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (中用量500μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
246	5:気管支喘息	3歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (中用量500μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
247	5:気管支喘息	4歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (中用量500μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
248	5:気管支喘息	5歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (中用量500μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
249	5:気管支喘息	6歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (中用量500μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
250	5:気管支喘息	7歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (中用量500μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
251	5:気管支喘息	8歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (中用量500μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
252	5:気管支喘息	9歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (中用量500μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
253	5:気管支喘息	10歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (中用量500μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
254	5:気管支喘息	11歳	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (中用量500μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
255	5:気管支喘息	12歳~	バルミコート吸入液0. 5mg 2mL (中用量500μg/d)	28.00000	管	3:外用	6: 1日1回夕食後に	1 1回1管吸入
256	5:気管支喘息	~4Kg	ブランカスト錠112. 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28
257	5:気管支喘息	4~6Kg	ブランカスト錠112. 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28
258	5:気管支喘息	6~8Kg	ブランカスト錠112. 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28

■気管支喘息選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容				
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
259	5:気管支喘息	8~10Kg	ブラルカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	28
260	5:気管支喘息	10~12Kg	ブラルカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	28
261	5:気管支喘息	12~14Kg	ブラルカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	28
262	5:気管支喘息	14~16Kg	ブラルカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	28
263	5:気管支喘息	16~18Kg	ブラルカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	28
264	5:気管支喘息	18~20Kg	ブラルカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	28
265	5:気管支喘息	20~23Kg	ブラルカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	28
266	5:気管支喘息	23~26Kg	ブラルカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	28
267	5:気管支喘息	26~30Kg	ブラルカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	28
268	5:気管支喘息	30~35Kg	ブラルカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	28
269	5:気管支喘息	35~40Kg	ブラルカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	28
270	5:気管支喘息	40Kg~	ブラルカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	28
271	5:気管支喘息	~4Kg	メブチンキッドエア-5μg吸入 1 0 0回 0 . 0 1 4 3 % 2 . 5mL	0.00000	キット	3:外用	4: 1日 2回	1 1回2吸入
272	5:気管支喘息	4~6Kg	メブチンキッドエア-5μg吸入 1 0 0回 0 . 0 1 4 3 % 2 . 5mL	0.00000	キット	3:外用	4: 1日 2回	1 1回2吸入
273	5:気管支喘息	6~8Kg	メブチンキッドエア-5μg吸入 1 0 0回 0 . 0 1 4 3 % 2 . 5mL	0.00000	キット	3:外用	4: 1日 2回	1 1回2吸入
274	5:気管支喘息	8~10Kg	メブチンキッドエア-5μg吸入 1 0 0回 0 . 0 1 4 3 % 2 . 5mL	0.00000	キット	3:外用	4: 1日 2回	1 1回2吸入
275	5:気管支喘息	10~12Kg	メブチンキッドエア-5μg吸入 1 0 0回 0 . 0 1 4 3 % 2 . 5mL	0.00000	キット	3:外用	4: 1日 2回	1 1回2吸入
276	5:気管支喘息	12~14Kg	メブチンキッドエア-5μg吸入 1 0 0回 0 . 0 1 4 3 % 2 . 5mL	0.00000	キット	3:外用	4: 1日 2回	1 1回2吸入
277	5:気管支喘息	14~16Kg	メブチンキッドエア-5μg吸入 1 0 0回 0 . 0 1 4 3 % 2 . 5mL	0.00000	キット	3:外用	4: 1日 2回	1 1回2吸入
278	5:気管支喘息	16~18Kg	メブチンキッドエア-5μg吸入 1 0 0回 0 . 0 1 4 3 % 2 . 5mL	1.00000	キット	3:外用	4: 1日 2回	1 1回2吸入
279	5:気管支喘息	18~20Kg	メブチンキッドエア-5μg吸入 1 0 0回 0 . 0 1 4 3 % 2 . 5mL	1.00000	キット	3:外用	4: 1日 2回	1 1回2吸入
280	5:気管支喘息	20~23Kg	メブチンキッドエア-5μg吸入 1 0 0回 0 . 0 1 4 3 % 2 . 5mL	1.00000	キット	3:外用	4: 1日 2回	1 1回2吸入
281	5:気管支喘息	23~26Kg	メブチンキッドエア-5μg吸入 1 0 0回 0 . 0 1 4 3 % 2 . 5mL	1.00000	キット	3:外用	4: 1日 2回	1 1回2吸入
282	5:気管支喘息	26~30Kg	メブチンキッドエア-5μg吸入 1 0 0回 0 . 0 1 4 3 % 2 . 5mL	1.00000	キット	3:外用	4: 1日 2回	1 1回2吸入
283	5:気管支喘息	30~35Kg	メブチンキッドエア-5μg吸入 1 0 0回 0 . 0 1 4 3 % 2 . 5mL	1.00000	キット	3:外用	4: 1日 2回	1 1回2吸入
284	5:気管支喘息	35~40Kg	メブチンキッドエア-5μg吸入 1 0 0回 0 . 0 1 4 3 % 2 . 5mL	1.00000	キット	3:外用	4: 1日 2回	1 1回2吸入
285	5:気管支喘息	40Kg~	メブチンキッドエア-5μg吸入 1 0 0回 0 . 0 1 4 3 % 2 . 5mL	1.00000	キット	3:外用	4: 1日 2回	1 1回2吸入
286	5:気管支喘息	~4Kg	メブチン吸入液ユニット0 . 3mL 0 . 0 1 %	15.00000	個	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1本、インタールに混じて、1時間以上あけて1日4回まで
287	5:気管支喘息	4~6Kg	メブチン吸入液ユニット0 . 3mL 0 . 0 1 %	15.00000	個	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1本、インタールに混じて、1時間以上あけて1日4回まで
288	5:気管支喘息	6~8Kg	メブチン吸入液ユニット0 . 3mL 0 . 0 1 %	15.00000	個	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1本、インタールに混じて、1時間以上あけて1日4回まで
289	5:気管支喘息	8~10Kg	メブチン吸入液ユニット0 . 3mL 0 . 0 1 %	15.00000	個	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1本、インタールに混じて、1時間以上あけて1日4回まで
290	5:気管支喘息	10~12Kg	メブチン吸入液ユニット0 . 3mL 0 . 0 1 %	15.00000	個	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1本、インタールに混じて、1時間以上あけて1日4回まで
291	5:気管支喘息	12~14Kg	メブチン吸入液ユニット0 . 3mL 0 . 0 1 %	15.00000	個	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1本、インタールに混じて、1時間以上あけて1日4回まで
292	5:気管支喘息	14~16Kg	メブチン吸入液ユニット0 . 3mL 0 . 0 1 %	15.00000	個	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1本、インタールに混じて、1時間以上あけて1日4回まで
293	5:気管支喘息	16~18Kg	メブチン吸入液ユニット0 . 3mL 0 . 0 1 %	15.00000	個	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1本、インタールに混じて、1時間以上あけて1日4回まで
294	5:気管支喘息	18~20Kg	メブチン吸入液ユニット0 . 3mL 0 . 0 1 %	15.00000	個	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1本、インタールに混じて、1時間以上あけて1日4回まで
295	5:気管支喘息	20~23Kg	メブチン吸入液ユニット0 . 3mL 0 . 0 1 %	15.00000	個	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1本、インタールに混じて、1時間以上あけて1日4回まで
296	5:気管支喘息	23~26Kg	メブチン吸入液ユニット0 . 3mL 0 . 0 1 %	15.00000	個	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1本、インタールに混じて、1時間以上あけて1日4回まで
297	5:気管支喘息	26~30Kg	メブチン吸入液ユニット0 . 3mL 0 . 0 1 %	15.00000	個	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1本、インタールに混じて、1時間以上あけて1日4回まで
298	5:気管支喘息	30~35Kg	メブチン吸入液ユニット0 . 3mL 0 . 0 1 %	15.00000	個	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1本、インタールに混じて、1時間以上あけて1日4回まで
299	5:気管支喘息	35~40Kg	メブチン吸入液ユニット0 . 3mL 0 . 0 1 %	15.00000	個	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1本、インタールに混じて、1時間以上あけて1日4回まで
300	5:気管支喘息	40Kg~	メブチン吸入液ユニット0 . 3mL 0 . 0 1 %	15.00000	個	3:外用	5:医師の指示通りに	1 1回1本、インタールに混じて、1時間以上あけて1日4回まで