

■ 溶連菌感染症選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
1	9:溶連菌感染症	~4Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3 処方後すぐ開始
2	9:溶連菌感染症	4~6Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3 処方後すぐ開始
3	9:溶連菌感染症	6~8Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3 処方後すぐ開始
4	9:溶連菌感染症	8~10Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3 処方後すぐ開始
5	9:溶連菌感染症	10~12Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3 処方後すぐ開始
6	9:溶連菌感染症	12~14Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3 処方後すぐ開始
7	9:溶連菌感染症	14~16Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3 処方後すぐ開始
8	9:溶連菌感染症	16~18Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	2.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3 処方後すぐ開始
9	9:溶連菌感染症	18~20Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	2.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3 処方後すぐ開始
10	9:溶連菌感染症	20~23Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	2.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3 処方後すぐ開始
11	9:溶連菌感染症	23~26Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	2.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3 処方後すぐ開始
12	9:溶連菌感染症	26~30Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	3.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3 処方後すぐ開始
13	9:溶連菌感染症	30~35Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	3.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3 処方後すぐ開始
14	9:溶連菌感染症	35~40Kg	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	4.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3 処方後すぐ開始
15	9:溶連菌感染症	40Kg~	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	4.00000	錠	1:内服	40:1日1回	3 処方後すぐ開始
16	9:溶連菌感染症	~4Kg	アンヒバ坐剤小児用100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 使用
17	9:溶連菌感染症	4~6Kg	アンヒバ坐剤小児用100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 使用
18	9:溶連菌感染症	6~8Kg	アンヒバ坐剤小児用100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 使用
19	9:溶連菌感染症	8~10Kg	アンヒバ坐剤小児用100mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
20	9:溶連菌感染症	10~12Kg	アンヒバ坐剤小児用100mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
21	9:溶連菌感染症	12~14Kg	アンヒバ坐剤小児用100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
22	9:溶連菌感染症	14~16Kg	アンヒバ坐剤小児用100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
23	9:溶連菌感染症	16~18Kg	アンヒバ坐剤小児用100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
24	9:溶連菌感染症	18~20Kg	アンヒバ坐剤小児用100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
25	9:溶連菌感染症	20~23Kg	アンヒバ坐剤小児用100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
26	9:溶連菌感染症	23~26Kg	アンヒバ坐剤小児用100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
27	9:溶連菌感染症	26~30Kg	アンヒバ坐剤小児用100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
28	9:溶連菌感染症	30~35Kg	アンヒバ坐剤小児用100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
29	9:溶連菌感染症	35~40Kg	アンヒバ坐剤小児用100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
30	9:溶連菌感染症	40Kg~	アンヒバ坐剤小児用100mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
31	9:溶連菌感染症	~4Kg	アンヒバ坐剤小児用200mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 個使用
32	9:溶連菌感染症	4~6Kg	アンヒバ坐剤小児用200mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 個使用
33	9:溶連菌感染症	6~8Kg	アンヒバ坐剤小児用200mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 個使用
34	9:溶連菌感染症	8~10Kg	アンヒバ坐剤小児用200mg	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 個使用
35	9:溶連菌感染症	10~12Kg	アンヒバ坐剤小児用200mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回2/3個使用
36	9:溶連菌感染症	12~14Kg	アンヒバ坐剤小児用200mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回2/3個使用
37	9:溶連菌感染症	14~16Kg	アンヒバ坐剤小児用200mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回3/4個使用
38	9:溶連菌感染症	16~18Kg	アンヒバ坐剤小児用200mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回4/5個使用
39	9:溶連菌感染症	18~20Kg	アンヒバ坐剤小児用200mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
40	9:溶連菌感染症	20~23Kg	アンヒバ坐剤小児用200mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
41	9:溶連菌感染症	23~26Kg	アンヒバ坐剤小児用200mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
42	9:溶連菌感染症	26~30Kg	アンヒバ坐剤小児用200mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
43	9:溶連菌感染症	30~35Kg	アンヒバ坐剤小児用200mg	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用

■ 溶連菌感染症選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
87	9:溶連菌感染症	26~30Kg	カロナール錠 2 0 0 2 0 0 mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
88	9:溶連菌感染症	30~35Kg	カロナール錠 2 0 0 2 0 0 mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
89	9:溶連菌感染症	35~40Kg	カロナール錠 2 0 0 2 0 0 mg	2.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
90	9:溶連菌感染症	40Kg~	カロナール錠 2 0 0 2 0 0 mg	2.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
91	9:溶連菌感染症	~4Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
92	9:溶連菌感染症	4~6Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
93	9:溶連菌感染症	6~8Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
94	9:溶連菌感染症	8~10Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
95	9:溶連菌感染症	10~12Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
96	9:溶連菌感染症	12~14Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
97	9:溶連菌感染症	14~16Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
98	9:溶連菌感染症	16~18Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
99	9:溶連菌感染症	18~20Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
100	9:溶連菌感染症	20~23Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
101	9:溶連菌感染症	23~26Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
102	9:溶連菌感染症	26~30Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
103	9:溶連菌感染症	30~35Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
104	9:溶連菌感染症	35~40Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
105	9:溶連菌感染症	40Kg~	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
106	9:溶連菌感染症	~4Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	0.40000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
107	9:溶連菌感染症	4~6Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	0.60000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
108	9:溶連菌感染症	6~8Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	0.80000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
109	9:溶連菌感染症	8~10Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	1.00000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
110	9:溶連菌感染症	10~12Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	1.20000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
111	9:溶連菌感染症	12~14Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	1.40000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
112	9:溶連菌感染症	14~16Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	1.60000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
113	9:溶連菌感染症	16~18Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	1.80000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
114	9:溶連菌感染症	18~20Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	2.00000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
115	9:溶連菌感染症	20~23Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	2.20000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
116	9:溶連菌感染症	23~26Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	2.60000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
117	9:溶連菌感染症	26~30Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	3.00000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
118	9:溶連菌感染症	30~35Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	3.50000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
119	9:溶連菌感染症	35~40Kg	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	4.00000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
120	9:溶連菌感染症	40Kg~	クラリスドライシロップ 1 0 %小児用 1 0 0 mg	4.00000	g	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
121	9:溶連菌感染症	~4Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
122	9:溶連菌感染症	4~6Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
123	9:溶連菌感染症	6~8Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
124	9:溶連菌感染症	8~10Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
125	9:溶連菌感染症	10~12Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
126	9:溶連菌感染症	12~14Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
127	9:溶連菌感染症	14~16Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
128	9:溶連菌感染症	16~18Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
129	9:溶連菌感染症	18~20Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	

■ 溶連菌感染症選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
130	9:溶連菌感染症	20~23Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
131	9:溶連菌感染症	23~26Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
132	9:溶連菌感染症	26~30Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
133	9:溶連菌感染症	30~35Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
134	9:溶連菌感染症	35~40Kg	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
135	9:溶連菌感染症	40Kg~	クラリス錠 2 0 0 2 0 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5	
136	9:溶連菌感染症	~4Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
137	9:溶連菌感染症	4~6Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
138	9:溶連菌感染症	6~8Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
139	9:溶連菌感染症	8~10Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
140	9:溶連菌感染症	10~12Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
141	9:溶連菌感染症	12~14Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
142	9:溶連菌感染症	14~16Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
143	9:溶連菌感染症	16~18Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	4.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
144	9:溶連菌感染症	18~20Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	4.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
145	9:溶連菌感染症	20~23Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	4.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
146	9:溶連菌感染症	23~26Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	5.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	朝2錠、夕3錠
147	9:溶連菌感染症	26~30Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	6.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
148	9:溶連菌感染症	30~35Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	6.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
149	9:溶連菌感染症	35~40Kg	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
150	9:溶連菌感染症	40Kg~	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	
151	9:溶連菌感染症	~4Kg	コカルDS 4 0 % (カロナル)	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
152	9:溶連菌感染症	4~6Kg	コカルDS 4 0 % (カロナル)	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
153	9:溶連菌感染症	6~8Kg	コカルDS 4 0 % (カロナル)	0.20000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
154	9:溶連菌感染症	8~10Kg	コカルDS 4 0 % (カロナル)	0.25000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
155	9:溶連菌感染症	10~12Kg	コカルDS 4 0 % (カロナル)	0.30000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
156	9:溶連菌感染症	12~14Kg	コカルDS 4 0 % (カロナル)	0.35000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
157	9:溶連菌感染症	14~16Kg	コカルDS 4 0 % (カロナル)	0.40000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
158	9:溶連菌感染症	16~18Kg	コカルDS 4 0 % (カロナル)	0.45000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
159	9:溶連菌感染症	18~20Kg	コカルDS 4 0 % (カロナル)	0.50000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
160	9:溶連菌感染症	20~23Kg	コカルDS 4 0 % (カロナル)	0.60000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
161	9:溶連菌感染症	23~26Kg	コカルDS 4 0 % (カロナル)	0.65000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
162	9:溶連菌感染症	26~30Kg	コカルDS 4 0 % (カロナル)	0.75000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
163	9:溶連菌感染症	30~35Kg	コカルDS 4 0 % (カロナル)	0.90000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
164	9:溶連菌感染症	35~40Kg	コカルDS 4 0 % (カロナル)	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
165	9:溶連菌感染症	40Kg~	コカルDS 4 0 % (カロナル)	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
166	9:溶連菌感染症	~4Kg	ザワリン錠 2 5 0 溶連菌用	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	10日間全て飲みきって下さい
167	9:溶連菌感染症	4~6Kg	ザワリン錠 2 5 0 溶連菌用	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	10日間全て飲みきって下さい
168	9:溶連菌感染症	6~8Kg	ザワリン錠 2 5 0 溶連菌用	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	10日間全て飲みきって下さい
169	9:溶連菌感染症	8~10Kg	ザワリン錠 2 5 0 溶連菌用	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	10日間全て飲みきって下さい
170	9:溶連菌感染症	10~12Kg	ザワリン錠 2 5 0 溶連菌用	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	10日間全て飲みきって下さい
171	9:溶連菌感染症	12~14Kg	ザワリン錠 2 5 0 溶連菌用	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	10日間全て飲みきって下さい
172	9:溶連菌感染症	14~16Kg	ザワリン錠 2 5 0 溶連菌用	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	10日間全て飲みきって下さい

■ 溶連菌感染症選択時の処方表示内容一覧

※ 処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
173	9:溶連菌感染症	16~18Kg	ザワシリン錠 2.5 0 溶連菌用	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	10日間全て飲みきって下さい
174	9:溶連菌感染症	18~20Kg	ザワシリン錠 2.5 0 溶連菌用	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	10日間全て飲みきって下さい
175	9:溶連菌感染症	20~23Kg	ザワシリン錠 2.5 0 溶連菌用	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	10日間全て飲みきって下さい
176	9:溶連菌感染症	23~26Kg	ザワシリン錠 2.5 0 溶連菌用	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	10	10日間全て飲みきって下さい
177	9:溶連菌感染症	26~30Kg	ザワシリン錠 2.5 0 溶連菌用	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきって下さい
178	9:溶連菌感染症	30~35Kg	ザワシリン錠 2.5 0 溶連菌用	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきって下さい
179	9:溶連菌感染症	35~40Kg	ザワシリン錠 2.5 0 溶連菌用	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきって下さい
180	9:溶連菌感染症	40Kg~	ザワシリン錠 2.5 0 溶連菌用	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきって下さい
181	9:溶連菌感染症	0ヶ月	トランサミンシロップ 5%	2.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
182	9:溶連菌感染症	2ヶ月	トランサミンシロップ 5%	2.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
183	9:溶連菌感染症	5ヶ月	トランサミンシロップ 5%	4.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
184	9:溶連菌感染症	8ヶ月	トランサミンシロップ 5%	6.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
185	9:溶連菌感染症	1~2歳	トランサミンシロップ 5%	7.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
186	9:溶連菌感染症	3歳	トランサミンシロップ 5%	8.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
187	9:溶連菌感染症	4歳	トランサミンシロップ 5%	8.40000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
188	9:溶連菌感染症	5歳	トランサミンシロップ 5%	9.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
189	9:溶連菌感染症	6歳	トランサミンシロップ 5%	9.60000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
190	9:溶連菌感染症	7歳	トランサミンシロップ 5%	10.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
191	9:溶連菌感染症	8歳	トランサミンシロップ 5%	11.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
192	9:溶連菌感染症	9歳	トランサミンシロップ 5%	12.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
193	9:溶連菌感染症	10歳	トランサミンシロップ 5%	13.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
194	9:溶連菌感染症	11歳	トランサミンシロップ 5%	14.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
195	9:溶連菌感染症	12歳~	トランサミンシロップ 5%	15.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
196	9:溶連菌感染症	0ヶ月	トランサミン散 5.0%	0.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
197	9:溶連菌感染症	2ヶ月	トランサミン散 5.0%	0.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
198	9:溶連菌感染症	5ヶ月	トランサミン散 5.0%	0.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
199	9:溶連菌感染症	8ヶ月	トランサミン散 5.0%	0.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
200	9:溶連菌感染症	1~2歳	トランサミン散 5.0%	0.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
201	9:溶連菌感染症	3歳	トランサミン散 5.0%	0.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
202	9:溶連菌感染症	4歳	トランサミン散 5.0%	0.90000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
203	9:溶連菌感染症	5歳	トランサミン散 5.0%	0.90000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
204	9:溶連菌感染症	6歳	トランサミン散 5.0%	1.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
205	9:溶連菌感染症	7歳	トランサミン散 5.0%	1.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
206	9:溶連菌感染症	8歳	トランサミン散 5.0%	1.10000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
207	9:溶連菌感染症	9歳	トランサミン散 5.0%	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
208	9:溶連菌感染症	10歳	トランサミン散 5.0%	1.30000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
209	9:溶連菌感染症	11歳	トランサミン散 5.0%	1.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
210	9:溶連菌感染症	12歳~	トランサミン散 5.0%	1.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
211	9:溶連菌感染症	0ヶ月	トランサミン錠 2.5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
212	9:溶連菌感染症	2ヶ月	トランサミン錠 2.5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
213	9:溶連菌感染症	5ヶ月	トランサミン錠 2.5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
214	9:溶連菌感染症	8ヶ月	トランサミン錠 2.5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
215	9:溶連菌感染症	1~2歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	

■ 溶連菌感染症選択時の処方表示内容一覧

※ 処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
216	9:溶連菌感染症	3歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
217	9:溶連菌感染症	4歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
218	9:溶連菌感染症	5歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
219	9:溶連菌感染症	6歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
220	9:溶連菌感染症	7歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
221	9:溶連菌感染症	8歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
222	9:溶連菌感染症	9歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
223	9:溶連菌感染症	10歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
224	9:溶連菌感染症	11歳	トランサミン錠 2.5 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
225	9:溶連菌感染症	12歳~	トランサミン錠 2.5 0 mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
226	9:溶連菌感染症	0ヶ月	パナンドライシロップ 5% 5 0 mg	0.00000	g	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
227	9:溶連菌感染症	2ヶ月	パナンドライシロップ 5% 5 0 mg	0.70000	g	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
228	9:溶連菌感染症	5ヶ月	パナンドライシロップ 5% 5 0 mg	1.00000	g	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
229	9:溶連菌感染症	8ヶ月	パナンドライシロップ 5% 5 0 mg	1.20000	g	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
230	9:溶連菌感染症	1~2歳	パナンドライシロップ 5% 5 0 mg	1.50000	g	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
231	9:溶連菌感染症	3歳	パナンドライシロップ 5% 5 0 mg	1.80000	g	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
232	9:溶連菌感染症	4歳	パナンドライシロップ 5% 5 0 mg	2.00000	g	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
233	9:溶連菌感染症	5歳	パナンドライシロップ 5% 5 0 mg	2.40000	g	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
234	9:溶連菌感染症	6歳	パナンドライシロップ 5% 5 0 mg	2.40000	g	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
235	9:溶連菌感染症	7歳	パナンドライシロップ 5% 5 0 mg	2.80000	g	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
236	9:溶連菌感染症	8歳	パナンドライシロップ 5% 5 0 mg	3.20000	g	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
237	9:溶連菌感染症	9歳	パナンドライシロップ 5% 5 0 mg	3.60000	g	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
238	9:溶連菌感染症	10歳	パナンドライシロップ 5% 5 0 mg	4.00000	g	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
239	9:溶連菌感染症	11歳	パナンドライシロップ 5% 5 0 mg	4.00000	g	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
240	9:溶連菌感染症	12歳~	パナンドライシロップ 5% 5 0 mg	4.00000	g	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
241	9:溶連菌感染症	0ヶ月	パナン錠 1 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
242	9:溶連菌感染症	2ヶ月	パナン錠 1 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
243	9:溶連菌感染症	5ヶ月	パナン錠 1 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
244	9:溶連菌感染症	8ヶ月	パナン錠 1 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
245	9:溶連菌感染症	1~2歳	パナン錠 1 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
246	9:溶連菌感染症	3歳	パナン錠 1 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
247	9:溶連菌感染症	4歳	パナン錠 1 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
248	9:溶連菌感染症	5歳	パナン錠 1 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
249	9:溶連菌感染症	6歳	パナン錠 1 0 0 mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
250	9:溶連菌感染症	7歳	パナン錠 1 0 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
251	9:溶連菌感染症	8歳	パナン錠 1 0 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
252	9:溶連菌感染症	9歳	パナン錠 1 0 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
253	9:溶連菌感染症	10歳	パナン錠 1 0 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
254	9:溶連菌感染症	11歳	パナン錠 1 0 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
255	9:溶連菌感染症	12歳~	パナン錠 1 0 0 mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	7
256	9:溶連菌感染症	~4Kg	ピオフェルミンR 散	0.20000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	10
257	9:溶連菌感染症	4~6Kg	ピオフェルミンR 散	0.30000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	10
258	9:溶連菌感染症	6~8Kg	ピオフェルミンR 散	0.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	10

■ 溶連菌感染症選択時の処方表示内容一覧

※ 処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
259	9:溶連菌感染症	8~10Kg	ピオフェルミンR 散	0.60000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	10
260	9:溶連菌感染症	10~12Kg	ピオフェルミンR 散	0.90000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	10
261	9:溶連菌感染症	12~14Kg	ピオフェルミンR 散	1.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	10
262	9:溶連菌感染症	14~16Kg	ピオフェルミンR 散	1.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	10
263	9:溶連菌感染症	16~18Kg	ピオフェルミンR 散	1.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	10
264	9:溶連菌感染症	18~20Kg	ピオフェルミンR 散	1.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	10
265	9:溶連菌感染症	20~23Kg	ピオフェルミンR 散	1.80000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	10
266	9:溶連菌感染症	23~26Kg	ピオフェルミンR 散	2.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	10
267	9:溶連菌感染症	26~30Kg	ピオフェルミンR 散	2.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	10
268	9:溶連菌感染症	30~35Kg	ピオフェルミンR 散	3.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	10
269	9:溶連菌感染症	35~40Kg	ピオフェルミンR 散	3.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	10
270	9:溶連菌感染症	40Kg~	ピオフェルミンR 散	3.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	10
271	9:溶連菌感染症	0ヶ月	ピオフェルミンR 錠	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
272	9:溶連菌感染症	2ヶ月	ピオフェルミンR 錠	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
273	9:溶連菌感染症	5ヶ月	ピオフェルミンR 錠	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
274	9:溶連菌感染症	8ヶ月	ピオフェルミンR 錠	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
275	9:溶連菌感染症	1~2歳	ピオフェルミンR 錠	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
276	9:溶連菌感染症	3歳	ピオフェルミンR 錠	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
277	9:溶連菌感染症	4歳	ピオフェルミンR 錠	0.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
278	9:溶連菌感染症	5歳	ピオフェルミンR 錠	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
279	9:溶連菌感染症	6歳	ピオフェルミンR 錠	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
280	9:溶連菌感染症	7歳	ピオフェルミンR 錠	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
281	9:溶連菌感染症	8歳	ピオフェルミンR 錠	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	5
282	9:溶連菌感染症	9歳	ピオフェルミンR 錠	3.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
283	9:溶連菌感染症	10歳	ピオフェルミンR 錠	3.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
284	9:溶連菌感染症	11歳	ピオフェルミンR 錠	3.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
285	9:溶連菌感染症	12歳~	ピオフェルミンR 錠	3.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
286	9:溶連菌感染症	~4Kg	メリアクトM S小児用細粒 10% 100mg	0.35000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	7
287	9:溶連菌感染症	4~6Kg	メリアクトM S小児用細粒 10% 100mg	0.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	7
288	9:溶連菌感染症	6~8Kg	メリアクトM S小児用細粒 10% 100mg	0.70000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	7
289	9:溶連菌感染症	8~10Kg	メリアクトM S小児用細粒 10% 100mg	0.90000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	7
290	9:溶連菌感染症	10~12Kg	メリアクトM S小児用細粒 10% 100mg	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	7
291	9:溶連菌感染症	12~14Kg	メリアクトM S小児用細粒 10% 100mg	1.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	7
292	9:溶連菌感染症	14~16Kg	メリアクトM S小児用細粒 10% 100mg	1.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	7
293	9:溶連菌感染症	16~18Kg	メリアクトM S小児用細粒 10% 100mg	1.60000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	7
294	9:溶連菌感染症	18~20Kg	メリアクトM S小児用細粒 10% 100mg	1.80000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	7
295	9:溶連菌感染症	20~23Kg	メリアクトM S小児用細粒 10% 100mg	2.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	7
296	9:溶連菌感染症	23~26Kg	メリアクトM S小児用細粒 10% 100mg	2.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	7
297	9:溶連菌感染症	26~30Kg	メリアクトM S小児用細粒 10% 100mg	2.60000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	7
298	9:溶連菌感染症	30~35Kg	メリアクトM S小児用細粒 10% 100mg	3.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	7
299	9:溶連菌感染症	35~40Kg	メリアクトM S小児用細粒 10% 100mg	3.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	7
300	9:溶連菌感染症	40Kg~	メリアクトM S小児用細粒 10% 100mg	3.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	7
301	9:溶連菌感染症	~4Kg	メリアクトM S錠 100mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	7

■ 溶連菌感染症選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
302	9:溶連菌感染症	4~6Kg	メイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	7	
303	9:溶連菌感染症	6~8Kg	メイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	7	
304	9:溶連菌感染症	8~10Kg	メイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	7	
305	9:溶連菌感染症	10~12Kg	メイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	7	
306	9:溶連菌感染症	12~14Kg	メイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	7	
307	9:溶連菌感染症	14~16Kg	メイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	7	
308	9:溶連菌感染症	16~18Kg	メイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	7	
309	9:溶連菌感染症	18~20Kg	メイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	7	
310	9:溶連菌感染症	20~23Kg	メイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	7	
311	9:溶連菌感染症	23~26Kg	メイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	7	
312	9:溶連菌感染症	26~30Kg	メイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	7	
313	9:溶連菌感染症	30~35Kg	メイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	7	
314	9:溶連菌感染症	35~40Kg	メイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	7	
315	9:溶連菌感染症	40Kg~	メイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	7	
316	9:溶連菌感染症	~4Kg	ワイドシリン細粒 2 0 %溶連菌用	0.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきってください
317	9:溶連菌感染症	4~6Kg	ワイドシリン細粒 2 0 %溶連菌用	0.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきってください
318	9:溶連菌感染症	6~8Kg	ワイドシリン細粒 2 0 %溶連菌用	1.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきってください
319	9:溶連菌感染症	8~10Kg	ワイドシリン細粒 2 0 %溶連菌用	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきってください
320	9:溶連菌感染症	10~12Kg	ワイドシリン細粒 2 0 %溶連菌用	1.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきってください
321	9:溶連菌感染症	12~14Kg	ワイドシリン細粒 2 0 %溶連菌用	1.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきってください
322	9:溶連菌感染症	14~16Kg	ワイドシリン細粒 2 0 %溶連菌用	2.10000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきってください
323	9:溶連菌感染症	16~18Kg	ワイドシリン細粒 2 0 %溶連菌用	2.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきってください
324	9:溶連菌感染症	18~20Kg	ワイドシリン細粒 2 0 %溶連菌用	2.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきってください
325	9:溶連菌感染症	20~23Kg	ワイドシリン細粒 2 0 %溶連菌用	3.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきってください
326	9:溶連菌感染症	23~26Kg	ワイドシリン細粒 2 0 %溶連菌用	3.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきってください
327	9:溶連菌感染症	26~30Kg	ワイドシリン細粒 2 0 %溶連菌用	3.75000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきってください
328	9:溶連菌感染症	30~35Kg	ワイドシリン細粒 2 0 %溶連菌用	3.75000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきってください
329	9:溶連菌感染症	35~40Kg	ワイドシリン細粒 2 0 %溶連菌用	3.75000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきってください
330	9:溶連菌感染症	40Kg~	ワイドシリン細粒 2 0 %溶連菌用	3.75000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	10	10日間全て飲みきってください