

■水痘選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
1	10:水痘	~4Kg	アストリックドライシロップ 8 0 %	0.30000	g	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5	
2	10:水痘	4~6Kg	アストリックドライシロップ 8 0 %	0.40000	g	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5	
3	10:水痘	6~8Kg	アストリックドライシロップ 8 0 %	0.60000	g	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5	
4	10:水痘	8~10Kg	アストリックドライシロップ 8 0 %	0.80000	g	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5	
5	10:水痘	10~12Kg	アストリックドライシロップ 8 0 %	1.00000	g	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5	
6	10:水痘	12~14Kg	アストリックドライシロップ 8 0 %	1.20000	g	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5	
7	10:水痘	14~16Kg	アストリックドライシロップ 8 0 %	1.40000	g	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5	
8	10:水痘	16~18Kg	アストリックドライシロップ 8 0 %	1.60000	g	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5	
9	10:水痘	18~20Kg	アストリックドライシロップ 8 0 %	1.80000	g	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5	
10	10:水痘	20~23Kg	アストリックドライシロップ 8 0 %	2.00000	g	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5	
11	10:水痘	23~26Kg	アストリックドライシロップ 8 0 %	2.30000	g	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5	
12	10:水痘	26~30Kg	アストリックドライシロップ 8 0 %	2.60000	g	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5	
13	10:水痘	30~35Kg	アストリックドライシロップ 8 0 %	3.00000	g	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5	
14	10:水痘	35~40Kg	アストリックドライシロップ 8 0 %	3.60000	g	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5	
15	10:水痘	40Kg~	アストリックドライシロップ 8 0 %	4.00000	g	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5	
16	10:水痘	~4Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 使用
17	10:水痘	4~6Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 使用
18	10:水痘	6~8Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 使用
19	10:水痘	8~10Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
20	10:水痘	10~12Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
21	10:水痘	12~14Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
22	10:水痘	14~16Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
23	10:水痘	16~18Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
24	10:水痘	18~20Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
25	10:水痘	20~23Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
26	10:水痘	23~26Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
27	10:水痘	26~30Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
28	10:水痘	30~35Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
29	10:水痘	35~40Kg	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
30	10:水痘	40Kg~	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
31	10:水痘	~4Kg	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 個使用
32	10:水痘	4~6Kg	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 個使用
33	10:水痘	6~8Kg	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 個使用
34	10:水痘	8~10Kg	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 / 個使用
35	10:水痘	10~12Kg	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回2/3個使用
36	10:水痘	12~14Kg	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回2/3個使用
37	10:水痘	14~16Kg	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回2/3個使用
38	10:水痘	16~18Kg	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回4/5個使用
39	10:水痘	18~20Kg	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
40	10:水痘	20~23Kg	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
41	10:水痘	23~26Kg	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
42	10:水痘	26~30Kg	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
43	10:水痘	30~35Kg	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用

■水痘選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
44	10:水痘	35~40Kg	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	2.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回2個使用
45	10:水痘	40Kg~	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	2.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回2個使用
46	10:水痘	~4Kg	アンヒバ坐剤小児用 5 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
47	10:水痘	4~6Kg	アンヒバ坐剤小児用 5 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
48	10:水痘	6~8Kg	アンヒバ坐剤小児用 5 0 m g	1.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回1個使用
49	10:水痘	8~10Kg	アンヒバ坐剤小児用 5 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
50	10:水痘	10~12Kg	アンヒバ坐剤小児用 5 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
51	10:水痘	12~14Kg	アンヒバ坐剤小児用 5 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
52	10:水痘	14~16Kg	アンヒバ坐剤小児用 5 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
53	10:水痘	16~18Kg	アンヒバ坐剤小児用 5 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
54	10:水痘	18~20Kg	アンヒバ坐剤小児用 5 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
55	10:水痘	20~23Kg	アンヒバ坐剤小児用 5 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
56	10:水痘	23~26Kg	アンヒバ坐剤小児用 5 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
57	10:水痘	26~30Kg	アンヒバ坐剤小児用 5 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
58	10:水痘	30~35Kg	アンヒバ坐剤小児用 5 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
59	10:水痘	35~40Kg	アンヒバ坐剤小児用 5 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
60	10:水痘	40Kg~	アンヒバ坐剤小児用 5 0 m g	0.00000	個	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて、1回 個使用
61	10:水痘	~4Kg	カチリ「ホエイ」	30.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	発疹部に塗布
62	10:水痘	4~6Kg	カチリ「ホエイ」	30.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	発疹部に塗布
63	10:水痘	6~8Kg	カチリ「ホエイ」	30.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	発疹部に塗布
64	10:水痘	8~10Kg	カチリ「ホエイ」	30.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	発疹部に塗布
65	10:水痘	10~12Kg	カチリ「ホエイ」	30.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	発疹部に塗布
66	10:水痘	12~14Kg	カチリ「ホエイ」	30.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	発疹部に塗布
67	10:水痘	14~16Kg	カチリ「ホエイ」	30.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	発疹部に塗布
68	10:水痘	16~18Kg	カチリ「ホエイ」	30.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	発疹部に塗布
69	10:水痘	18~20Kg	カチリ「ホエイ」	30.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	発疹部に塗布
70	10:水痘	20~23Kg	カチリ「ホエイ」	30.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	発疹部に塗布
71	10:水痘	23~26Kg	カチリ「ホエイ」	30.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	発疹部に塗布
72	10:水痘	26~30Kg	カチリ「ホエイ」	30.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	発疹部に塗布
73	10:水痘	30~35Kg	カチリ「ホエイ」	30.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	発疹部に塗布
74	10:水痘	35~40Kg	カチリ「ホエイ」	30.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	発疹部に塗布
75	10:水痘	40Kg~	カチリ「ホエイ」	30.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	発疹部に塗布
76	10:水痘	~4Kg	カロナールシロップ 2%	0.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
77	10:水痘	4~6Kg	カロナールシロップ 2%	0.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
78	10:水痘	6~8Kg	カロナールシロップ 2%	4.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
79	10:水痘	8~10Kg	カロナールシロップ 2%	5.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
80	10:水痘	10~12Kg	カロナールシロップ 2%	6.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
81	10:水痘	12~14Kg	カロナールシロップ 2%	7.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
82	10:水痘	14~16Kg	カロナールシロップ 2%	8.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
83	10:水痘	16~18Kg	カロナールシロップ 2%	9.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
84	10:水痘	18~20Kg	カロナールシロップ 2%	10.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
85	10:水痘	20~23Kg	カロナールシロップ 2%	11.50000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
86	10:水痘	23~26Kg	カロナールシロップ 2%	13.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて

■水痘選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢		選択した症状、薬剤から表示される処方内容							
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
87	10:水痘	26~30Kg	カロナルシロップ 2%	15.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
88	10:水痘	30~35Kg	カロナルシロップ 2%	17.50000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
89	10:水痘	35~40Kg	カロナルシロップ 2%	20.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
90	10:水痘	40Kg~	カロナルシロップ 2%	20.00000	m L	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
91	10:水痘	~4Kg	コカルDS 4 0%(カロナル)	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
92	10:水痘	4~6Kg	コカルDS 4 0%(カロナル)	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
93	10:水痘	6~8Kg	コカルDS 4 0%(カロナル)	0.20000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
94	10:水痘	8~10Kg	コカルDS 4 0%(カロナル)	0.25000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
95	10:水痘	10~12Kg	コカルDS 4 0%(カロナル)	0.30000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
96	10:水痘	12~14Kg	コカルDS 4 0%(カロナル)	0.35000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
97	10:水痘	14~16Kg	コカルDS 4 0%(カロナル)	0.40000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
98	10:水痘	16~18Kg	コカルDS 4 0%(カロナル)	0.45000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
99	10:水痘	18~20Kg	コカルDS 4 0%(カロナル)	0.50000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
100	10:水痘	20~23Kg	コカルDS 4 0%(カロナル)	0.60000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
101	10:水痘	23~26Kg	コカルDS 4 0%(カロナル)	0.65000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
102	10:水痘	26~30Kg	コカルDS 4 0%(カロナル)	0.75000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
103	10:水痘	30~35Kg	コカルDS 4 0%(カロナル)	0.90000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
104	10:水痘	35~40Kg	コカルDS 4 0%(カロナル)	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
105	10:水痘	40Kg~	コカルDS 4 0%(カロナル)	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
106	10:水痘	~4Kg	バルトレックス錠 5 0 0 5 0 0 mg (1日3回)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
107	10:水痘	4~6Kg	バルトレックス錠 5 0 0 5 0 0 mg (1日3回)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
108	10:水痘	6~8Kg	バルトレックス錠 5 0 0 5 0 0 mg (1日3回)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
109	10:水痘	8~10Kg	バルトレックス錠 5 0 0 5 0 0 mg (1日3回)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
110	10:水痘	10~12Kg	バルトレックス錠 5 0 0 5 0 0 mg (1日3回)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
111	10:水痘	12~14Kg	バルトレックス錠 5 0 0 5 0 0 mg (1日3回)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
112	10:水痘	14~16Kg	バルトレックス錠 5 0 0 5 0 0 mg (1日3回)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
113	10:水痘	16~18Kg	バルトレックス錠 5 0 0 5 0 0 mg (1日3回)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
114	10:水痘	18~20Kg	バルトレックス錠 5 0 0 5 0 0 mg (1日3回)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
115	10:水痘	20~23Kg	バルトレックス錠 5 0 0 5 0 0 mg (1日3回)	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
116	10:水痘	23~26Kg	バルトレックス錠 5 0 0 5 0 0 mg (1日3回)	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
117	10:水痘	26~30Kg	バルトレックス錠 5 0 0 5 0 0 mg (1日3回)	4.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	朝1錠、昼1錠、夕2錠
118	10:水痘	30~35Kg	バルトレックス錠 5 0 0 5 0 0 mg (1日3回)	4.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	朝1錠、昼1錠、夕2錠
119	10:水痘	35~40Kg	バルトレックス錠 5 0 0 5 0 0 mg (1日3回)	5.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	朝2錠、昼1錠、夕2錠
120	10:水痘	40Kg~	バルトレックス錠 5 0 0 5 0 0 mg (1日3回)	6.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
121	10:水痘	~4Kg	バルトレックス顆粒 5 0%	0.45000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
122	10:水痘	4~6Kg	バルトレックス顆粒 5 0%	0.60000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
123	10:水痘	6~8Kg	バルトレックス顆粒 5 0%	0.90000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
124	10:水痘	8~10Kg	バルトレックス顆粒 5 0%	1.20000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
125	10:水痘	10~12Kg	バルトレックス顆粒 5 0%	1.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
126	10:水痘	12~14Kg	バルトレックス顆粒 5 0%	1.90000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
127	10:水痘	14~16Kg	バルトレックス顆粒 5 0%	2.20000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
128	10:水痘	16~18Kg	バルトレックス顆粒 5 0%	2.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
129	10:水痘	18~20Kg	バルトレックス顆粒 5 0%	2.80000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	

■水痘選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
130	10:水痘	20~23Kg	バルトレックス顆粒 5 0 %	3.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
131	10:水痘	23~26Kg	バルトレックス顆粒 5 0 %	3.70000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
132	10:水痘	26~30Kg	バルトレックス顆粒 5 0 %	4.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
133	10:水痘	30~35Kg	バルトレックス顆粒 5 0 %	4.90000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
134	10:水痘	35~40Kg	バルトレックス顆粒 5 0 %	5.70000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
135	10:水痘	40Kg~	バルトレックス顆粒 5 0 %	6.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
136	10:水痘	~4Kg	ビクロックスシロップ 8 %	3.00000	m L	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5
137	10:水痘	4~6Kg	ビクロックスシロップ 8 %	4.00000	m L	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5
138	10:水痘	6~8Kg	ビクロックスシロップ 8 %	6.00000	m L	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5
139	10:水痘	8~10Kg	ビクロックスシロップ 8 %	8.00000	m L	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5
140	10:水痘	10~12Kg	ビクロックスシロップ 8 %	10.00000	m L	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5
141	10:水痘	12~14Kg	ビクロックスシロップ 8 %	12.00000	m L	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5
142	10:水痘	14~16Kg	ビクロックスシロップ 8 %	14.00000	m L	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5
143	10:水痘	16~18Kg	ビクロックスシロップ 8 %	16.00000	m L	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5
144	10:水痘	18~20Kg	ビクロックスシロップ 8 %	18.00000	m L	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5
145	10:水痘	20~23Kg	ビクロックスシロップ 8 %	20.00000	m L	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5
146	10:水痘	23~26Kg	ビクロックスシロップ 8 %	23.00000	m L	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5
147	10:水痘	26~30Kg	ビクロックスシロップ 8 %	26.00000	m L	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5
148	10:水痘	30~35Kg	ビクロックスシロップ 8 %	30.00000	m L	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5
149	10:水痘	35~40Kg	ビクロックスシロップ 8 %	36.00000	m L	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5
150	10:水痘	40Kg~	ビクロックスシロップ 8 %	40.00000	m L	1:内服	53: 1 日 4 回毎食後及び就寝前に	5