

■急性中耳炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
1	11:急性中耳炎	~4Kg オープメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
2	11:急性中耳炎	4~6Kg オープメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
3	11:急性中耳炎	6~8Kg オープメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
4	11:急性中耳炎	8~10Kg オープメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
5	11:急性中耳炎	10~12Kg オープメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
6	11:急性中耳炎	12~14Kg オープメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
7	11:急性中耳炎	14~16Kg オープメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
8	11:急性中耳炎	16~18Kg オープメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
9	11:急性中耳炎	18~20Kg オープメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
10	11:急性中耳炎	20~23Kg オープメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
11	11:急性中耳炎	23~26Kg オープメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
12	11:急性中耳炎	26~30Kg オープメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
13	11:急性中耳炎	30~35Kg オープメンチン配合錠 250RS 375mg	1.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
14	11:急性中耳炎	35~40Kg オープメンチン配合錠 250RS 375mg	1.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
15	11:急性中耳炎	40Kg~ オープメンチン配合錠 250RS 375mg	1.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
16	11:急性中耳炎	~4Kg カロナールシロップ 2%	0.00000	mL	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
17	11:急性中耳炎	4~6Kg カロナールシロップ 2%	0.00000	mL	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
18	11:急性中耳炎	6~8Kg カロナールシロップ 2%	4.00000	mL	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
19	11:急性中耳炎	8~10Kg カロナールシロップ 2%	5.00000	mL	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
20	11:急性中耳炎	10~12Kg カロナールシロップ 2%	6.00000	mL	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
21	11:急性中耳炎	12~14Kg カロナールシロップ 2%	7.00000	mL	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
22	11:急性中耳炎	14~16Kg カロナールシロップ 2%	8.00000	mL	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
23	11:急性中耳炎	16~18Kg カロナールシロップ 2%	9.00000	mL	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
24	11:急性中耳炎	18~20Kg カロナールシロップ 2%	10.00000	mL	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
25	11:急性中耳炎	20~23Kg カロナールシロップ 2%	11.50000	mL	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
26	11:急性中耳炎	23~26Kg カロナールシロップ 2%	13.00000	mL	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
27	11:急性中耳炎	26~30Kg カロナールシロップ 2%	15.00000	mL	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
28	11:急性中耳炎	30~35Kg カロナールシロップ 2%	17.50000	mL	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
29	11:急性中耳炎	35~40Kg カロナールシロップ 2%	20.00000	mL	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
30	11:急性中耳炎	40Kg~ カロナールシロップ 2%	20.00000	mL	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
31	11:急性中耳炎	~4Kg クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	0.00000	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
32	11:急性中耳炎	4~6Kg クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	0.00000	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
33	11:急性中耳炎	6~8Kg クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	1.01000	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
34	11:急性中耳炎	8~10Kg クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	1.01000	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
35	11:急性中耳炎	10~12Kg クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	2.02001	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
36	11:急性中耳炎	12~14Kg クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	2.02001	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
37	11:急性中耳炎	14~16Kg クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	2.02001	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
38	11:急性中耳炎	16~18Kg クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	3.03001	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
39	11:急性中耳炎	18~20Kg クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	3.03001	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
40	11:急性中耳炎	20~23Kg クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	3.03001	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
41	11:急性中耳炎	23~26Kg クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	4.04002	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
42	11:急性中耳炎	26~30Kg クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	4.04002	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
43	11:急性中耳炎	30~35Kg クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	5.05002	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて

■急性中耳炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
44	11:急性中耳炎	35~40Kg	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636. 5mg (分包装剤)	6.06002	g	1:内服	34: 1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
45	11:急性中耳炎	40Kg~	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636. 5mg (分包装剤)	0.00000	g	1:内服	34: 1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
46	11:急性中耳炎	~4Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
47	11:急性中耳炎	4~6Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
48	11:急性中耳炎	6~8Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.20000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
49	11:急性中耳炎	8~10Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.25000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
50	11:急性中耳炎	10~12Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.30000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
51	11:急性中耳炎	12~14Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.35000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
52	11:急性中耳炎	14~16Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.40000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
53	11:急性中耳炎	16~18Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.45000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
54	11:急性中耳炎	18~20Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.50000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
55	11:急性中耳炎	20~23Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.60000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
56	11:急性中耳炎	23~26Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.65000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
57	11:急性中耳炎	26~30Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.75000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
58	11:急性中耳炎	30~35Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	0.90000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
59	11:急性中耳炎	35~40Kg	コカルDS 4 0%(カロナール)	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
60	11:急性中耳炎	40Kg~	コカルDS 4 0%(カロナール)	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
61	11:急性中耳炎	~4Kg	サワシリン錠 250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
62	11:急性中耳炎	4~6Kg	サワシリン錠 250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
63	11:急性中耳炎	6~8Kg	サワシリン錠 250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
64	11:急性中耳炎	8~10Kg	サワシリン錠 250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
65	11:急性中耳炎	10~12Kg	サワシリン錠 250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
66	11:急性中耳炎	12~14Kg	サワシリン錠 250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
67	11:急性中耳炎	14~16Kg	サワシリン錠 250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
68	11:急性中耳炎	16~18Kg	サワシリン錠 250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
69	11:急性中耳炎	18~20Kg	サワシリン錠 250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
70	11:急性中耳炎	20~23Kg	サワシリン錠 250 250mg (高用量)	6.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
71	11:急性中耳炎	23~26Kg	サワシリン錠 250 250mg (高用量)	6.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
72	11:急性中耳炎	26~30Kg	サワシリン錠 250 250mg (高用量)	6.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
73	11:急性中耳炎	30~35Kg	サワシリン錠 250 250mg (高用量)	6.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
74	11:急性中耳炎	35~40Kg	サワシリン錠 250 250mg (高用量)	6.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
75	11:急性中耳炎	40Kg~	サワシリン錠 250 250mg (高用量)	6.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
76	11:急性中耳炎	~4Kg	サワシリン錠 250 250mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
77	11:急性中耳炎	4~6Kg	サワシリン錠 250 250mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
78	11:急性中耳炎	6~8Kg	サワシリン錠 250 250mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
79	11:急性中耳炎	8~10Kg	サワシリン錠 250 250mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
80	11:急性中耳炎	10~12Kg	サワシリン錠 250 250mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
81	11:急性中耳炎	12~14Kg	サワシリン錠 250 250mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
82	11:急性中耳炎	14~16Kg	サワシリン錠 250 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
83	11:急性中耳炎	16~18Kg	サワシリン錠 250 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
84	11:急性中耳炎	18~20Kg	サワシリン錠 250 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
85	11:急性中耳炎	20~23Kg	サワシリン錠 250 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
86	11:急性中耳炎	23~26Kg	サワシリン錠 250 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	

■急性中耳炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から薬剤量を算出される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
87	11:急性中耳炎	26~30Kg	ザワシリン錠 2.50 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
88	11:急性中耳炎	30~35Kg	ザワシリン錠 2.50 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
89	11:急性中耳炎	35~40Kg	ザワシリン錠 2.50 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
90	11:急性中耳炎	40Kg~	ザワシリン錠 2.50 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
91	11:急性中耳炎	~4Kg	ムコダインD S 5.0%	0.20000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
92	11:急性中耳炎	4~6Kg	ムコダインD S 5.0%	0.30000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
93	11:急性中耳炎	6~8Kg	ムコダインD S 5.0%	0.40000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
94	11:急性中耳炎	8~10Kg	ムコダインD S 5.0%	0.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
95	11:急性中耳炎	10~12Kg	ムコダインD S 5.0%	0.60000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
96	11:急性中耳炎	12~14Kg	ムコダインD S 5.0%	0.70000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
97	11:急性中耳炎	14~16Kg	ムコダインD S 5.0%	0.80000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
98	11:急性中耳炎	16~18Kg	ムコダインD S 5.0%	0.90000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
99	11:急性中耳炎	18~20Kg	ムコダインD S 5.0%	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
100	11:急性中耳炎	20~23Kg	ムコダインD S 5.0%	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
101	11:急性中耳炎	23~26Kg	ムコダインD S 5.0%	1.20000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
102	11:急性中耳炎	26~30Kg	ムコダインD S 5.0%	1.40000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
103	11:急性中耳炎	30~35Kg	ムコダインD S 5.0%	1.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
104	11:急性中耳炎	35~40Kg	ムコダインD S 5.0%	1.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
105	11:急性中耳炎	40Kg~	ムコダインD S 5.0%	1.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
106	11:急性中耳炎	~4Kg	ムコダインシロップ 5%	2.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
107	11:急性中耳炎	4~6Kg	ムコダインシロップ 5%	2.40000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
108	11:急性中耳炎	6~8Kg	ムコダインシロップ 5%	3.60000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
109	11:急性中耳炎	8~10Kg	ムコダインシロップ 5%	4.80000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
110	11:急性中耳炎	10~12Kg	ムコダインシロップ 5%	6.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
111	11:急性中耳炎	12~14Kg	ムコダインシロップ 5%	7.20000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
112	11:急性中耳炎	14~16Kg	ムコダインシロップ 5%	8.40000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
113	11:急性中耳炎	16~18Kg	ムコダインシロップ 5%	9.60000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
114	11:急性中耳炎	18~20Kg	ムコダインシロップ 5%	10.80000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
115	11:急性中耳炎	20~23Kg	ムコダインシロップ 5%	12.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
116	11:急性中耳炎	23~26Kg	ムコダインシロップ 5%	13.80000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
117	11:急性中耳炎	26~30Kg	ムコダインシロップ 5%	15.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
118	11:急性中耳炎	30~35Kg	ムコダインシロップ 5%	15.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
119	11:急性中耳炎	35~40Kg	ムコダインシロップ 5%	15.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
120	11:急性中耳炎	40Kg~	ムコダインシロップ 5%	15.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
121	11:急性中耳炎	~4Kg	マイアクトMS小児用細粒 1.0% 100mg (高用量)	0.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
122	11:急性中耳炎	4~6Kg	マイアクトMS小児用細粒 1.0% 100mg (高用量)	0.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
123	11:急性中耳炎	6~8Kg	マイアクトMS小児用細粒 1.0% 100mg (高用量)	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
124	11:急性中耳炎	8~10Kg	マイアクトMS小児用細粒 1.0% 100mg (高用量)	1.40000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
125	11:急性中耳炎	10~12Kg	マイアクトMS小児用細粒 1.0% 100mg (高用量)	1.80000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
126	11:急性中耳炎	12~14Kg	マイアクトMS小児用細粒 1.0% 100mg (高用量)	2.10000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
127	11:急性中耳炎	14~16Kg	マイアクトMS小児用細粒 1.0% 100mg (高用量)	2.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
128	11:急性中耳炎	16~18Kg	マイアクトMS小児用細粒 1.0% 100mg (高用量)	2.80000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
129	11:急性中耳炎	18~20Kg	マイアクトMS小児用細粒 1.0% 100mg (高用量)	3.20000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	

■急性中耳炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢		選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
130	11:急性中耳炎	20~23Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (高用量)	3.60000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
131	11:急性中耳炎	23~26Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (高用量)	4.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
132	11:急性中耳炎	26~30Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (高用量)	4.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
133	11:急性中耳炎	30~35Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (高用量)	5.40000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
134	11:急性中耳炎	35~40Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (高用量)	6.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
135	11:急性中耳炎	40Kg~	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (高用量)	6.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
136	11:急性中耳炎	~4Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	0.30000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
137	11:急性中耳炎	4~6Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	0.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
138	11:急性中耳炎	6~8Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	0.70000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
139	11:急性中耳炎	8~10Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	0.90000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
140	11:急性中耳炎	10~12Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	1.10000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
141	11:急性中耳炎	12~14Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	1.30000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
142	11:急性中耳炎	14~16Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	1.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
143	11:急性中耳炎	16~18Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	1.70000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
144	11:急性中耳炎	18~20Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	1.80000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
145	11:急性中耳炎	20~23Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	2.10000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
146	11:急性中耳炎	23~26Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	2.40000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
147	11:急性中耳炎	26~30Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	2.70000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
148	11:急性中耳炎	30~35Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
149	11:急性中耳炎	35~40Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
150	11:急性中耳炎	40Kg~	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
151	11:急性中耳炎	~4Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
152	11:急性中耳炎	4~6Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
153	11:急性中耳炎	6~8Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
154	11:急性中耳炎	8~10Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
155	11:急性中耳炎	10~12Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
156	11:急性中耳炎	12~14Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
157	11:急性中耳炎	14~16Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
158	11:急性中耳炎	16~18Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
159	11:急性中耳炎	18~20Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
160	11:急性中耳炎	20~23Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
161	11:急性中耳炎	23~26Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
162	11:急性中耳炎	26~30Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
163	11:急性中耳炎	30~35Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
164	11:急性中耳炎	35~40Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	6.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
165	11:急性中耳炎	40Kg~	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	6.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
166	11:急性中耳炎	~4Kg	マイアクトMS錠 100mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
167	11:急性中耳炎	4~6Kg	マイアクトMS錠 100mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
168	11:急性中耳炎	6~8Kg	マイアクトMS錠 100mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
169	11:急性中耳炎	8~10Kg	マイアクトMS錠 100mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
170	11:急性中耳炎	10~12Kg	マイアクトMS錠 100mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
171	11:急性中耳炎	12~14Kg	マイアクトMS錠 100mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
172	11:急性中耳炎	14~16Kg	マイアクトMS錠 100mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5

■急性中耳炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
173	11:急性中耳炎	16~18Kg	マイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
174	11:急性中耳炎	18~20Kg	マイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
175	11:急性中耳炎	20~23Kg	マイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
176	11:急性中耳炎	23~26Kg	マイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
177	11:急性中耳炎	26~30Kg	マイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
178	11:急性中耳炎	30~35Kg	マイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
179	11:急性中耳炎	35~40Kg	マイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
180	11:急性中耳炎	40Kg~	マイアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
181	11:急性中耳炎	~4Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
182	11:急性中耳炎	4~6Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	1.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
183	11:急性中耳炎	6~8Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	2.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
184	11:急性中耳炎	8~10Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	3.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
185	11:急性中耳炎	10~12Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	4.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
186	11:急性中耳炎	12~14Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	4.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
187	11:急性中耳炎	14~16Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	5.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
188	11:急性中耳炎	16~18Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	6.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
189	11:急性中耳炎	18~20Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	7.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
190	11:急性中耳炎	20~23Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	7.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
191	11:急性中耳炎	23~26Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	7.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
192	11:急性中耳炎	26~30Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	7.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
193	11:急性中耳炎	30~35Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	7.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
194	11:急性中耳炎	35~40Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	7.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
195	11:急性中耳炎	40Kg~	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	7.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
196	11:急性中耳炎	~4Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	0.45000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
197	11:急性中耳炎	4~6Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	0.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
198	11:急性中耳炎	6~8Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	0.90000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
199	11:急性中耳炎	8~10Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
200	11:急性中耳炎	10~12Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	1.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
201	11:急性中耳炎	12~14Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	1.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
202	11:急性中耳炎	14~16Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	2.10000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
203	11:急性中耳炎	16~18Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	2.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
204	11:急性中耳炎	18~20Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	2.70000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
205	11:急性中耳炎	20~23Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	3.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
206	11:急性中耳炎	23~26Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	3.45000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
207	11:急性中耳炎	26~30Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	3.75000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
208	11:急性中耳炎	30~35Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	3.75000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
209	11:急性中耳炎	35~40Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	3.75000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
210	11:急性中耳炎	40Kg~	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	3.75000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
211	11:急性中耳炎	~4Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.10000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
212	11:急性中耳炎	4~6Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.25000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
213	11:急性中耳炎	6~8Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.30000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
214	11:急性中耳炎	8~10Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.45000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
215	11:急性中耳炎	10~12Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5

■急性中耳炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
216	11:急性中耳炎	12~14Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	0.70000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
217	11:急性中耳炎	14~16Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	0.80000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
218	11:急性中耳炎	16~18Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	0.90000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
219	11:急性中耳炎	18~20Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
220	11:急性中耳炎	20~23Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	1.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
221	11:急性中耳炎	23~26Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	1.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
222	11:急性中耳炎	26~30Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	1.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
223	11:急性中耳炎	30~35Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	1.80000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
224	11:急性中耳炎	35~40Kg	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	2.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
225	11:急性中耳炎	40Kg~	小児用ムコソルバンD S 1. 5%	2.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
226	11:急性中耳炎	~4Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	0.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
227	11:急性中耳炎	4~6Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	1.20000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
228	11:急性中耳炎	6~8Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	1.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
229	11:急性中耳炎	8~10Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	2.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
230	11:急性中耳炎	10~12Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	3.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
231	11:急性中耳炎	12~14Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	3.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
232	11:急性中耳炎	14~16Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	4.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
233	11:急性中耳炎	16~18Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	4.50000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
234	11:急性中耳炎	18~20Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	5.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
235	11:急性中耳炎	20~23Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	6.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
236	11:急性中耳炎	23~26Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	6.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
237	11:急性中耳炎	26~30Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	7.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
238	11:急性中耳炎	30~35Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	9.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
239	11:急性中耳炎	35~40Kg	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	10.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
240	11:急性中耳炎	40Kg~	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	12.00000	m L	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	