

■急性副鼻腔炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
1	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
2	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
3	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
4	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
5	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
6	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
7	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
8	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
9	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
10	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
11	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
12	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
13	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
14	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
15	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
16	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
17	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
18	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
19	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
20	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
21	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
22	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
23	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
24	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
25	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
26	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
27	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 250RS 375mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
28	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 250RS 375mg	1.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
29	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 250RS 375mg	1.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
30	12:急性副鼻腔炎	オグメンチン配合錠 250RS 375mg	1.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	処方後内服開始
31	12:急性副鼻腔炎	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	0.00000	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
32	12:急性副鼻腔炎	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	0.00000	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
33	12:急性副鼻腔炎	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	1.01000	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
34	12:急性副鼻腔炎	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	1.01000	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
35	12:急性副鼻腔炎	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	2.02001	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
36	12:急性副鼻腔炎	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	2.02001	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
37	12:急性副鼻腔炎	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	2.02001	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
38	12:急性副鼻腔炎	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	3.03001	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
39	12:急性副鼻腔炎	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	3.03001	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
40	12:急性副鼻腔炎	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	3.03001	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
41	12:急性副鼻腔炎	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	4.04002	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
42	12:急性副鼻腔炎	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	4.04002	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
43	12:急性副鼻腔炎	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤)	5.05002	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて

■急性副鼻腔炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢		選択した症状、薬剤から表示される処方内容							
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
44	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636. 5mg (分包装剤)	6.06002	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
45	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636. 5mg (分包装剤)	0.00000	g	1:内服	34:1日2回朝夕食直前に	5	分包装剤にて
46	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	ザワシリン錠250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
47	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	ザワシリン錠250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
48	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	ザワシリン錠250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
49	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	ザワシリン錠250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
50	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	ザワシリン錠250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
51	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	ザワシリン錠250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
52	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	ザワシリン錠250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
53	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	ザワシリン錠250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
54	12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	ザワシリン錠250 250mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
55	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	ザワシリン錠250 250mg (高用量)	6.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
56	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	ザワシリン錠250 250mg (高用量)	6.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
57	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	ザワシリン錠250 250mg (高用量)	6.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
58	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	ザワシリン錠250 250mg (高用量)	6.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
59	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	ザワシリン錠250 250mg (高用量)	6.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
60	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	ザワシリン錠250 250mg (高用量)	6.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
61	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	ザワシリン錠250 250mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
62	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	ザワシリン錠250 250mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
63	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	ザワシリン錠250 250mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
64	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	ザワシリン錠250 250mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
65	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	ザワシリン錠250 250mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
66	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	ザワシリン錠250 250mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
67	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	ザワシリン錠250 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
68	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	ザワシリン錠250 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
69	12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	ザワシリン錠250 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
70	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	ザワシリン錠250 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
71	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	ザワシリン錠250 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
72	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	ザワシリン錠250 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
73	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	ザワシリン錠250 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
74	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	ザワシリン錠250 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
75	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	ザワシリン錠250 250mg (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
76	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	ブルフェン錠100 100mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	痛みが強いとき、8時間以上あけて使用
77	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	ブルフェン錠100 100mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	痛みが強いとき、8時間以上あけて使用
78	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	ブルフェン錠100 100mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	痛みが強いとき、8時間以上あけて使用
79	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	ブルフェン錠100 100mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	痛みが強いとき、8時間以上あけて使用
80	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	ブルフェン錠100 100mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	痛みが強いとき、8時間以上あけて使用
81	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	ブルフェン錠100 100mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	痛みが強いとき、8時間以上あけて使用
82	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	ブルフェン錠100 100mg	0.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	痛みが強いとき、8時間以上あけて使用
83	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	ブルフェン錠100 100mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	痛みが強いとき、8時間以上あけて使用
84	12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	ブルフェン錠100 100mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	痛みが強いとき、8時間以上あけて使用
85	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	ブルフェン錠100 100mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	痛みが強いとき、8時間以上あけて使用
86	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	ブルフェン錠100 100mg	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	痛みが強いとき、8時間以上あけて使用

■急性副鼻腔炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
87	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	ブルフェン錠 1 0 0 1 0 0 m g	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
88	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	ブルフェン錠 1 0 0 1 0 0 m g	2.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用、1日2回まで
89	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	ブルフェン錠 1 0 0 1 0 0 m g	2.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
90	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	ブルフェン錠 1 0 0 1 0 0 m g	2.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
91	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	ブルフェン顆粒 2 0 %	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
92	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	ブルフェン顆粒 2 0 %	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
93	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	ブルフェン顆粒 2 0 %	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
94	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	ブルフェン顆粒 2 0 %	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
95	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	ブルフェン顆粒 2 0 %	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
96	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	ブルフェン顆粒 2 0 %	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
97	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	ブルフェン顆粒 2 0 %	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
98	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	ブルフェン顆粒 2 0 %	0.50000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
99	12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	ブルフェン顆粒 2 0 %	0.50000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
100	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	ブルフェン顆粒 2 0 %	0.50000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
101	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	ブルフェン顆粒 2 0 %	0.60000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
102	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	ブルフェン顆粒 2 0 %	0.75000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
103	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	ブルフェン顆粒 2 0 %	0.75000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
104	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	ブルフェン顆粒 2 0 %	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
105	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	ブルフェン顆粒 2 0 %	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5 痛みが強いつき、8時間以上あけて使用
106	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	フロモックス錠 1 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
107	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	フロモックス錠 1 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
108	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	フロモックス錠 1 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
109	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	フロモックス錠 1 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
110	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	フロモックス錠 1 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
111	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	フロモックス錠 1 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
112	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	フロモックス錠 1 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
113	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	フロモックス錠 1 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
114	12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	フロモックス錠 1 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
115	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	フロモックス錠 1 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
116	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	フロモックス錠 1 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
117	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	フロモックス錠 1 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
118	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	フロモックス錠 1 0 0 m g	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
119	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	フロモックス錠 1 0 0 m g	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
120	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	フロモックス錠 1 0 0 m g	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
121	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	フロモックス錠 7 5 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
122	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	フロモックス錠 7 5 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
123	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	フロモックス錠 7 5 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
124	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	フロモックス錠 7 5 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
125	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	フロモックス錠 7 5 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
126	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	フロモックス錠 7 5 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
127	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	フロモックス錠 7 5 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
128	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	フロモックス錠 7 5 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
129	12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	フロモックス錠 7 5 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5

■急性副鼻腔炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。					
処方番号	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	選択した症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。					
				薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
130	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	フロモックス錠 7.5mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
131	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	フロモックス錠 7.5mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
132	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	フロモックス錠 7.5mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
133	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	フロモックス錠 7.5mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
134	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	フロモックス錠 7.5mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
135	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	フロモックス錠 7.5mg	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
136	12:急性副鼻腔炎	0ヶ月	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	
137	12:急性副鼻腔炎	2ヶ月	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	
138	12:急性副鼻腔炎	5ヶ月	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	
139	12:急性副鼻腔炎	8ヶ月	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	
140	12:急性副鼻腔炎	1~2歳	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	
141	12:急性副鼻腔炎	3歳	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	
142	12:急性副鼻腔炎	4歳	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	
143	12:急性副鼻腔炎	5歳	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	
144	12:急性副鼻腔炎	6歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	
145	12:急性副鼻腔炎	7歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	
146	12:急性副鼻腔炎	8歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	
147	12:急性副鼻腔炎	9歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	
148	12:急性副鼻腔炎	10歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	
149	12:急性副鼻腔炎	11歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5	
150	12:急性副鼻腔炎	12歳~	ムコソルバン錠 1.5mg	3.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
151	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	ムコダインD S 5.0%	0.20000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
152	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	ムコダインD S 5.0%	0.30000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
153	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	ムコダインD S 5.0%	0.40000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
154	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	ムコダインD S 5.0%	0.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
155	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	ムコダインD S 5.0%	0.60000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
156	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	ムコダインD S 5.0%	0.70000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
157	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	ムコダインD S 5.0%	0.80000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
158	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	ムコダインD S 5.0%	0.90000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
159	12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	ムコダインD S 5.0%	1.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
160	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	ムコダインD S 5.0%	1.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
161	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	ムコダインD S 5.0%	1.20000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
162	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	ムコダインD S 5.0%	1.40000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
163	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	ムコダインD S 5.0%	1.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
164	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	ムコダインD S 5.0%	1.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
165	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	ムコダインD S 5.0%	1.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
166	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	ムコダインシロップ 5%	2.00000	mL	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
167	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	ムコダインシロップ 5%	3.00000	mL	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
168	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	ムコダインシロップ 5%	4.00000	mL	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
169	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	ムコダインシロップ 5%	5.00000	mL	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
170	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	ムコダインシロップ 5%	6.00000	mL	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
171	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	ムコダインシロップ 5%	7.00000	mL	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	
172	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	ムコダインシロップ 5%	8.00000	mL	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5	

■急性副鼻腔炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。						
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	処方内容				日数 /回数	コメント
				薬剤量	単位	処方区分	用法		
173	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	ムコダインシロップ5%	9.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
174	12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	ムコダインシロップ5%	10.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
175	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	ムコダインシロップ5%	10.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
176	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	ムコダインシロップ5%	12.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
177	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
178	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
179	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
180	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	ムコダインシロップ5%	15.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
181	12:急性副鼻腔炎	0ヶ月	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
182	12:急性副鼻腔炎	2ヶ月	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
183	12:急性副鼻腔炎	5ヶ月	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
184	12:急性副鼻腔炎	8ヶ月	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
185	12:急性副鼻腔炎	1~2歳	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
186	12:急性副鼻腔炎	3歳	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
187	12:急性副鼻腔炎	4歳	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
188	12:急性副鼻腔炎	5歳	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
189	12:急性副鼻腔炎	6歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
190	12:急性副鼻腔炎	7歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
191	12:急性副鼻腔炎	8歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
192	12:急性副鼻腔炎	9歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
193	12:急性副鼻腔炎	10歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
194	12:急性副鼻腔炎	11歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
195	12:急性副鼻腔炎	12歳~	ムコダイン錠250mg	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
196	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
197	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
198	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
199	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
200	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
201	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
202	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
203	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
204	12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
205	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
206	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
207	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
208	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
209	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
210	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	ムコダイン錠500mg	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
211	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg (高用量)	0.54000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
212	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg (高用量)	0.72000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
213	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg (高用量)	1.08000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
214	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg (高用量)	1.44000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
215	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg (高用量)	1.80000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	

■急性副鼻腔炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢		選択した症状、薬剤から薬剤量を算出される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
216	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (高用量)	2.16000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
217	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (高用量)	2.52000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
218	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (高用量)	2.88000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
219	12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (高用量)	3.24000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
220	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (高用量)	3.60000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
221	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (高用量)	4.14000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
222	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (高用量)	4.68000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
223	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (高用量)	5.40000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
224	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (高用量)	6.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
225	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (高用量)	6.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
226	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	0.27000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
227	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	0.36000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
228	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	0.54000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
229	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	0.72000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
230	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	0.90000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
231	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	1.08000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
232	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	1.26000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
233	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	1.44000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
234	12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	1.62000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
235	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	1.80000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
236	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	2.07000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
237	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	2.34000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
238	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	2.70000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
239	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
240	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	マイアクトMS小児用細粒 10% 100mg (常用量)	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
241	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
242	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
243	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
244	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
245	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
246	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
247	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
248	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
249	12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
250	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
251	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
252	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
253	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
254	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	6.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
255	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	マイアクトMS錠 100mg (高用量)	6.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
256	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	マイアクトMS錠 100mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
257	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	マイアクトMS錠 100mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
258	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	マイアクトMS錠 100mg (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5

■急性副鼻腔炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
259	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	メアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
260	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	メアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
261	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	メアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
262	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	メアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
263	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	メアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
264	12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	メアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
265	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	メアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
266	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	メアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
267	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	メアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
268	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	メアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
269	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	メアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
270	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	メアクトMS錠 1 0 0 m g (常用量)	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
271	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	3日後に効果判定
272	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	1.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	3日後に効果判定
273	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	2.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	3日後に効果判定
274	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	3.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	3日後に効果判定
275	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	4.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	3日後に効果判定
276	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	4.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	3日後に効果判定
277	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	5.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	3日後に効果判定
278	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	6.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	3日後に効果判定
279	12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	7.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	3日後に効果判定
280	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	7.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	3日後に効果判定
281	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	7.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	3日後に効果判定
282	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	7.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	3日後に効果判定
283	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	7.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	3日後に効果判定
284	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	7.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	3日後に効果判定
285	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (高用量)	7.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	3日後に効果判定
286	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	0.45000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
287	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	0.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
288	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	0.90000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
289	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
290	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	1.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
291	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	1.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
292	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	2.10000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
293	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	2.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
294	12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	2.70000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
295	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	3.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
296	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	3.45000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
297	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	3.75000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
298	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	3.75000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
299	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	3.75000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
300	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	ワイドシリン細粒 2 0 % 2 0 0 m g (常用量)	3.75000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
301	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2 5 μ g 5 6 噴霧用 2 . 0 4 m g 4 m L	1.00000	瓶	3:外用	4: 1 日 2 回	1	両鼻に噴霧

■急性副鼻腔炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
302	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1 両鼻に噴霧
303	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1 両鼻に噴霧
304	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1 両鼻に噴霧
305	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1 両鼻に噴霧
306	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1 両鼻に噴霧
307	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1 両鼻に噴霧
308	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1 両鼻に噴霧
309	12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1 両鼻に噴霧
310	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1 両鼻に噴霧
311	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1 両鼻に噴霧
312	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1 両鼻に噴霧
313	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1 両鼻に噴霧
314	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1 両鼻に噴霧
315	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1 両鼻に噴霧
316	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	0.10000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
317	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	0.25000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
318	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	0.30000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
319	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	0.45000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
320	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	0.60000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
321	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	0.70000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
322	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	0.80000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
323	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	0.90000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
324	12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
325	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	1.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
326	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	1.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
327	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	1.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
328	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	1.80000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
329	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	2.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
330	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	小児用ムコソルバンD S 1.5%	2.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
331	12:急性副鼻腔炎	~4Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0.50000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
332	12:急性副鼻腔炎	4~6Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	1.20000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
333	12:急性副鼻腔炎	6~8Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	1.50000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
334	12:急性副鼻腔炎	8~10Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	2.50000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
335	12:急性副鼻腔炎	10~12Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	3.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
336	12:急性副鼻腔炎	12~14Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	3.50000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
337	12:急性副鼻腔炎	14~16Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	4.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
338	12:急性副鼻腔炎	16~18Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	4.50000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
339	12:急性副鼻腔炎	20~23Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	6.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
340	12:急性副鼻腔炎	23~26Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	6.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
341	12:急性副鼻腔炎	26~30Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	7.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
342	12:急性副鼻腔炎	30~35Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	9.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
343	12:急性副鼻腔炎	35~40Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	10.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5
344	12:急性副鼻腔炎	40Kg~	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	12.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5

■急性副鼻腔炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
345 12:急性副鼻腔炎	18~20Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	5.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	