

■慢性副鼻腔炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
1	13:慢性副鼻腔炎	~4Kg	クラリスドライシロップ 1.0%小児用 100mg	0.30000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
2	13:慢性副鼻腔炎	4~6Kg	クラリスドライシロップ 1.0%小児用 100mg	0.40000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
3	13:慢性副鼻腔炎	6~8Kg	クラリスドライシロップ 1.0%小児用 100mg	0.60000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
4	13:慢性副鼻腔炎	8~10Kg	クラリスドライシロップ 1.0%小児用 100mg	0.80000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
5	13:慢性副鼻腔炎	10~12Kg	クラリスドライシロップ 1.0%小児用 100mg	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
6	13:慢性副鼻腔炎	12~14Kg	クラリスドライシロップ 1.0%小児用 100mg	1.20000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
7	13:慢性副鼻腔炎	14~16Kg	クラリスドライシロップ 1.0%小児用 100mg	1.40000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
8	13:慢性副鼻腔炎	16~18Kg	クラリスドライシロップ 1.0%小児用 100mg	1.60000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
9	13:慢性副鼻腔炎	18~20Kg	クラリスドライシロップ 1.0%小児用 100mg	1.80000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
10	13:慢性副鼻腔炎	20~23Kg	クラリスドライシロップ 1.0%小児用 100mg	2.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
11	13:慢性副鼻腔炎	23~26Kg	クラリスドライシロップ 1.0%小児用 100mg	2.30000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
12	13:慢性副鼻腔炎	26~30Kg	クラリスドライシロップ 1.0%小児用 100mg	2.60000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
13	13:慢性副鼻腔炎	30~35Kg	クラリスドライシロップ 1.0%小児用 100mg	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
14	13:慢性副鼻腔炎	35~40Kg	クラリスドライシロップ 1.0%小児用 100mg	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
15	13:慢性副鼻腔炎	40Kg~	クラリスドライシロップ 1.0%小児用 100mg	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
16	13:慢性副鼻腔炎	~4Kg	クラリス錠 2.00 200mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
17	13:慢性副鼻腔炎	4~6Kg	クラリス錠 2.00 200mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
18	13:慢性副鼻腔炎	6~8Kg	クラリス錠 2.00 200mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
19	13:慢性副鼻腔炎	8~10Kg	クラリス錠 2.00 200mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
20	13:慢性副鼻腔炎	10~12Kg	クラリス錠 2.00 200mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
21	13:慢性副鼻腔炎	12~14Kg	クラリス錠 2.00 200mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
22	13:慢性副鼻腔炎	14~16Kg	クラリス錠 2.00 200mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
23	13:慢性副鼻腔炎	16~18Kg	クラリス錠 2.00 200mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
24	13:慢性副鼻腔炎	18~20Kg	クラリス錠 2.00 200mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
25	13:慢性副鼻腔炎	20~23Kg	クラリス錠 2.00 200mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
26	13:慢性副鼻腔炎	23~26Kg	クラリス錠 2.00 200mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
27	13:慢性副鼻腔炎	26~30Kg	クラリス錠 2.00 200mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
28	13:慢性副鼻腔炎	30~35Kg	クラリス錠 2.00 200mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
29	13:慢性副鼻腔炎	35~40Kg	クラリス錠 2.00 200mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
30	13:慢性副鼻腔炎	40Kg~	クラリス錠 2.00 200mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
31	13:慢性副鼻腔炎	~4Kg	クラリス錠 5.0小児用 50mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
32	13:慢性副鼻腔炎	4~6Kg	クラリス錠 5.0小児用 50mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
33	13:慢性副鼻腔炎	6~8Kg	クラリス錠 5.0小児用 50mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
34	13:慢性副鼻腔炎	8~10Kg	クラリス錠 5.0小児用 50mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
35	13:慢性副鼻腔炎	10~12Kg	クラリス錠 5.0小児用 50mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
36	13:慢性副鼻腔炎	12~14Kg	クラリス錠 5.0小児用 50mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
37	13:慢性副鼻腔炎	14~16Kg	クラリス錠 5.0小児用 50mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
38	13:慢性副鼻腔炎	16~18Kg	クラリス錠 5.0小児用 50mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
39	13:慢性副鼻腔炎	18~20Kg	クラリス錠 5.0小児用 50mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
40	13:慢性副鼻腔炎	20~23Kg	クラリス錠 5.0小児用 50mg	4.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
41	13:慢性副鼻腔炎	23~26Kg	クラリス錠 5.0小児用 50mg	4.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
42	13:慢性副鼻腔炎	26~30Kg	クラリス錠 5.0小児用 50mg	4.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5
43	13:慢性副鼻腔炎	30~35Kg	クラリス錠 5.0小児用 50mg	4.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5

■慢性副鼻腔炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
44	13:慢性副鼻腔炎	35~40Kg	クラリス錠 5 0小児用 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
45	13:慢性副鼻腔炎	40Kg~	クラリス錠 5 0小児用 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
46	13:慢性副鼻腔炎	0ヶ月	ムコソルバン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
47	13:慢性副鼻腔炎	2ヶ月	ムコソルバン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
48	13:慢性副鼻腔炎	5ヶ月	ムコソルバン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
49	13:慢性副鼻腔炎	8ヶ月	ムコソルバン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
50	13:慢性副鼻腔炎	1~2歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
51	13:慢性副鼻腔炎	3歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
52	13:慢性副鼻腔炎	4歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
53	13:慢性副鼻腔炎	5歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
54	13:慢性副鼻腔炎	6歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
55	13:慢性副鼻腔炎	7歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
56	13:慢性副鼻腔炎	8歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
57	13:慢性副鼻腔炎	9歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
58	13:慢性副鼻腔炎	10歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
59	13:慢性副鼻腔炎	11歳	ムコソルバン錠 1 5 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1 日 2 回朝夕食後に	5
60	13:慢性副鼻腔炎	12歳~	ムコソルバン錠 1 5 m g	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
61	13:慢性副鼻腔炎	~4Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
62	13:慢性副鼻腔炎	4~6Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.30000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
63	13:慢性副鼻腔炎	6~8Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
64	13:慢性副鼻腔炎	8~10Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
65	13:慢性副鼻腔炎	10~12Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
66	13:慢性副鼻腔炎	12~14Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.70000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
67	13:慢性副鼻腔炎	14~16Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
68	13:慢性副鼻腔炎	16~18Kg	ムコダインD S 5 0 %	0.90000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
69	13:慢性副鼻腔炎	18~20Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
70	13:慢性副鼻腔炎	20~23Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
71	13:慢性副鼻腔炎	23~26Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
72	13:慢性副鼻腔炎	26~30Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
73	13:慢性副鼻腔炎	30~35Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
74	13:慢性副鼻腔炎	35~40Kg	ムコダインD S 5 0 %	1.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
75	13:慢性副鼻腔炎	40Kg~	ムコダインD S 5 0 %	1.50000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
76	13:慢性副鼻腔炎	~4Kg	ムコダインシロップ 5 %	2.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
77	13:慢性副鼻腔炎	4~6Kg	ムコダインシロップ 5 %	3.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
78	13:慢性副鼻腔炎	6~8Kg	ムコダインシロップ 5 %	4.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
79	13:慢性副鼻腔炎	8~10Kg	ムコダインシロップ 5 %	5.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
80	13:慢性副鼻腔炎	10~12Kg	ムコダインシロップ 5 %	6.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
81	13:慢性副鼻腔炎	12~14Kg	ムコダインシロップ 5 %	7.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
82	13:慢性副鼻腔炎	14~16Kg	ムコダインシロップ 5 %	8.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
83	13:慢性副鼻腔炎	16~18Kg	ムコダインシロップ 5 %	9.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
84	13:慢性副鼻腔炎	18~20Kg	ムコダインシロップ 5 %	10.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
85	13:慢性副鼻腔炎	20~23Kg	ムコダインシロップ 5 %	10.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5
86	13:慢性副鼻腔炎	23~26Kg	ムコダインシロップ 5 %	12.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5

■慢性副鼻腔炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
87	13:慢性副鼻腔炎	26~30Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
88	13:慢性副鼻腔炎	30~35Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
89	13:慢性副鼻腔炎	35~40Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
90	13:慢性副鼻腔炎	40Kg~	ムコダインシロップ5%	15.00000	mL	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
91	13:慢性副鼻腔炎	0ヶ月	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
92	13:慢性副鼻腔炎	2ヶ月	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
93	13:慢性副鼻腔炎	5ヶ月	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
94	13:慢性副鼻腔炎	8ヶ月	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
95	13:慢性副鼻腔炎	1~2歳	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
96	13:慢性副鼻腔炎	3歳	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
97	13:慢性副鼻腔炎	4歳	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
98	13:慢性副鼻腔炎	5歳	ムコダイン錠250mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
99	13:慢性副鼻腔炎	6歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
100	13:慢性副鼻腔炎	7歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
101	13:慢性副鼻腔炎	8歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
102	13:慢性副鼻腔炎	9歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
103	13:慢性副鼻腔炎	10歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
104	13:慢性副鼻腔炎	11歳	ムコダイン錠250mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
105	13:慢性副鼻腔炎	12歳~	ムコダイン錠250mg	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
106	13:慢性副鼻腔炎	~4Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
107	13:慢性副鼻腔炎	4~6Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
108	13:慢性副鼻腔炎	6~8Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
109	13:慢性副鼻腔炎	8~10Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
110	13:慢性副鼻腔炎	10~12Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
111	13:慢性副鼻腔炎	12~14Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
112	13:慢性副鼻腔炎	14~16Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
113	13:慢性副鼻腔炎	16~18Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
114	13:慢性副鼻腔炎	18~20Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
115	13:慢性副鼻腔炎	20~23Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
116	13:慢性副鼻腔炎	23~26Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
117	13:慢性副鼻腔炎	26~30Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
118	13:慢性副鼻腔炎	30~35Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
119	13:慢性副鼻腔炎	35~40Kg	ムコダイン錠500mg	0.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
120	13:慢性副鼻腔炎	40Kg~	ムコダイン錠500mg	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
121	13:慢性副鼻腔炎	~4Kg	小児用フルナーゼ点鼻液25µg56噴霧用 2.04mg4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
122	13:慢性副鼻腔炎	4~6Kg	小児用フルナーゼ点鼻液25µg56噴霧用 2.04mg4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
123	13:慢性副鼻腔炎	6~8Kg	小児用フルナーゼ点鼻液25µg56噴霧用 2.04mg4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
124	13:慢性副鼻腔炎	8~10Kg	小児用フルナーゼ点鼻液25µg56噴霧用 2.04mg4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
125	13:慢性副鼻腔炎	10~12Kg	小児用フルナーゼ点鼻液25µg56噴霧用 2.04mg4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
126	13:慢性副鼻腔炎	12~14Kg	小児用フルナーゼ点鼻液25µg56噴霧用 2.04mg4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
127	13:慢性副鼻腔炎	14~16Kg	小児用フルナーゼ点鼻液25µg56噴霧用 2.04mg4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
128	13:慢性副鼻腔炎	16~18Kg	小児用フルナーゼ点鼻液25µg56噴霧用 2.04mg4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
129	13:慢性副鼻腔炎	18~20Kg	小児用フルナーゼ点鼻液25µg56噴霧用 2.04mg4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧

■慢性副鼻腔炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
130	13:慢性副鼻腔炎	20~23Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1	両鼻に噴霧
131	13:慢性副鼻腔炎	23~26Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1	両鼻に噴霧
132	13:慢性副鼻腔炎	26~30Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1	両鼻に噴霧
133	13:慢性副鼻腔炎	30~35Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1	両鼻に噴霧
134	13:慢性副鼻腔炎	35~40Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1	両鼻に噴霧
135	13:慢性副鼻腔炎	40Kg~	小児用フルナーゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1	両鼻に噴霧
136	13:慢性副鼻腔炎	~4Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	0.10000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
137	13:慢性副鼻腔炎	4~6Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	0.25000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
138	13:慢性副鼻腔炎	6~8Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	0.30000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
139	13:慢性副鼻腔炎	8~10Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	0.45000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
140	13:慢性副鼻腔炎	10~12Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	0.60000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
141	13:慢性副鼻腔炎	12~14Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	0.70000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
142	13:慢性副鼻腔炎	14~16Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	0.80000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
143	13:慢性副鼻腔炎	16~18Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	0.90000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
144	13:慢性副鼻腔炎	18~20Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
145	13:慢性副鼻腔炎	20~23Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	1.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
146	13:慢性副鼻腔炎	23~26Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	1.20000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
147	13:慢性副鼻腔炎	26~30Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	1.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
148	13:慢性副鼻腔炎	30~35Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	1.80000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
149	13:慢性副鼻腔炎	35~40Kg	小児用ムコソルバンD S 1.5%	2.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
150	13:慢性副鼻腔炎	40Kg~	小児用ムコソルバンD S 1.5%	2.40000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
151	13:慢性副鼻腔炎	~4Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0.50000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
152	13:慢性副鼻腔炎	4~6Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	1.20000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
153	13:慢性副鼻腔炎	6~8Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	1.50000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
154	13:慢性副鼻腔炎	8~10Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	2.50000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
155	13:慢性副鼻腔炎	10~12Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	3.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
156	13:慢性副鼻腔炎	12~14Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	3.50000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
157	13:慢性副鼻腔炎	14~16Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	4.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
158	13:慢性副鼻腔炎	16~18Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	4.50000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
159	13:慢性副鼻腔炎	18~20Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	5.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
160	13:慢性副鼻腔炎	20~23Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	6.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
161	13:慢性副鼻腔炎	23~26Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	6.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
162	13:慢性副鼻腔炎	26~30Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	7.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
163	13:慢性副鼻腔炎	30~35Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	9.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
164	13:慢性副鼻腔炎	35~40Kg	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	10.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
165	13:慢性副鼻腔炎	40Kg~	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	12.00000	mL	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	