

■アトピー性皮膚炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
1	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	ピーソフテンローション0.3%	100.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	カサカサしたところ、お風呂上がり5分以内に
2	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	ピーソフテンローション0.3%	100.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	カサカサしたところ、お風呂上がり5分以内に
3	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	ピーソフテンローション0.3%	100.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	カサカサしたところ、お風呂上がり5分以内に
4	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	ピーソフテンローション0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	カサカサしたところ、お風呂上がり5分以内に
5	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	ピーソフテンローション0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	カサカサしたところ、お風呂上がり5分以内に
6	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	ピーソフテンローション0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	カサカサしたところ、お風呂上がり5分以内に
7	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	ピーソフテンローション0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	カサカサしたところ、お風呂上がり5分以内に
8	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	ピーソフテンローション0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	カサカサしたところ、お風呂上がり5分以内に
9	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	ピーソフテンローション0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	カサカサしたところ、お風呂上がり5分以内に
10	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	ピーソフテンローション0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	カサカサしたところ、お風呂上がり5分以内に
11	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	ピーソフテンローション0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	カサカサしたところ、お風呂上がり5分以内に
12	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	ピーソフテンローション0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	カサカサしたところ、お風呂上がり5分以内に
13	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	ピーソフテンローション0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	カサカサしたところ、お風呂上がり5分以内に
14	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	ピーソフテンローション0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	カサカサしたところ、お風呂上がり5分以内に
15	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	ピーソフテンローション0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	カサカサしたところ、お風呂上がり5分以内に
16	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	100.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がり5分以内に使用。(チューブで)
17	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	100.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がり5分以内に使用。(チューブで)
18	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	100.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がり5分以内に使用。(チューブで)
19	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がり5分以内に使用。(チューブで)
20	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がり5分以内に使用。(チューブで)
21	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がり5分以内に使用。(チューブで)
22	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がり5分以内に使用。(チューブで)
23	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がり5分以内に使用。(チューブで)
24	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がり5分以内に使用。(チューブで)
25	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がり5分以内に使用。(チューブで)
26	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がり5分以内に使用。(チューブで)
27	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がり5分以内に使用。(チューブで)
28	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がり5分以内に使用。(チューブで)
29	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がり5分以内に使用。(チューブで)
30	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がり5分以内に使用。(チューブで)
31	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 100g容器処方	100.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	カサカサに、入浴後5分以内に塗布 (ボトルで)
32	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 100g容器処方	100.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	カサカサに、入浴後5分以内に塗布 (ボトルで)
33	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 100g容器処方	100.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	カサカサに、入浴後5分以内に塗布 (ボトルで)
34	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 100g容器処方	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	カサカサに、入浴後5分以内に塗布 (ボトルで)
35	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 100g容器処方	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	カサカサに、入浴後5分以内に塗布 (ボトルで)
36	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 100g容器処方	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	カサカサに、入浴後5分以内に塗布 (ボトルで)
37	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 100g容器処方	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	カサカサに、入浴後5分以内に塗布 (ボトルで)
38	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 100g容器処方	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	カサカサに、入浴後5分以内に塗布 (ボトルで)
39	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 100g容器処方	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	カサカサに、入浴後5分以内に塗布 (ボトルで)
40	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 100g容器処方	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	カサカサに、入浴後5分以内に塗布 (ボトルで)
41	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 100g容器処方	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	カサカサに、入浴後5分以内に塗布 (ボトルで)
42	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 100g容器処方	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	カサカサに、入浴後5分以内に塗布 (ボトルで)
43	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 100g容器処方	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	カサカサに、入浴後5分以内に塗布 (ボトルで)

■アトピー性皮膚炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢		選択した症状、薬剤から表示される処方内容									
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント			
44	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%	100g	容器処方	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	カサカサに、入浴後5分以内に塗布 (ボトルで)
45	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%	100g	容器処方	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	カサカサに、入浴後5分以内に塗布 (ボトルで)
46	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%、混合用			25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
47	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%、混合用			25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
48	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%、混合用			25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
49	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%、混合用			25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
50	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%、混合用			25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
51	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%、混合用			25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
52	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%、混合用			25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
53	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%、混合用			25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
54	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%、混合用			25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
55	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%、混合用			25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
56	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%、混合用			25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
57	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%、混合用			25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
58	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%、混合用			25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
59	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%、混合用			25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
60	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	ヒルドイドソフト軟膏 0.3%、混合用			25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
61	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	ヒルドイドローション 0.3%			100.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
62	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	ヒルドイドローション 0.3%			100.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
63	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	ヒルドイドローション 0.3%			100.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
64	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	ヒルドイドローション 0.3%			200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
65	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	ヒルドイドローション 0.3%			200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
66	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	ヒルドイドローション 0.3%			200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
67	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	ヒルドイドローション 0.3%			200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
68	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	ヒルドイドローション 0.3%			200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
69	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	ヒルドイドローション 0.3%			200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
70	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	ヒルドイドローション 0.3%			200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
71	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	ヒルドイドローション 0.3%			200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
72	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	ヒルドイドローション 0.3%			200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
73	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	ヒルドイドローション 0.3%			200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
74	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	ヒルドイドローション 0.3%			200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
75	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	ヒルドイドローション 0.3%			200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
76	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	フルメタ軟膏 0.1%			5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
77	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	フルメタ軟膏 0.1%			5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
78	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	フルメタ軟膏 0.1%			5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
79	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	フルメタ軟膏 0.1%			5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
80	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	フルメタ軟膏 0.1%			5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
81	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	フルメタ軟膏 0.1%			5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
82	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	フルメタ軟膏 0.1%			5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
83	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	フルメタ軟膏 0.1%			5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
84	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	フルメタ軟膏 0.1%			5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
85	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	フルメタ軟膏 0.1%			5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
86	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	フルメタ軟膏 0.1%			5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布

■アトピー性皮膚炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
87	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	フルメタ軟膏 0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
88	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	フルメタ軟膏 0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
89	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	フルメタ軟膏 0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
90	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	フルメタ軟膏 0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
91	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	目の周囲、赤みかゆみに、1週間まで
92	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	目の周囲、赤みかゆみに、1週間まで
93	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	目の周囲、赤みかゆみに、1週間まで
94	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	目の周囲、赤みかゆみに、1週間まで
95	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	目の周囲、赤みかゆみに、1週間まで
96	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	目の周囲、赤みかゆみに、1週間まで
97	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	目の周囲、赤みかゆみに、1週間まで
98	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	目の周囲、赤みかゆみに、1週間まで
99	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	目の周囲、赤みかゆみに、1週間まで
100	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	目の周囲、赤みかゆみに、1週間まで
101	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	目の周囲、赤みかゆみに、1週間まで
102	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	目の周囲、赤みかゆみに、1週間まで
103	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	目の周囲、赤みかゆみに、1週間まで
104	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	目の周囲、赤みかゆみに、1週間まで
105	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	目の周囲、赤みかゆみに、1週間まで
106	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用	0.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	湿疹かゆいところ、傷のところは不可
107	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用	0.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	湿疹かゆいところ、傷のところは不可
108	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用	0.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	湿疹かゆいところ、傷のところは不可
109	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用	0.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	湿疹かゆいところ、傷のところは不可
110	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用	0.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	湿疹かゆいところ、傷のところは不可
111	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用	15.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	湿疹かゆいところ、傷のところは不可
112	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用	15.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	湿疹かゆいところ、傷のところは不可
113	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用	15.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	湿疹かゆいところ、傷のところは不可
114	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用	15.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	湿疹かゆいところ、傷のところは不可
115	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用	15.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	湿疹かゆいところ、傷のところは不可
116	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用	15.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	湿疹かゆいところ、傷のところは不可
117	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用	15.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	湿疹かゆいところ、傷のところは不可
118	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用	15.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	湿疹かゆいところ、傷のところは不可
119	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用	15.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	湿疹かゆいところ、傷のところは不可
120	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	プロトピック軟膏 0.03%小児用	15.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	湿疹かゆいところ、傷のところは不可
121	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用 顔用	0.00000	g	3:外用	7:1日1回夜に	1	目の周囲も可、傷がつよいところは不可
122	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用 顔用	0.00000	g	3:外用	7:1日1回夜に	1	目の周囲も可、傷がつよいところは不可
123	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用 顔用	0.00000	g	3:外用	7:1日1回夜に	1	目の周囲も可、傷がつよいところは不可
124	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用 顔用	0.00000	g	3:外用	7:1日1回夜に	1	目の周囲も可、傷がつよいところは不可
125	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用 顔用	0.00000	g	3:外用	7:1日1回夜に	1	目の周囲も可、傷がつよいところは不可
126	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用 顔用	10.00000	g	3:外用	7:1日1回夜に	1	目の周囲も可、傷がつよいところは不可
127	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用 顔用	10.00000	g	3:外用	7:1日1回夜に	1	目の周囲も可、傷がつよいところは不可
128	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用 顔用	10.00000	g	3:外用	7:1日1回夜に	1	目の周囲も可、傷がつよいところは不可
129	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	プロトピック軟膏 0.03%小児用 顔用	10.00000	g	3:外用	7:1日1回夜に	1	目の周囲も可、傷がつよいところは不可

■アトピー性皮膚炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
130	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	プロトピック軟膏0.03%小児用 顔用	10.00000	g	3:外用	7:1日1回夜に	1	目の周囲も可、傷がつよいところは不可
131	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	プロトピック軟膏0.03%小児用 顔用	10.00000	g	3:外用	7:1日1回夜に	1	目の周囲も可、傷がつよいところは不可
132	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	プロトピック軟膏0.03%小児用 顔用	10.00000	g	3:外用	7:1日1回夜に	1	目の周囲も可、傷がつよいところは不可
133	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	プロトピック軟膏0.03%小児用 顔用	10.00000	g	3:外用	7:1日1回夜に	1	目の周囲も可、傷がつよいところは不可
134	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	プロトピック軟膏0.03%小児用 顔用	10.00000	g	3:外用	7:1日1回夜に	1	目の周囲も可、傷がつよいところは不可
135	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	プロトピック軟膏0.03%小児用 顔用	10.00000	g	3:外用	7:1日1回夜に	1	目の周囲も可、傷がつよいところは不可
136	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	プロベト(ワセリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
137	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	プロベト(ワセリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
138	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	プロベト(ワセリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
139	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	プロベト(ワセリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
140	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	プロベト(ワセリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
141	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	プロベト(ワセリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
142	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	プロベト(ワセリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
143	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	プロベト(ワセリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
144	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	プロベト(ワセリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
145	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	プロベト(ワセリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
146	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	プロベト(ワセリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
147	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	プロベト(ワセリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
148	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	プロベト(ワセリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
149	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	プロベト(ワセリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
150	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	プロベト(ワセリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かさかさした部分に、お風呂上がりで使用。
151	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	プロベト(ワセリン)、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
152	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	プロベト(ワセリン)、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
153	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	プロベト(ワセリン)、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
154	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	プロベト(ワセリン)、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
155	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	プロベト(ワセリン)、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
156	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	プロベト(ワセリン)、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
157	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	プロベト(ワセリン)、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
158	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	プロベト(ワセリン)、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
159	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	プロベト(ワセリン)、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
160	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	プロベト(ワセリン)、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
161	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	プロベト(ワセリン)、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
162	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	プロベト(ワセリン)、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
163	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	プロベト(ワセリン)、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
164	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	プロベト(ワセリン)、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
165	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	プロベト(ワセリン)、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
166	16:アトピー性皮膚炎	0ヶ月	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	100.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	かさかさしたところ、お風呂上がり早めに
167	16:アトピー性皮膚炎	2ヶ月	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	100.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	かさかさしたところ、お風呂上がり早めに
168	16:アトピー性皮膚炎	5ヶ月	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	100.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	かさかさしたところ、お風呂上がり早めに
169	16:アトピー性皮膚炎	8ヶ月	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	かさかさしたところ、お風呂上がり早めに
170	16:アトピー性皮膚炎	1~2歳	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	かさかさしたところ、お風呂上がり早めに
171	16:アトピー性皮膚炎	3歳	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	かさかさしたところ、お風呂上がり早めに
172	16:アトピー性皮膚炎	4歳	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	かさかさしたところ、お風呂上がり早めに

■アトピー性皮膚炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
173	16:アトピー性皮膚炎	5歳	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	かさかさしたところ、お風呂上がり早めに
174	16:アトピー性皮膚炎	6歳	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	かさかさしたところ、お風呂上がり早めに
175	16:アトピー性皮膚炎	7歳	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	かさかさしたところ、お風呂上がり早めに
176	16:アトピー性皮膚炎	8歳	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	かさかさしたところ、お風呂上がり早めに
177	16:アトピー性皮膚炎	9歳	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	かさかさしたところ、お風呂上がり早めに
178	16:アトピー性皮膚炎	10歳	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	かさかさしたところ、お風呂上がり早めに
179	16:アトピー性皮膚炎	11歳	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	かさかさしたところ、お風呂上がり早めに
180	16:アトピー性皮膚炎	12歳	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	200.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	0	かさかさしたところ、お風呂上がり早めに
181	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	リドメックスコーワローション0.3%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
182	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	リドメックスコーワローション0.3%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
183	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	リドメックスコーワローション0.3%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
184	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	リドメックスコーワローション0.3%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
185	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	リドメックスコーワローション0.3%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
186	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	リドメックスコーワローション0.3%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
187	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	リドメックスコーワローション0.3%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
188	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	リドメックスコーワローション0.3%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
189	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	リドメックスコーワローション0.3%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
190	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	リドメックスコーワローション0.3%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
191	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	リドメックスコーワローション0.3%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
192	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	リドメックスコーワローション0.3%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
193	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	リドメックスコーワローション0.3%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
194	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	リドメックスコーワローション0.3%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
195	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	リドメックスコーワローション0.3%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
196	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	リンデロン-V Gローション	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
197	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	リンデロン-V Gローション	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
198	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	リンデロン-V Gローション	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
199	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	リンデロン-V Gローション	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
200	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	リンデロン-V Gローション	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
201	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	リンデロン-V Gローション	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
202	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	リンデロン-V Gローション	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
203	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	リンデロン-V Gローション	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
204	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	リンデロン-V Gローション	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
205	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	リンデロン-V Gローション	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
206	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	リンデロン-V Gローション	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
207	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	リンデロン-V Gローション	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
208	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	リンデロン-V Gローション	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
209	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	リンデロン-V Gローション	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
210	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	リンデロン-V Gローション	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
211	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	リンデロン-V G軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
212	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	リンデロン-V G軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
213	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	リンデロン-V G軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
214	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	リンデロン-V G軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
215	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	リンデロン-V G軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布

■アトピー性皮膚炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
216	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	リンデロン-V G軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
217	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	リンデロン-V G軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
218	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	リンデロン-V G軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
219	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	リンデロン-V G軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
220	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	リンデロン-V G軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
221	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	リンデロン-V G軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
222	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	リンデロン-V G軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
223	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	リンデロン-V G軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
224	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	リンデロン-V G軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
225	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	リンデロン-V G軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
226	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	リンデロン-Vローション0.12%	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
227	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	リンデロン-Vローション0.12%	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
228	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	リンデロン-Vローション0.12%	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
229	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	リンデロン-Vローション0.12%	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
230	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	リンデロン-Vローション0.12%	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
231	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	リンデロン-Vローション0.12%	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
232	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	リンデロン-Vローション0.12%	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
233	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	リンデロン-Vローション0.12%	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
234	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	リンデロン-Vローション0.12%	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
235	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	リンデロン-Vローション0.12%	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
236	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	リンデロン-Vローション0.12%	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
237	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	リンデロン-Vローション0.12%	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
238	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	リンデロン-Vローション0.12%	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
239	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	リンデロン-Vローション0.12%	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
240	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	リンデロン-Vローション0.12%	10.00000	mL	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
241	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
242	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
243	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
244	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
245	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
246	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
247	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
248	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
249	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
250	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
251	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
252	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
253	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
254	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
255	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、炎症の強い部分に塗布
256	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	リンデロン-V軟膏0.12%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
257	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	リンデロン-V軟膏0.12%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ
258	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	リンデロン-V軟膏0.12%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	(混合)かゆみ、赤みのつよいところ

■アトピー性皮膚炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
259	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	リンデロン-V軟膏0.12%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
260	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	リンデロン-V軟膏0.12%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
261	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	リンデロン-V軟膏0.12%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
262	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	リンデロン-V軟膏0.12%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
263	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	リンデロン-V軟膏0.12%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
264	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	リンデロン-V軟膏0.12%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
265	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	リンデロン-V軟膏0.12%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
266	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	リンデロン-V軟膏0.12%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
267	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	リンデロン-V軟膏0.12%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
268	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	リンデロン-V軟膏0.12%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
269	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	リンデロン-V軟膏0.12%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
270	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	リンデロン-V軟膏0.12%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
271	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	コクド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、かゆみに
272	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	コクド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、かゆみに
273	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	コクド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、かゆみに
274	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	コクド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、かゆみに
275	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	コクド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、かゆみに
276	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	コクド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、かゆみに
277	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	コクド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、かゆみに
278	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	コクド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、かゆみに
279	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	コクド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、かゆみに
280	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	コクド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、かゆみに
281	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	コクド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、かゆみに
282	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	コクド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、かゆみに
283	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	コクド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、かゆみに
284	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	コクド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、かゆみに
285	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	コクド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、かゆみに
286	16:アトピー性皮膚炎	~4Kg	コクド軟膏0.1%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
287	16:アトピー性皮膚炎	4~6Kg	コクド軟膏0.1%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
288	16:アトピー性皮膚炎	6~8Kg	コクド軟膏0.1%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
289	16:アトピー性皮膚炎	8~10Kg	コクド軟膏0.1%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
290	16:アトピー性皮膚炎	10~12Kg	コクド軟膏0.1%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
291	16:アトピー性皮膚炎	12~14Kg	コクド軟膏0.1%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
292	16:アトピー性皮膚炎	14~16Kg	コクド軟膏0.1%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
293	16:アトピー性皮膚炎	16~18Kg	コクド軟膏0.1%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
294	16:アトピー性皮膚炎	18~20Kg	コクド軟膏0.1%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
295	16:アトピー性皮膚炎	20~23Kg	コクド軟膏0.1%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
296	16:アトピー性皮膚炎	23~26Kg	コクド軟膏0.1%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
297	16:アトピー性皮膚炎	26~30Kg	コクド軟膏0.1%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
298	16:アトピー性皮膚炎	30~35Kg	コクド軟膏0.1%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
299	16:アトピー性皮膚炎	35~40Kg	コクド軟膏0.1%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ
300	16:アトピー性皮膚炎	40Kg~	コクド軟膏0.1%、混合用	25.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 (混合)かゆみ、赤みのつよいところ