

■伝染性膿痂疹選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
1	17:伝染性膿痂疹	~4Kg	L-ケプレックス小児用顆粒 200mg	0.75000	g	1:内服	4:1日2回	5
2	17:伝染性膿痂疹	4~6Kg	L-ケプレックス小児用顆粒 200mg	1.00000	g	1:内服	4:1日2回	5
3	17:伝染性膿痂疹	6~8Kg	L-ケプレックス小児用顆粒 200mg	1.50000	g	1:内服	4:1日2回	5
4	17:伝染性膿痂疹	8~10Kg	L-ケプレックス小児用顆粒 200mg	2.00000	g	1:内服	4:1日2回	5
5	17:伝染性膿痂疹	10~12Kg	L-ケプレックス小児用顆粒 200mg	2.50000	g	1:内服	4:1日2回	5
6	17:伝染性膿痂疹	12~14Kg	L-ケプレックス小児用顆粒 200mg	3.00000	g	1:内服	4:1日2回	5
7	17:伝染性膿痂疹	14~16Kg	L-ケプレックス小児用顆粒 200mg	3.50000	g	1:内服	4:1日2回	5
8	17:伝染性膿痂疹	16~18Kg	L-ケプレックス小児用顆粒 200mg	4.00000	g	1:内服	4:1日2回	5
9	17:伝染性膿痂疹	18~20Kg	L-ケプレックス小児用顆粒 200mg	4.50000	g	1:内服	4:1日2回	5
10	17:伝染性膿痂疹	20~23Kg	L-ケプレックス小児用顆粒 200mg	5.00000	g	1:内服	4:1日2回	5
11	17:伝染性膿痂疹	23~26Kg	L-ケプレックス小児用顆粒 200mg	5.00000	g	1:内服	4:1日2回	5
12	17:伝染性膿痂疹	26~30Kg	L-ケプレックス小児用顆粒 200mg	5.00000	g	1:内服	4:1日2回	5
13	17:伝染性膿痂疹	30~35Kg	L-ケプレックス小児用顆粒 200mg	5.00000	g	1:内服	4:1日2回	5
14	17:伝染性膿痂疹	35~40Kg	L-ケプレックス小児用顆粒 200mg	5.00000	g	1:内服	4:1日2回	5
15	17:伝染性膿痂疹	40Kg~	L-ケプレックス小児用顆粒 200mg	5.00000	g	1:内服	4:1日2回	5
16	17:伝染性膿痂疹	~4Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
17	17:伝染性膿痂疹	4~6Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
18	17:伝染性膿痂疹	6~8Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
19	17:伝染性膿痂疹	8~10Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
20	17:伝染性膿痂疹	10~12Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
21	17:伝染性膿痂疹	12~14Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
22	17:伝染性膿痂疹	14~16Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
23	17:伝染性膿痂疹	16~18Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
24	17:伝染性膿痂疹	18~20Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
25	17:伝染性膿痂疹	20~23Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
26	17:伝染性膿痂疹	23~26Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
27	17:伝染性膿痂疹	26~30Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
28	17:伝染性膿痂疹	30~35Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
29	17:伝染性膿痂疹	35~40Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
30	17:伝染性膿痂疹	40Kg~	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
31	17:伝染性膿痂疹	~4Kg	ケフラルカプセル 250mg	0.00000	カプセル	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
32	17:伝染性膿痂疹	4~6Kg	ケフラルカプセル 250mg	0.00000	カプセル	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
33	17:伝染性膿痂疹	6~8Kg	ケフラルカプセル 250mg	0.00000	カプセル	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
34	17:伝染性膿痂疹	8~10Kg	ケフラルカプセル 250mg	0.00000	カプセル	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
35	17:伝染性膿痂疹	10~12Kg	ケフラルカプセル 250mg	0.00000	カプセル	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
36	17:伝染性膿痂疹	12~14Kg	ケフラルカプセル 250mg	0.00000	カプセル	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
37	17:伝染性膿痂疹	14~16Kg	ケフラルカプセル 250mg	0.00000	カプセル	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
38	17:伝染性膿痂疹	16~18Kg	ケフラルカプセル 250mg	0.00000	カプセル	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
39	17:伝染性膿痂疹	18~20Kg	ケフラルカプセル 250mg	0.00000	カプセル	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
40	17:伝染性膿痂疹	20~23Kg	ケフラルカプセル 250mg	3.00000	カプセル	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
41	17:伝染性膿痂疹	23~26Kg	ケフラルカプセル 250mg	3.00000	カプセル	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
42	17:伝染性膿痂疹	26~30Kg	ケフラルカプセル 250mg	3.00000	カプセル	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
43	17:伝染性膿痂疹	30~35Kg	ケフラルカプセル 250mg	3.00000	カプセル	1:内服	1:1日3回毎食後に	5

■伝染性膿痂疹選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
44	17:伝染性膿痂疹	35~40Kg	ケラールカプセル 2 5 0 m g	3.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
45	17:伝染性膿痂疹	40Kg~	ケラールカプセル 2 5 0 m g	3.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
46	17:伝染性膿痂疹	0ヶ月	ゼビアックスローション 2 %	10.00000	g	3:外用	40: 1 日 1 回	0	じゅくじゅくしたところ
47	17:伝染性膿痂疹	2ヶ月	ゼビアックスローション 2 %	10.00000	g	3:外用	40: 1 日 1 回	0	じゅくじゅくしたところ
48	17:伝染性膿痂疹	5ヶ月	ゼビアックスローション 2 %	10.00000	g	3:外用	40: 1 日 1 回	0	じゅくじゅくしたところ
49	17:伝染性膿痂疹	8ヶ月	ゼビアックスローション 2 %	10.00000	g	3:外用	40: 1 日 1 回	0	じゅくじゅくしたところ
50	17:伝染性膿痂疹	1~2歳	ゼビアックスローション 2 %	10.00000	g	3:外用	40: 1 日 1 回	0	じゅくじゅくしたところ
51	17:伝染性膿痂疹	3歳	ゼビアックスローション 2 %	10.00000	g	3:外用	40: 1 日 1 回	0	じゅくじゅくしたところ
52	17:伝染性膿痂疹	4歳	ゼビアックスローション 2 %	10.00000	g	3:外用	40: 1 日 1 回	0	じゅくじゅくしたところ
53	17:伝染性膿痂疹	5歳	ゼビアックスローション 2 %	10.00000	g	3:外用	40: 1 日 1 回	0	じゅくじゅくしたところ
54	17:伝染性膿痂疹	6歳	ゼビアックスローション 2 %	10.00000	g	3:外用	40: 1 日 1 回	0	じゅくじゅくしたところ
55	17:伝染性膿痂疹	7歳	ゼビアックスローション 2 %	10.00000	g	3:外用	40: 1 日 1 回	0	じゅくじゅくしたところ
56	17:伝染性膿痂疹	8歳	ゼビアックスローション 2 %	10.00000	g	3:外用	40: 1 日 1 回	0	じゅくじゅくしたところ
57	17:伝染性膿痂疹	9歳	ゼビアックスローション 2 %	10.00000	g	3:外用	40: 1 日 1 回	0	じゅくじゅくしたところ
58	17:伝染性膿痂疹	10歳	ゼビアックスローション 2 %	10.00000	g	3:外用	40: 1 日 1 回	0	じゅくじゅくしたところ
59	17:伝染性膿痂疹	11歳	ゼビアックスローション 2 %	10.00000	g	3:外用	40: 1 日 1 回	0	じゅくじゅくしたところ
60	17:伝染性膿痂疹	12歳~	ゼビアックスローション 2 %	10.00000	g	3:外用	40: 1 日 1 回	0	じゅくじゅくしたところ
61	17:伝染性膿痂疹	~4Kg	セフゾンカプセル 1 0 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
62	17:伝染性膿痂疹	4~6Kg	セフゾンカプセル 1 0 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
63	17:伝染性膿痂疹	6~8Kg	セフゾンカプセル 1 0 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
64	17:伝染性膿痂疹	8~10Kg	セフゾンカプセル 1 0 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
65	17:伝染性膿痂疹	10~12Kg	セフゾンカプセル 1 0 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
66	17:伝染性膿痂疹	12~14Kg	セフゾンカプセル 1 0 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
67	17:伝染性膿痂疹	14~16Kg	セフゾンカプセル 1 0 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
68	17:伝染性膿痂疹	16~18Kg	セフゾンカプセル 1 0 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
69	17:伝染性膿痂疹	18~20Kg	セフゾンカプセル 1 0 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
70	17:伝染性膿痂疹	20~23Kg	セフゾンカプセル 1 0 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
71	17:伝染性膿痂疹	23~26Kg	セフゾンカプセル 1 0 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
72	17:伝染性膿痂疹	26~30Kg	セフゾンカプセル 1 0 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
73	17:伝染性膿痂疹	30~35Kg	セフゾンカプセル 1 0 0 m g	3.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
74	17:伝染性膿痂疹	35~40Kg	セフゾンカプセル 1 0 0 m g	3.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
75	17:伝染性膿痂疹	40Kg~	セフゾンカプセル 1 0 0 m g	3.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
76	17:伝染性膿痂疹	~4Kg	セフゾンカプセル 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
77	17:伝染性膿痂疹	4~6Kg	セフゾンカプセル 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
78	17:伝染性膿痂疹	6~8Kg	セフゾンカプセル 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
79	17:伝染性膿痂疹	8~10Kg	セフゾンカプセル 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
80	17:伝染性膿痂疹	10~12Kg	セフゾンカプセル 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
81	17:伝染性膿痂疹	12~14Kg	セフゾンカプセル 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
82	17:伝染性膿痂疹	14~16Kg	セフゾンカプセル 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
83	17:伝染性膿痂疹	16~18Kg	セフゾンカプセル 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
84	17:伝染性膿痂疹	18~20Kg	セフゾンカプセル 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
85	17:伝染性膿痂疹	20~23Kg	セフゾンカプセル 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
86	17:伝染性膿痂疹	23~26Kg	セフゾンカプセル 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	

■伝染性膿痂疹選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
87	17:伝染性膿痂疹	26~30Kg	セフゾンカプセル 5 0 m g	0.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
88	17:伝染性膿痂疹	30~35Kg	セフゾンカプセル 5 0 m g	3.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
89	17:伝染性膿痂疹	35~40Kg	セフゾンカプセル 5 0 m g	3.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
90	17:伝染性膿痂疹	40Kg~	セフゾンカプセル 5 0 m g	3.00000	カプセル	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
91	17:伝染性膿痂疹	~4Kg	セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	0.30000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
92	17:伝染性膿痂疹	4~6Kg	セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	0.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
93	17:伝染性膿痂疹	6~8Kg	セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	0.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
94	17:伝染性膿痂疹	8~10Kg	セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	0.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
95	17:伝染性膿痂疹	10~12Kg	セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	1.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
96	17:伝染性膿痂疹	12~14Kg	セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
97	17:伝染性膿痂疹	14~16Kg	セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	1.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
98	17:伝染性膿痂疹	16~18Kg	セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	1.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
99	17:伝染性膿痂疹	18~20Kg	セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	1.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
100	17:伝染性膿痂疹	20~23Kg	セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	2.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
101	17:伝染性膿痂疹	23~26Kg	セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	2.30000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
102	17:伝染性膿痂疹	26~30Kg	セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	2.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
103	17:伝染性膿痂疹	30~35Kg	セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	3.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
104	17:伝染性膿痂疹	35~40Kg	セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	3.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
105	17:伝染性膿痂疹	40Kg~	セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g	3.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
106	17:伝染性膿痂疹	0ヶ月	ネオメドロール E E 軟膏	3.00000	g	3:外用	9: 1 日 2 ~ 3 回	0	目の周囲
107	17:伝染性膿痂疹	2ヶ月	ネオメドロール E E 軟膏	3.00000	g	3:外用	9: 1 日 2 ~ 3 回	0	目の周囲
108	17:伝染性膿痂疹	5ヶ月	ネオメドロール E E 軟膏	3.00000	g	3:外用	9: 1 日 2 ~ 3 回	0	目の周囲
109	17:伝染性膿痂疹	8ヶ月	ネオメドロール E E 軟膏	3.00000	g	3:外用	9: 1 日 2 ~ 3 回	0	目の周囲
110	17:伝染性膿痂疹	1~2歳	ネオメドロール E E 軟膏	3.00000	g	3:外用	9: 1 日 2 ~ 3 回	0	目の周囲
111	17:伝染性膿痂疹	3歳	ネオメドロール E E 軟膏	3.00000	g	3:外用	9: 1 日 2 ~ 3 回	0	目の周囲
112	17:伝染性膿痂疹	4歳	ネオメドロール E E 軟膏	3.00000	g	3:外用	9: 1 日 2 ~ 3 回	0	目の周囲
113	17:伝染性膿痂疹	5歳	ネオメドロール E E 軟膏	3.00000	g	3:外用	9: 1 日 2 ~ 3 回	0	目の周囲
114	17:伝染性膿痂疹	6歳	ネオメドロール E E 軟膏	3.00000	g	3:外用	9: 1 日 2 ~ 3 回	0	目の周囲
115	17:伝染性膿痂疹	7歳	ネオメドロール E E 軟膏	3.00000	g	3:外用	9: 1 日 2 ~ 3 回	0	目の周囲
116	17:伝染性膿痂疹	8歳	ネオメドロール E E 軟膏	3.00000	g	3:外用	9: 1 日 2 ~ 3 回	0	目の周囲
117	17:伝染性膿痂疹	9歳	ネオメドロール E E 軟膏	3.00000	g	3:外用	9: 1 日 2 ~ 3 回	0	目の周囲
118	17:伝染性膿痂疹	10歳	ネオメドロール E E 軟膏	3.00000	g	3:外用	9: 1 日 2 ~ 3 回	0	目の周囲
119	17:伝染性膿痂疹	11歳	ネオメドロール E E 軟膏	3.00000	g	3:外用	9: 1 日 2 ~ 3 回	0	目の周囲
120	17:伝染性膿痂疹	12歳~	ネオメドロール E E 軟膏	3.00000	g	3:外用	9: 1 日 2 ~ 3 回	0	目の周囲
121	17:伝染性膿痂疹	0ヶ月	フジジンレオ軟膏 2 % 2 0 m g	10.00000	g	3:外用	4: 1 日 2 回	1	赤みつよいところ
122	17:伝染性膿痂疹	2ヶ月	フジジンレオ軟膏 2 % 2 0 m g	10.00000	g	3:外用	4: 1 日 2 回	1	赤みつよいところ
123	17:伝染性膿痂疹	5ヶ月	フジジンレオ軟膏 2 % 2 0 m g	10.00000	g	3:外用	4: 1 日 2 回	1	赤みつよいところ
124	17:伝染性膿痂疹	8ヶ月	フジジンレオ軟膏 2 % 2 0 m g	10.00000	g	3:外用	4: 1 日 2 回	1	赤みつよいところ
125	17:伝染性膿痂疹	1~2歳	フジジンレオ軟膏 2 % 2 0 m g	10.00000	g	3:外用	4: 1 日 2 回	1	赤みつよいところ
126	17:伝染性膿痂疹	3歳	フジジンレオ軟膏 2 % 2 0 m g	10.00000	g	3:外用	4: 1 日 2 回	1	赤みつよいところ
127	17:伝染性膿痂疹	4歳	フジジンレオ軟膏 2 % 2 0 m g	10.00000	g	3:外用	4: 1 日 2 回	1	赤みつよいところ
128	17:伝染性膿痂疹	5歳	フジジンレオ軟膏 2 % 2 0 m g	10.00000	g	3:外用	4: 1 日 2 回	1	赤みつよいところ
129	17:伝染性膿痂疹	6歳	フジジンレオ軟膏 2 % 2 0 m g	10.00000	g	3:外用	4: 1 日 2 回	1	赤みつよいところ

■伝染性膿痂疹選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
130	17:伝染性膿痂疹	7歳	フジジンレオ軟膏2% 20mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤みつよいところ
131	17:伝染性膿痂疹	8歳	フジジンレオ軟膏2% 20mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤みつよいところ
132	17:伝染性膿痂疹	9歳	フジジンレオ軟膏2% 20mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤みつよいところ
133	17:伝染性膿痂疹	10歳	フジジンレオ軟膏2% 20mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤みつよいところ
134	17:伝染性膿痂疹	11歳	フジジンレオ軟膏2% 20mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤みつよいところ
135	17:伝染性膿痂疹	12歳~	フジジンレオ軟膏2% 20mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤みつよいところ
136	17:伝染性膿痂疹	~4Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg	0.27000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
137	17:伝染性膿痂疹	4~6Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg	0.36000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
138	17:伝染性膿痂疹	6~8Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg	0.54000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
139	17:伝染性膿痂疹	8~10Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg	0.72000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
140	17:伝染性膿痂疹	10~12Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg	0.90000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
141	17:伝染性膿痂疹	12~14Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg	1.08000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
142	17:伝染性膿痂疹	14~16Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg	1.26000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
143	17:伝染性膿痂疹	16~18Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg	1.44000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
144	17:伝染性膿痂疹	18~20Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg	1.62000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
145	17:伝染性膿痂疹	20~23Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg	1.80000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
146	17:伝染性膿痂疹	23~26Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg	2.07000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
147	17:伝染性膿痂疹	26~30Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg	2.34000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
148	17:伝染性膿痂疹	30~35Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg	2.70000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
149	17:伝染性膿痂疹	35~40Kg	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
150	17:伝染性膿痂疹	40Kg~	マイアクトMS小児用細粒10% 100mg	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
151	17:伝染性膿痂疹	0ヶ月	リンデロン-V軟膏0.12%とびひ混合10g	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 赤みつよいところ
152	17:伝染性膿痂疹	2ヶ月	リンデロン-V軟膏0.12%とびひ混合10g	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 赤みつよいところ
153	17:伝染性膿痂疹	5ヶ月	リンデロン-V軟膏0.12%とびひ混合10g	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 赤みつよいところ
154	17:伝染性膿痂疹	8ヶ月	リンデロン-V軟膏0.12%とびひ混合10g	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 赤みつよいところ
155	17:伝染性膿痂疹	1~2歳	リンデロン-V軟膏0.12%とびひ混合10g	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 赤みつよいところ
156	17:伝染性膿痂疹	3歳	リンデロン-V軟膏0.12%とびひ混合10g	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 赤みつよいところ
157	17:伝染性膿痂疹	4歳	リンデロン-V軟膏0.12%とびひ混合10g	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 赤みつよいところ
158	17:伝染性膿痂疹	5歳	リンデロン-V軟膏0.12%とびひ混合10g	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 赤みつよいところ
159	17:伝染性膿痂疹	6歳	リンデロン-V軟膏0.12%とびひ混合10g	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 赤みつよいところ
160	17:伝染性膿痂疹	7歳	リンデロン-V軟膏0.12%とびひ混合10g	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 赤みつよいところ
161	17:伝染性膿痂疹	8歳	リンデロン-V軟膏0.12%とびひ混合10g	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 赤みつよいところ
162	17:伝染性膿痂疹	9歳	リンデロン-V軟膏0.12%とびひ混合10g	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 赤みつよいところ
163	17:伝染性膿痂疹	10歳	リンデロン-V軟膏0.12%とびひ混合10g	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 赤みつよいところ
164	17:伝染性膿痂疹	11歳	リンデロン-V軟膏0.12%とびひ混合10g	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 赤みつよいところ
165	17:伝染性膿痂疹	12歳~	リンデロン-V軟膏0.12%とびひ混合10g	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 赤みつよいところ
166	17:伝染性膿痂疹	~4Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1 赤み強いところ
167	17:伝染性膿痂疹	4~6Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1 赤み強いところ
168	17:伝染性膿痂疹	6~8Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1 赤み強いところ
169	17:伝染性膿痂疹	8~10Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1 赤み強いところ
170	17:伝染性膿痂疹	10~12Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1 赤み強いところ
171	17:伝染性膿痂疹	12~14Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1 赤み強いところ
172	17:伝染性膿痂疹	14~16Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1 赤み強いところ

■伝染性膿痂疹選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
173	17:伝染性膿痂疹	16~18Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤み強いところ
174	17:伝染性膿痂疹	18~20Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤み強いところ
175	17:伝染性膿痂疹	20~23Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤み強いところ
176	17:伝染性膿痂疹	23~26Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤み強いところ
177	17:伝染性膿痂疹	26~30Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤み強いところ
178	17:伝染性膿痂疹	30~35Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤み強いところ
179	17:伝染性膿痂疹	35~40Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤み強いところ
180	17:伝染性膿痂疹	40Kg~	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤み強いところ
181	17:伝染性膿痂疹	0ヶ月	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	赤み、かゆみつよいところ
182	17:伝染性膿痂疹	2ヶ月	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	赤み、かゆみつよいところ
183	17:伝染性膿痂疹	5ヶ月	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	赤み、かゆみつよいところ
184	17:伝染性膿痂疹	8ヶ月	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	赤み、かゆみつよいところ
185	17:伝染性膿痂疹	1~2歳	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	赤み、かゆみつよいところ
186	17:伝染性膿痂疹	3歳	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	赤み、かゆみつよいところ
187	17:伝染性膿痂疹	4歳	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	赤み、かゆみつよいところ
188	17:伝染性膿痂疹	5歳	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	赤み、かゆみつよいところ
189	17:伝染性膿痂疹	6歳	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	赤み、かゆみつよいところ
190	17:伝染性膿痂疹	7歳	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	赤み、かゆみつよいところ
191	17:伝染性膿痂疹	8歳	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	赤み、かゆみつよいところ
192	17:伝染性膿痂疹	9歳	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	赤み、かゆみつよいところ
193	17:伝染性膿痂疹	10歳	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	赤み、かゆみつよいところ
194	17:伝染性膿痂疹	11歳	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	赤み、かゆみつよいところ
195	17:伝染性膿痂疹	12歳~	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	赤み、かゆみつよいところ