

■おむつかぶれ選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
18:おむつかぶれ	~4Kg	アズノール軟膏0.033%	20.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	おむつかぶれに
18:おむつかぶれ	4~6Kg	アズノール軟膏0.033%	20.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	おむつかぶれに
18:おむつかぶれ	6~8Kg	アズノール軟膏0.033%	20.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	おむつかぶれに
18:おむつかぶれ	8~10Kg	アズノール軟膏0.033%	20.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	おむつかぶれに
18:おむつかぶれ	10~12Kg	アズノール軟膏0.033%	20.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	おむつかぶれに
18:おむつかぶれ	12~14Kg	アズノール軟膏0.033%	20.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	おむつかぶれに
18:おむつかぶれ	14~16Kg	アズノール軟膏0.033%	20.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	おむつかぶれに
18:おむつかぶれ	16~18Kg	アズノール軟膏0.033%	20.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	おむつかぶれに
18:おむつかぶれ	18~20Kg	アズノール軟膏0.033%	20.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	おむつかぶれに
18:おむつかぶれ	20~23Kg	アズノール軟膏0.033%	20.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	おむつかぶれに
18:おむつかぶれ	23~26Kg	アズノール軟膏0.033%	20.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	おむつかぶれに
18:おむつかぶれ	26~30Kg	アズノール軟膏0.033%	20.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	おむつかぶれに
18:おむつかぶれ	30~35Kg	アズノール軟膏0.033%	20.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	おむつかぶれに
18:おむつかぶれ	35~40Kg	アズノール軟膏0.033%	20.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	おむつかぶれに
18:おむつかぶれ	40Kg~	アズノール軟膏0.033%	20.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	おむつかぶれに
18:おむつかぶれ	~4Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	4~6Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	6~8Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	8~10Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	10~12Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	12~14Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	14~16Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	16~18Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	18~20Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	20~23Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	23~26Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	26~30Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	30~35Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	35~40Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	40Kg~	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	~4Kg	マイコスボールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	4~6Kg	マイコスボールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	6~8Kg	マイコスボールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	8~10Kg	マイコスボールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	10~12Kg	マイコスボールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	12~14Kg	マイコスボールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	14~16Kg	マイコスボールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	16~18Kg	マイコスボールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	18~20Kg	マイコスボールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	20~23Kg	マイコスボールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	23~26Kg	マイコスボールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	26~30Kg	マイコスボールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	陰部、殿部に
18:おむつかぶれ	30~35Kg	マイコスボールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	陰部、殿部に

■おむつかぶれ選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容				
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
44	18:おむつかぶれ	35~40Kg	マイコスポールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1 陰部、殿部に
45	18:おむつかぶれ	40Kg~	マイコスポールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1 陰部、殿部に
46	18:おむつかぶれ	~4Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、炎症の強い部分に塗布、1週間まで
47	18:おむつかぶれ	4~6Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、炎症の強い部分に塗布、1週間まで
48	18:おむつかぶれ	6~8Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、炎症の強い部分に塗布、1週間まで
49	18:おむつかぶれ	8~10Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、炎症の強い部分に塗布、1週間まで
50	18:おむつかぶれ	10~12Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、炎症の強い部分に塗布、1週間まで
51	18:おむつかぶれ	12~14Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、炎症の強い部分に塗布、1週間まで
52	18:おむつかぶれ	14~16Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、炎症の強い部分に塗布、1週間まで
53	18:おむつかぶれ	16~18Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、炎症の強い部分に塗布、1週間まで
54	18:おむつかぶれ	18~20Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、炎症の強い部分に塗布、1週間まで
55	18:おむつかぶれ	20~23Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、炎症の強い部分に塗布、1週間まで
56	18:おむつかぶれ	23~26Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、炎症の強い部分に塗布、1週間まで
57	18:おむつかぶれ	26~30Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、炎症の強い部分に塗布、1週間まで
58	18:おむつかぶれ	30~35Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、炎症の強い部分に塗布、1週間まで
59	18:おむつかぶれ	35~40Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、炎症の強い部分に塗布、1週間まで
60	18:おむつかぶれ	40Kg~	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 赤み、炎症の強い部分に塗布、1週間まで
61	18:おむつかぶれ	~4Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 陰部、殿部、赤みが強いところ、1週間まで
62	18:おむつかぶれ	4~6Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 陰部、殿部、赤みが強いところ、1週間まで
63	18:おむつかぶれ	6~8Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 陰部、殿部、赤みが強いところ、1週間まで
64	18:おむつかぶれ	8~10Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 陰部、殿部、赤みが強いところ、1週間まで
65	18:おむつかぶれ	10~12Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 陰部、殿部、赤みが強いところ、1週間まで
66	18:おむつかぶれ	12~14Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 陰部、殿部、赤みが強いところ、1週間まで
67	18:おむつかぶれ	14~16Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 陰部、殿部、赤みが強いところ、1週間まで
68	18:おむつかぶれ	16~18Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 陰部、殿部、赤みが強いところ、1週間まで
69	18:おむつかぶれ	18~20Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 陰部、殿部、赤みが強いところ、1週間まで
70	18:おむつかぶれ	20~23Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 陰部、殿部、赤みが強いところ、1週間まで
71	18:おむつかぶれ	23~26Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 陰部、殿部、赤みが強いところ、1週間まで
72	18:おむつかぶれ	26~30Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 陰部、殿部、赤みが強いところ、1週間まで
73	18:おむつかぶれ	30~35Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 陰部、殿部、赤みが強いところ、1週間まで
74	18:おむつかぶれ	35~40Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 陰部、殿部、赤みが強いところ、1週間まで
75	18:おむつかぶれ	40Kg~	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0 陰部、殿部、赤みが強いところ、1週間まで
76	18:おむつかぶれ	~4Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	5:医師の指示通りに	1 おしり赤いところ、何度でも可、白いのが取れたら塗布
77	18:おむつかぶれ	4~6Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	5:医師の指示通りに	1 おしり赤いところ、何度でも可、白いのが取れたら塗布
78	18:おむつかぶれ	6~8Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	5:医師の指示通りに	1 おしり赤いところ、何度でも可、白いのが取れたら塗布
79	18:おむつかぶれ	8~10Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	5:医師の指示通りに	1 おしり赤いところ、何度でも可、白いのが取れたら塗布
80	18:おむつかぶれ	10~12Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	5:医師の指示通りに	1 おしり赤いところ、何度でも可、白いのが取れたら塗布
81	18:おむつかぶれ	12~14Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	5:医師の指示通りに	1 おしり赤いところ、何度でも可、白いのが取れたら塗布
82	18:おむつかぶれ	14~16Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	5:医師の指示通りに	1 おしり赤いところ、何度でも可、白いのが取れたら塗布
83	18:おむつかぶれ	16~18Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	5:医師の指示通りに	1 おしり赤いところ、何度でも可、白いのが取れたら塗布
84	18:おむつかぶれ	18~20Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	5:医師の指示通りに	1 おしり赤いところ、何度でも可、白いのが取れたら塗布
85	18:おむつかぶれ	20~23Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	5:医師の指示通りに	1 おしり赤いところ、何度でも可、白いのが取れたら塗布
86	18:おむつかぶれ	23~26Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	5:医師の指示通りに	1 おしり赤いところ、何度でも可、白いのが取れたら塗布

■おむつかぶれ選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
87	18:おむつかぶれ	26~30Kg	亜鉛華（10%）単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	5:医師の指示通りに	1	おしり赤いところ、何度でも可、白いのが取れたら塗布
88	18:おむつかぶれ	30~35Kg	亜鉛華（10%）単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	5:医師の指示通りに	1	おしり赤いところ、何度でも可、白いのが取れたら塗布
89	18:おむつかぶれ	35~40Kg	亜鉛華（10%）単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	5:医師の指示通りに	1	おしり赤いところ、何度でも可、白いのが取れたら塗布
90	18:おむつかぶれ	40Kg~	亜鉛華（10%）単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	5:医師の指示通りに	1	おしり赤いところ、何度でも可、白いのが取れたら塗布