

■眼科疾患選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
19:眼科疾患	~4Kg	A Z点眼液 0.02% 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	0	両眼に
19:眼科疾患	4~6Kg	A Z点眼液 0.02% 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	0	両眼に
19:眼科疾患	6~8Kg	A Z点眼液 0.02% 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	0	両眼に
19:眼科疾患	8~10Kg	A Z点眼液 0.02% 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	0	両眼に
19:眼科疾患	10~12Kg	A Z点眼液 0.02% 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	0	両眼に
19:眼科疾患	12~14Kg	A Z点眼液 0.02% 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	0	両眼に
19:眼科疾患	14~16Kg	A Z点眼液 0.02% 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	0	両眼に
19:眼科疾患	16~18Kg	A Z点眼液 0.02% 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	0	両眼に
19:眼科疾患	18~20Kg	A Z点眼液 0.02% 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	0	両眼に
19:眼科疾患	20~23Kg	A Z点眼液 0.02% 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	0	両眼に
19:眼科疾患	23~26Kg	A Z点眼液 0.02% 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	0	両眼に
19:眼科疾患	26~30Kg	A Z点眼液 0.02% 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	0	両眼に
19:眼科疾患	30~35Kg	A Z点眼液 0.02% 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	0	両眼に
19:眼科疾患	35~40Kg	A Z点眼液 0.02% 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	0	両眼に
19:眼科疾患	40Kg~	A Z点眼液 0.02% 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	0	両眼に
19:眼科疾患	~4Kg	インタール点眼液 2% 100mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	4~6Kg	インタール点眼液 2% 100mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	6~8Kg	インタール点眼液 2% 100mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	8~10Kg	インタール点眼液 2% 100mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	10~12Kg	インタール点眼液 2% 100mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	12~14Kg	インタール点眼液 2% 100mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	14~16Kg	インタール点眼液 2% 100mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	16~18Kg	インタール点眼液 2% 100mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	18~20Kg	インタール点眼液 2% 100mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	20~23Kg	インタール点眼液 2% 100mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	23~26Kg	インタール点眼液 2% 100mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	26~30Kg	インタール点眼液 2% 100mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	30~35Kg	インタール点眼液 2% 100mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	35~40Kg	インタール点眼液 2% 100mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	40Kg~	インタール点眼液 2% 100mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	~4Kg	オゼックス点眼液 0.3%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	4~6Kg	オゼックス点眼液 0.3%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	6~8Kg	オゼックス点眼液 0.3%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	8~10Kg	オゼックス点眼液 0.3%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	10~12Kg	オゼックス点眼液 0.3%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	12~14Kg	オゼックス点眼液 0.3%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	14~16Kg	オゼックス点眼液 0.3%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	16~18Kg	オゼックス点眼液 0.3%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	18~20Kg	オゼックス点眼液 0.3%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	20~23Kg	オゼックス点眼液 0.3%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	23~26Kg	オゼックス点眼液 0.3%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	26~30Kg	オゼックス点眼液 0.3%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
19:眼科疾患	30~35Kg	オゼックス点眼液 0.3%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼

■眼科疾患選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
44	19:眼科疾患	35~40Kg	オゼックス点眼液 0.3%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
45	19:眼科疾患	40Kg~	オゼックス点眼液 0.3%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
46	19:眼科疾患	~4Kg	クラビット点眼液 0.5%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	1回1滴。遮光保存
47	19:眼科疾患	4~6Kg	クラビット点眼液 0.5%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	1回1滴。遮光保存
48	19:眼科疾患	6~8Kg	クラビット点眼液 0.5%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	1回1滴。遮光保存
49	19:眼科疾患	8~10Kg	クラビット点眼液 0.5%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	1回1滴。遮光保存
50	19:眼科疾患	10~12Kg	クラビット点眼液 0.5%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	1回1滴。遮光保存
51	19:眼科疾患	12~14Kg	クラビット点眼液 0.5%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	1回1滴。遮光保存
52	19:眼科疾患	14~16Kg	クラビット点眼液 0.5%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	1回1滴。遮光保存
53	19:眼科疾患	16~18Kg	クラビット点眼液 0.5%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	1回1滴。遮光保存
54	19:眼科疾患	18~20Kg	クラビット点眼液 0.5%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	1回1滴。遮光保存
55	19:眼科疾患	20~23Kg	クラビット点眼液 0.5%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	1回1滴。遮光保存
56	19:眼科疾患	23~26Kg	クラビット点眼液 0.5%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	1回1滴。遮光保存
57	19:眼科疾患	26~30Kg	クラビット点眼液 0.5%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	1回1滴。遮光保存
58	19:眼科疾患	30~35Kg	クラビット点眼液 0.5%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	1回1滴。遮光保存
59	19:眼科疾患	35~40Kg	クラビット点眼液 0.5%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	1回1滴。遮光保存
60	19:眼科疾患	40Kg~	クラビット点眼液 0.5%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	1回1滴。遮光保存
61	19:眼科疾患	~4Kg	ザジテン点眼液 0.05% 3.45mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
62	19:眼科疾患	4~6Kg	ザジテン点眼液 0.05% 3.45mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
63	19:眼科疾患	6~8Kg	ザジテン点眼液 0.05% 3.45mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
64	19:眼科疾患	8~10Kg	ザジテン点眼液 0.05% 3.45mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
65	19:眼科疾患	10~12Kg	ザジテン点眼液 0.05% 3.45mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
66	19:眼科疾患	12~14Kg	ザジテン点眼液 0.05% 3.45mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
67	19:眼科疾患	14~16Kg	ザジテン点眼液 0.05% 3.45mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
68	19:眼科疾患	16~18Kg	ザジテン点眼液 0.05% 3.45mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
69	19:眼科疾患	18~20Kg	ザジテン点眼液 0.05% 3.45mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
70	19:眼科疾患	20~23Kg	ザジテン点眼液 0.05% 3.45mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
71	19:眼科疾患	23~26Kg	ザジテン点眼液 0.05% 3.45mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
72	19:眼科疾患	26~30Kg	ザジテン点眼液 0.05% 3.45mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
73	19:眼科疾患	30~35Kg	ザジテン点眼液 0.05% 3.45mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
74	19:眼科疾患	35~40Kg	ザジテン点眼液 0.05% 3.45mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
75	19:眼科疾患	40Kg~	ザジテン点眼液 0.05% 3.45mg 5mL	1.00000	瓶	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
76	19:眼科疾患	~4Kg	ソビラックス眼軟膏 3%	5.00000	g	3:外用	58:1日5回	1	両眼に塗布
77	19:眼科疾患	4~6Kg	ソビラックス眼軟膏 3%	5.00000	g	3:外用	58:1日5回	1	両眼に塗布
78	19:眼科疾患	6~8Kg	ソビラックス眼軟膏 3%	5.00000	g	3:外用	58:1日5回	1	両眼に塗布
79	19:眼科疾患	8~10Kg	ソビラックス眼軟膏 3%	5.00000	g	3:外用	58:1日5回	1	両眼に塗布
80	19:眼科疾患	10~12Kg	ソビラックス眼軟膏 3%	5.00000	g	3:外用	58:1日5回	1	両眼に塗布
81	19:眼科疾患	12~14Kg	ソビラックス眼軟膏 3%	5.00000	g	3:外用	58:1日5回	1	両眼に塗布
82	19:眼科疾患	14~16Kg	ソビラックス眼軟膏 3%	5.00000	g	3:外用	58:1日5回	1	両眼に塗布
83	19:眼科疾患	16~18Kg	ソビラックス眼軟膏 3%	5.00000	g	3:外用	58:1日5回	1	両眼に塗布
84	19:眼科疾患	18~20Kg	ソビラックス眼軟膏 3%	5.00000	g	3:外用	58:1日5回	1	両眼に塗布
85	19:眼科疾患	20~23Kg	ソビラックス眼軟膏 3%	5.00000	g	3:外用	58:1日5回	1	両眼に塗布
86	19:眼科疾患	23~26Kg	ソビラックス眼軟膏 3%	5.00000	g	3:外用	58:1日5回	1	両眼に塗布

■眼科疾患選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
87	19:眼科疾患	26~30Kg	ソビラックス眼軟膏 3%	5.00000	g	3:外用	58:1日5回	1 両眼に塗布
88	19:眼科疾患	30~35Kg	ソビラックス眼軟膏 3%	5.00000	g	3:外用	58:1日5回	1 両眼に塗布
89	19:眼科疾患	35~40Kg	ソビラックス眼軟膏 3%	5.00000	g	3:外用	58:1日5回	1 両眼に塗布
90	19:眼科疾患	40Kg~	ソビラックス眼軟膏 3%	5.00000	g	3:外用	58:1日5回	1 両眼に塗布
91	19:眼科疾患	~4Kg	タビッド眼軟膏 0.3%	3.50000	g	3:外用	3:1日3回	1 両眼に塗布
92	19:眼科疾患	4~6Kg	タビッド眼軟膏 0.3%	3.50000	g	3:外用	3:1日3回	1 両眼に塗布
93	19:眼科疾患	6~8Kg	タビッド眼軟膏 0.3%	3.50000	g	3:外用	3:1日3回	1 両眼に塗布
94	19:眼科疾患	8~10Kg	タビッド眼軟膏 0.3%	3.50000	g	3:外用	3:1日3回	1 両眼に塗布
95	19:眼科疾患	10~12Kg	タビッド眼軟膏 0.3%	3.50000	g	3:外用	3:1日3回	1 両眼に塗布
96	19:眼科疾患	12~14Kg	タビッド眼軟膏 0.3%	3.50000	g	3:外用	3:1日3回	1 両眼に塗布
97	19:眼科疾患	14~16Kg	タビッド眼軟膏 0.3%	3.50000	g	3:外用	3:1日3回	1 両眼に塗布
98	19:眼科疾患	16~18Kg	タビッド眼軟膏 0.3%	3.50000	g	3:外用	3:1日3回	1 両眼に塗布
99	19:眼科疾患	18~20Kg	タビッド眼軟膏 0.3%	3.50000	g	3:外用	3:1日3回	1 両眼に塗布
100	19:眼科疾患	20~23Kg	タビッド眼軟膏 0.3%	3.50000	g	3:外用	3:1日3回	1 両眼に塗布
101	19:眼科疾患	23~26Kg	タビッド眼軟膏 0.3%	3.50000	g	3:外用	3:1日3回	1 両眼に塗布
102	19:眼科疾患	26~30Kg	タビッド眼軟膏 0.3%	3.50000	g	3:外用	3:1日3回	1 両眼に塗布
103	19:眼科疾患	30~35Kg	タビッド眼軟膏 0.3%	3.50000	g	3:外用	3:1日3回	1 両眼に塗布
104	19:眼科疾患	35~40Kg	タビッド眼軟膏 0.3%	3.50000	g	3:外用	3:1日3回	1 両眼に塗布
105	19:眼科疾患	40Kg~	タビッド眼軟膏 0.3%	3.50000	g	3:外用	3:1日3回	1 両眼に塗布
106	19:眼科疾患	0ヶ月	ネオメドロールE E軟膏	3.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0 目の周囲、赤いところ
107	19:眼科疾患	2ヶ月	ネオメドロールE E軟膏	3.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0 目の周囲、赤いところ
108	19:眼科疾患	5ヶ月	ネオメドロールE E軟膏	3.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0 目の周囲、赤いところ
109	19:眼科疾患	8ヶ月	ネオメドロールE E軟膏	3.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0 目の周囲、赤いところ
110	19:眼科疾患	1~2歳	ネオメドロールE E軟膏	3.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0 目の周囲、赤いところ
111	19:眼科疾患	3歳	ネオメドロールE E軟膏	3.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0 目の周囲、赤いところ
112	19:眼科疾患	4歳	ネオメドロールE E軟膏	3.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0 目の周囲、赤いところ
113	19:眼科疾患	5歳	ネオメドロールE E軟膏	3.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0 目の周囲、赤いところ
114	19:眼科疾患	6歳	ネオメドロールE E軟膏	3.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0 目の周囲、赤いところ
115	19:眼科疾患	7歳	ネオメドロールE E軟膏	3.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0 目の周囲、赤いところ
116	19:眼科疾患	8歳	ネオメドロールE E軟膏	3.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0 目の周囲、赤いところ
117	19:眼科疾患	9歳	ネオメドロールE E軟膏	3.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0 目の周囲、赤いところ
118	19:眼科疾患	10歳	ネオメドロールE E軟膏	3.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0 目の周囲、赤いところ
119	19:眼科疾患	11歳	ネオメドロールE E軟膏	3.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0 目の周囲、赤いところ
120	19:眼科疾患	12歳~	ネオメドロールE E軟膏	3.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0 目の周囲、赤いところ
121	19:眼科疾患	~4Kg	フルメトロン点眼液 0.02%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1 両眼に点眼
122	19:眼科疾患	4~6Kg	フルメトロン点眼液 0.02%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1 両眼に点眼
123	19:眼科疾患	6~8Kg	フルメトロン点眼液 0.02%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1 両眼に点眼
124	19:眼科疾患	8~10Kg	フルメトロン点眼液 0.02%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1 両眼に点眼
125	19:眼科疾患	10~12Kg	フルメトロン点眼液 0.02%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1 両眼に点眼
126	19:眼科疾患	12~14Kg	フルメトロン点眼液 0.02%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1 両眼に点眼
127	19:眼科疾患	14~16Kg	フルメトロン点眼液 0.02%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1 両眼に点眼
128	19:眼科疾患	16~18Kg	フルメトロン点眼液 0.02%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1 両眼に点眼
129	19:眼科疾患	18~20Kg	フルメトロン点眼液 0.02%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1 両眼に点眼

■眼科疾患選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
130	19:眼科疾患	20~23Kg	フルメトン点眼液 0.02%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
131	19:眼科疾患	23~26Kg	フルメトン点眼液 0.02%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
132	19:眼科疾患	26~30Kg	フルメトン点眼液 0.02%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
133	19:眼科疾患	30~35Kg	フルメトン点眼液 0.02%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
134	19:眼科疾患	35~40Kg	フルメトン点眼液 0.02%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
135	19:眼科疾患	40Kg~	フルメトン点眼液 0.02%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
136	19:眼科疾患	~4Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	3:1日3回	1	両眼に塗布
137	19:眼科疾患	4~6Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	3:1日3回	1	両眼に塗布
138	19:眼科疾患	6~8Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	3:1日3回	1	両眼に塗布
139	19:眼科疾患	8~10Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	3:1日3回	1	両眼に塗布
140	19:眼科疾患	10~12Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	3:1日3回	1	両眼に塗布
141	19:眼科疾患	12~14Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	3:1日3回	1	両眼に塗布
142	19:眼科疾患	14~16Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	3:1日3回	1	両眼に塗布
143	19:眼科疾患	16~18Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	3:1日3回	1	両眼に塗布
144	19:眼科疾患	18~20Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	3:1日3回	1	両眼に塗布
145	19:眼科疾患	20~23Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	3:1日3回	1	両眼に塗布
146	19:眼科疾患	23~26Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	3:1日3回	1	両眼に塗布
147	19:眼科疾患	26~30Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	3:1日3回	1	両眼に塗布
148	19:眼科疾患	30~35Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	3:1日3回	1	両眼に塗布
149	19:眼科疾患	35~40Kg	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	3:1日3回	1	両眼に塗布
150	19:眼科疾患	40Kg~	プレドニン眼軟膏 0.25%	5.00000	g	3:外用	3:1日3回	1	両眼に塗布
151	19:眼科疾患	~4Kg	リボスチン点眼液 0.025%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
152	19:眼科疾患	4~6Kg	リボスチン点眼液 0.025%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
153	19:眼科疾患	6~8Kg	リボスチン点眼液 0.025%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
154	19:眼科疾患	8~10Kg	リボスチン点眼液 0.025%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
155	19:眼科疾患	10~12Kg	リボスチン点眼液 0.025%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
156	19:眼科疾患	12~14Kg	リボスチン点眼液 0.025%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
157	19:眼科疾患	14~16Kg	リボスチン点眼液 0.025%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
158	19:眼科疾患	16~18Kg	リボスチン点眼液 0.025%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
159	19:眼科疾患	18~20Kg	リボスチン点眼液 0.025%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
160	19:眼科疾患	20~23Kg	リボスチン点眼液 0.025%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
161	19:眼科疾患	23~26Kg	リボスチン点眼液 0.025%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
162	19:眼科疾患	26~30Kg	リボスチン点眼液 0.025%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
163	19:眼科疾患	30~35Kg	リボスチン点眼液 0.025%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
164	19:眼科疾患	35~40Kg	リボスチン点眼液 0.025%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼
165	19:眼科疾患	40Kg~	リボスチン点眼液 0.025%	5.00000	mL	3:外用	3:1日3回	1	両眼に点眼