

■抗菌薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

| 処方オーダー画面での選択肢 | | | 選択した症状、薬剤から表示される処方内容 | | | | | |
|---------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----|------|-------------|-----------|---------|
| 症状 | 処方分類 (年齢/体重) | 薬剤名 | 薬剤量 | 単位 | 処方区分 | 用法 | 日数 /回数 | コメント |
| 1 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 2 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 3 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 4 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 5 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 6 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 7 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 8 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 9 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 10 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 11 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 12 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 13 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg | 2.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 14 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg | 2.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 15 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 125SS 187.5mg | 2.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 16 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 250RS 375mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 17 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 250RS 375mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 18 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 250RS 375mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 19 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 250RS 375mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 20 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 250RS 375mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 21 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 250RS 375mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 22 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 250RS 375mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 23 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 250RS 375mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 24 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 250RS 375mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 25 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 250RS 375mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 26 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 250RS 375mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 27 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 250RS 375mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 28 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 250RS 375mg | 1.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 29 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 250RS 375mg | 1.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 30 | 23:抗菌薬 | オグメンチン配合錠 250RS 375mg | 1.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 31 | 23:抗菌薬 | オゼックス錠 150 150mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 32 | 23:抗菌薬 | オゼックス錠 150 150mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 33 | 23:抗菌薬 | オゼックス錠 150 150mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 34 | 23:抗菌薬 | オゼックス錠 150 150mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 35 | 23:抗菌薬 | オゼックス錠 150 150mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 36 | 23:抗菌薬 | オゼックス錠 150 150mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 37 | 23:抗菌薬 | オゼックス錠 150 150mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 38 | 23:抗菌薬 | オゼックス錠 150 150mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 39 | 23:抗菌薬 | オゼックス錠 150 150mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 40 | 23:抗菌薬 | オゼックス錠 150 150mg | 2.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 41 | 23:抗菌薬 | オゼックス錠 150 150mg | 2.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 42 | 23:抗菌薬 | オゼックス錠 150 150mg | 2.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 43 | 23:抗菌薬 | オゼックス錠 150 150mg | 2.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |

■抗菌薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

| 処方オーダー画面での選択肢 | | | 選択した症状、薬剤から薬剤量を算出される処方内容 | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------|------------------------------------|---------|------|------|---------------|------|--------|
| 症状 | 処方分類 (年齢/体重) | 薬剤名 | 薬剤量 | 単位 | 処方区分 | 用法 | 日数 /回数 | コメント | |
| 44 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | オゼックス錠 150 150mg | 2.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 45 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | オゼックス錠 150 150mg | 2.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 46 | 23:抗菌薬 | ~4Kg | オゼックス錠 75 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 47 | 23:抗菌薬 | 4~6Kg | オゼックス錠 75 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 48 | 23:抗菌薬 | 6~8Kg | オゼックス錠 75 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 49 | 23:抗菌薬 | 8~10Kg | オゼックス錠 75 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 50 | 23:抗菌薬 | 10~12Kg | オゼックス錠 75 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 51 | 23:抗菌薬 | 12~14Kg | オゼックス錠 75 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 52 | 23:抗菌薬 | 14~16Kg | オゼックス錠 75 75mg | 2.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 53 | 23:抗菌薬 | 16~18Kg | オゼックス錠 75 75mg | 2.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 54 | 23:抗菌薬 | 18~20Kg | オゼックス錠 75 75mg | 3.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 55 | 23:抗菌薬 | 20~23Kg | オゼックス錠 75 75mg | 3.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 56 | 23:抗菌薬 | 23~26Kg | オゼックス錠 75 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 57 | 23:抗菌薬 | 26~30Kg | オゼックス錠 75 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 58 | 23:抗菌薬 | 30~35Kg | オゼックス錠 75 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 59 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | オゼックス錠 75 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 60 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | オゼックス錠 75 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2:1日2回朝夕食後に | 5 | |
| 61 | 23:抗菌薬 | ~4Kg | クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤) | 0.00000 | g | 1:内服 | 34:1日2回朝夕食直前に | 5 | 分包装剤にて |
| 62 | 23:抗菌薬 | 4~6Kg | クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤) | 0.00000 | g | 1:内服 | 34:1日2回朝夕食直前に | 5 | 分包装剤にて |
| 63 | 23:抗菌薬 | 6~8Kg | クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤) | 1.01000 | g | 1:内服 | 34:1日2回朝夕食直前に | 5 | 分包装剤にて |
| 64 | 23:抗菌薬 | 8~10Kg | クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤) | 1.01000 | g | 1:内服 | 34:1日2回朝夕食直前に | 5 | 分包装剤にて |
| 65 | 23:抗菌薬 | 10~12Kg | クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤) | 2.02001 | g | 1:内服 | 34:1日2回朝夕食直前に | 5 | 分包装剤にて |
| 66 | 23:抗菌薬 | 12~14Kg | クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤) | 2.02001 | g | 1:内服 | 34:1日2回朝夕食直前に | 5 | 分包装剤にて |
| 67 | 23:抗菌薬 | 14~16Kg | クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤) | 2.02001 | g | 1:内服 | 34:1日2回朝夕食直前に | 5 | 分包装剤にて |
| 68 | 23:抗菌薬 | 16~18Kg | クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤) | 3.03001 | g | 1:内服 | 34:1日2回朝夕食直前に | 5 | 分包装剤にて |
| 69 | 23:抗菌薬 | 18~20Kg | クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤) | 3.03001 | g | 1:内服 | 34:1日2回朝夕食直前に | 5 | 分包装剤にて |
| 70 | 23:抗菌薬 | 20~23Kg | クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤) | 3.03001 | g | 1:内服 | 34:1日2回朝夕食直前に | 5 | 分包装剤にて |
| 71 | 23:抗菌薬 | 23~26Kg | クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤) | 4.04002 | g | 1:内服 | 34:1日2回朝夕食直前に | 5 | 分包装剤にて |
| 72 | 23:抗菌薬 | 26~30Kg | クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤) | 4.04002 | g | 1:内服 | 34:1日2回朝夕食直前に | 5 | 分包装剤にて |
| 73 | 23:抗菌薬 | 30~35Kg | クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤) | 5.05002 | g | 1:内服 | 34:1日2回朝夕食直前に | 5 | 分包装剤にて |
| 74 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤) | 6.06002 | g | 1:内服 | 34:1日2回朝夕食直前に | 5 | 分包装剤にて |
| 75 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg (分包装剤) | 0.00000 | g | 1:内服 | 34:1日2回朝夕食直前に | 5 | 分包装剤にて |
| 76 | 23:抗菌薬 | ~4Kg | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 0.30000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 77 | 23:抗菌薬 | 4~6Kg | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 0.40000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 78 | 23:抗菌薬 | 6~8Kg | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 0.60000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 79 | 23:抗菌薬 | 8~10Kg | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 0.80000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 80 | 23:抗菌薬 | 10~12Kg | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 1.00000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 81 | 23:抗菌薬 | 12~14Kg | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 1.20000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 82 | 23:抗菌薬 | 14~16Kg | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 1.40000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 83 | 23:抗菌薬 | 16~18Kg | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 1.60000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 84 | 23:抗菌薬 | 18~20Kg | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 1.80000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 85 | 23:抗菌薬 | 20~23Kg | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 2.00000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 86 | 23:抗菌薬 | 23~26Kg | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 2.30000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |

■抗菌薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

| 処方オーダー画面での選択肢 | | | 選択した症状、薬剤から表示される処方内容 | | | | | |
|---------------|-----------------|---------|--------------------------|---------|------|------|--------------|------|
| 症状 | 処方分類 (年齢/体重) | 薬剤名 | 薬剤量 | 単位 | 処方区分 | 用法 | 日数 /回数 | コメント |
| 87 | 23:抗菌薬 | 26~30Kg | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 2.60000 | g | 1:内服 | 1: 1日3回毎食後に | 5 |
| 88 | 23:抗菌薬 | 30~35Kg | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 3.00000 | g | 1:内服 | 1: 1日3回毎食後に | 5 |
| 89 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 3.00000 | g | 1:内服 | 1: 1日3回毎食後に | 5 |
| 90 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg | 3.00000 | g | 1:内服 | 1: 1日3回毎食後に | 5 |
| 91 | 23:抗菌薬 | ~4Kg | クラリス錠 200 200mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 92 | 23:抗菌薬 | 4~6Kg | クラリス錠 200 200mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 93 | 23:抗菌薬 | 6~8Kg | クラリス錠 200 200mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 94 | 23:抗菌薬 | 8~10Kg | クラリス錠 200 200mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 95 | 23:抗菌薬 | 10~12Kg | クラリス錠 200 200mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 96 | 23:抗菌薬 | 12~14Kg | クラリス錠 200 200mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 97 | 23:抗菌薬 | 14~16Kg | クラリス錠 200 200mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 98 | 23:抗菌薬 | 16~18Kg | クラリス錠 200 200mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 99 | 23:抗菌薬 | 18~20Kg | クラリス錠 200 200mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 100 | 23:抗菌薬 | 20~23Kg | クラリス錠 200 200mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 101 | 23:抗菌薬 | 23~26Kg | クラリス錠 200 200mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 102 | 23:抗菌薬 | 26~30Kg | クラリス錠 200 200mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 103 | 23:抗菌薬 | 30~35Kg | クラリス錠 200 200mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 104 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | クラリス錠 200 200mg | 2.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 105 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | クラリス錠 200 200mg | 2.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 106 | 23:抗菌薬 | ~4Kg | クラリス錠 50小児用 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 107 | 23:抗菌薬 | 4~6Kg | クラリス錠 50小児用 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 108 | 23:抗菌薬 | 6~8Kg | クラリス錠 50小児用 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 109 | 23:抗菌薬 | 8~10Kg | クラリス錠 50小児用 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 110 | 23:抗菌薬 | 10~12Kg | クラリス錠 50小児用 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 111 | 23:抗菌薬 | 12~14Kg | クラリス錠 50小児用 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 112 | 23:抗菌薬 | 14~16Kg | クラリス錠 50小児用 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 113 | 23:抗菌薬 | 16~18Kg | クラリス錠 50小児用 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 114 | 23:抗菌薬 | 18~20Kg | クラリス錠 50小児用 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 115 | 23:抗菌薬 | 20~23Kg | クラリス錠 50小児用 50mg | 4.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 116 | 23:抗菌薬 | 23~26Kg | クラリス錠 50小児用 50mg | 4.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 117 | 23:抗菌薬 | 26~30Kg | クラリス錠 50小児用 50mg | 4.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 118 | 23:抗菌薬 | 30~35Kg | クラリス錠 50小児用 50mg | 4.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 119 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | クラリス錠 50小児用 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 120 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | クラリス錠 50小児用 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 2: 1日2回朝夕食後に | 5 |
| 121 | 23:抗菌薬 | ~4Kg | ケフラルカプセル 250mg | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1日3回毎食後に | 5 |
| 122 | 23:抗菌薬 | 4~6Kg | ケフラルカプセル 250mg | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1日3回毎食後に | 5 |
| 123 | 23:抗菌薬 | 6~8Kg | ケフラルカプセル 250mg | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1日3回毎食後に | 5 |
| 124 | 23:抗菌薬 | 8~10Kg | ケフラルカプセル 250mg | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1日3回毎食後に | 5 |
| 125 | 23:抗菌薬 | 10~12Kg | ケフラルカプセル 250mg | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1日3回毎食後に | 5 |
| 126 | 23:抗菌薬 | 12~14Kg | ケフラルカプセル 250mg | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1日3回毎食後に | 5 |
| 127 | 23:抗菌薬 | 14~16Kg | ケフラルカプセル 250mg | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1日3回毎食後に | 5 |
| 128 | 23:抗菌薬 | 16~18Kg | ケフラルカプセル 250mg | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1日3回毎食後に | 5 |
| 129 | 23:抗菌薬 | 18~20Kg | ケフラルカプセル 250mg | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1日3回毎食後に | 5 |

■抗菌薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

| 処方オーダー画面での選択肢 | | | | 選択した症状、薬剤から表示される処方内容 | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|-----------------------|----------------------|------|------|----------------|-----------|---------|
| | 症状 | 処方分類 (年齢/体重) | 薬剤名 | 薬剤量 | 単位 | 処方区分 | 用法 | 日数 /回数 | コメント |
| 130 | 23:抗菌薬 | 20~23Kg | ケフラルカプセル 2 5 0 mg | 3.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 131 | 23:抗菌薬 | 23~26Kg | ケフラルカプセル 2 5 0 mg | 3.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 132 | 23:抗菌薬 | 26~30Kg | ケフラルカプセル 2 5 0 mg | 3.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 133 | 23:抗菌薬 | 30~35Kg | ケフラルカプセル 2 5 0 mg | 3.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 134 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | ケフラルカプセル 2 5 0 mg | 3.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 135 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | ケフラルカプセル 2 5 0 mg | 3.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 136 | 23:抗菌薬 | ~4Kg | ケフラル細粒小児用 1 0 0 mg | 0.90000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 137 | 23:抗菌薬 | 4~6Kg | ケフラル細粒小児用 1 0 0 mg | 1.20000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 138 | 23:抗菌薬 | 6~8Kg | ケフラル細粒小児用 1 0 0 mg | 1.80000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 139 | 23:抗菌薬 | 8~10Kg | ケフラル細粒小児用 1 0 0 mg | 2.40000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 140 | 23:抗菌薬 | 10~12Kg | ケフラル細粒小児用 1 0 0 mg | 3.00000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 141 | 23:抗菌薬 | 12~14Kg | ケフラル細粒小児用 1 0 0 mg | 3.60000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 142 | 23:抗菌薬 | 14~16Kg | ケフラル細粒小児用 1 0 0 mg | 4.20000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 143 | 23:抗菌薬 | 16~18Kg | ケフラル細粒小児用 1 0 0 mg | 4.80000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 144 | 23:抗菌薬 | 18~20Kg | ケフラル細粒小児用 1 0 0 mg | 5.40000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 145 | 23:抗菌薬 | 20~23Kg | ケフラル細粒小児用 1 0 0 mg | 6.00000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 146 | 23:抗菌薬 | 23~26Kg | ケフラル細粒小児用 1 0 0 mg | 6.90000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 147 | 23:抗菌薬 | 26~30Kg | ケフラル細粒小児用 1 0 0 mg | 7.50000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 148 | 23:抗菌薬 | 30~35Kg | ケフラル細粒小児用 1 0 0 mg | 7.50000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 149 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | ケフラル細粒小児用 1 0 0 mg | 7.50000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 150 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | ケフラル細粒小児用 1 0 0 mg | 7.50000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 151 | 23:抗菌薬 | ~4Kg | サワシリン錠 2 5 0 2 5 0 mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 152 | 23:抗菌薬 | 4~6Kg | サワシリン錠 2 5 0 2 5 0 mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 153 | 23:抗菌薬 | 6~8Kg | サワシリン錠 2 5 0 2 5 0 mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 154 | 23:抗菌薬 | 8~10Kg | サワシリン錠 2 5 0 2 5 0 mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 155 | 23:抗菌薬 | 10~12Kg | サワシリン錠 2 5 0 2 5 0 mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 156 | 23:抗菌薬 | 12~14Kg | サワシリン錠 2 5 0 2 5 0 mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 157 | 23:抗菌薬 | 14~16Kg | サワシリン錠 2 5 0 2 5 0 mg | 3.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 158 | 23:抗菌薬 | 16~18Kg | サワシリン錠 2 5 0 2 5 0 mg | 3.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 159 | 23:抗菌薬 | 18~20Kg | サワシリン錠 2 5 0 2 5 0 mg | 3.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 160 | 23:抗菌薬 | 20~23Kg | サワシリン錠 2 5 0 2 5 0 mg | 3.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 161 | 23:抗菌薬 | 23~26Kg | サワシリン錠 2 5 0 2 5 0 mg | 3.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 162 | 23:抗菌薬 | 26~30Kg | サワシリン錠 2 5 0 2 5 0 mg | 3.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 163 | 23:抗菌薬 | 30~35Kg | サワシリン錠 2 5 0 2 5 0 mg | 3.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 164 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | サワシリン錠 2 5 0 2 5 0 mg | 3.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 165 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | サワシリン錠 2 5 0 2 5 0 mg | 3.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 166 | 23:抗菌薬 | ~4Kg | ジスロマック錠 2 5 0 mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40: 1 日 1 回 | 3 | 処方後内服開始 |
| 167 | 23:抗菌薬 | 4~6Kg | ジスロマック錠 2 5 0 mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40: 1 日 1 回 | 3 | 処方後内服開始 |
| 168 | 23:抗菌薬 | 6~8Kg | ジスロマック錠 2 5 0 mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40: 1 日 1 回 | 3 | 処方後内服開始 |
| 169 | 23:抗菌薬 | 8~10Kg | ジスロマック錠 2 5 0 mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40: 1 日 1 回 | 3 | 処方後内服開始 |
| 170 | 23:抗菌薬 | 10~12Kg | ジスロマック錠 2 5 0 mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40: 1 日 1 回 | 3 | 処方後内服開始 |
| 171 | 23:抗菌薬 | 12~14Kg | ジスロマック錠 2 5 0 mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40: 1 日 1 回 | 3 | 処方後内服開始 |
| 172 | 23:抗菌薬 | 14~16Kg | ジスロマック錠 2 5 0 mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40: 1 日 1 回 | 3 | 処方後内服開始 |

■抗菌薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

| 処方オーダー画面での選択肢 | | | | 選択した症状、薬剤から表示される処方内容 | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|---------------------------|----------------------|------|------|----------------|-----------|---------|
| | 症状 | 処方分類 (年齢/体重) | 薬剤名 | 薬剤量 | 単位 | 処方区分 | 用法 | 日数 /回数 | コメント |
| 173 | 23:抗菌薬 | 16~18Kg | ジスロマック錠 2 5 0 m g | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40: 1 日 1 回 | 3 | 処方後内服開始 |
| 174 | 23:抗菌薬 | 18~20Kg | ジスロマック錠 2 5 0 m g | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40: 1 日 1 回 | 3 | 処方後内服開始 |
| 175 | 23:抗菌薬 | 20~23Kg | ジスロマック錠 2 5 0 m g | 1.00000 | 錠 | 1:内服 | 40: 1 日 1 回 | 3 | 処方後内服開始 |
| 176 | 23:抗菌薬 | 23~26Kg | ジスロマック錠 2 5 0 m g | 1.00000 | 錠 | 1:内服 | 40: 1 日 1 回 | 3 | 処方後内服開始 |
| 177 | 23:抗菌薬 | 26~30Kg | ジスロマック錠 2 5 0 m g | 1.00000 | 錠 | 1:内服 | 40: 1 日 1 回 | 3 | 処方後内服開始 |
| 178 | 23:抗菌薬 | 30~35Kg | ジスロマック錠 2 5 0 m g | 1.00000 | 錠 | 1:内服 | 40: 1 日 1 回 | 3 | 処方後内服開始 |
| 179 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | ジスロマック錠 2 5 0 m g | 1.00000 | 錠 | 1:内服 | 40: 1 日 1 回 | 3 | 処方後内服開始 |
| 180 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | ジスロマック錠 2 5 0 m g | 2.00000 | 錠 | 1:内服 | 40: 1 日 1 回 | 3 | 処方後内服開始 |
| 181 | 23:抗菌薬 | ~4Kg | セフゾンカプセル 1 0 0 m g | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 182 | 23:抗菌薬 | 4~6Kg | セフゾンカプセル 1 0 0 m g | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 183 | 23:抗菌薬 | 6~8Kg | セフゾンカプセル 1 0 0 m g | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 184 | 23:抗菌薬 | 8~10Kg | セフゾンカプセル 1 0 0 m g | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 185 | 23:抗菌薬 | 10~12Kg | セフゾンカプセル 1 0 0 m g | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 186 | 23:抗菌薬 | 12~14Kg | セフゾンカプセル 1 0 0 m g | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 187 | 23:抗菌薬 | 14~16Kg | セフゾンカプセル 1 0 0 m g | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 188 | 23:抗菌薬 | 16~18Kg | セフゾンカプセル 1 0 0 m g | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 189 | 23:抗菌薬 | 18~20Kg | セフゾンカプセル 1 0 0 m g | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 190 | 23:抗菌薬 | 20~23Kg | セフゾンカプセル 1 0 0 m g | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 191 | 23:抗菌薬 | 23~26Kg | セフゾンカプセル 1 0 0 m g | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 192 | 23:抗菌薬 | 26~30Kg | セフゾンカプセル 1 0 0 m g | 0.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 193 | 23:抗菌薬 | 30~35Kg | セフゾンカプセル 1 0 0 m g | 3.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 194 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | セフゾンカプセル 1 0 0 m g | 3.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 195 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | セフゾンカプセル 1 0 0 m g | 3.00000 | カプセル | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 196 | 23:抗菌薬 | ~4Kg | セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g | 0.30000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 197 | 23:抗菌薬 | 4~6Kg | セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g | 0.40000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 198 | 23:抗菌薬 | 6~8Kg | セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g | 0.60000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 199 | 23:抗菌薬 | 8~10Kg | セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g | 0.80000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 200 | 23:抗菌薬 | 10~12Kg | セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g | 1.00000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 201 | 23:抗菌薬 | 12~14Kg | セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g | 1.20000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 202 | 23:抗菌薬 | 14~16Kg | セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g | 1.40000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 203 | 23:抗菌薬 | 16~18Kg | セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g | 1.60000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 204 | 23:抗菌薬 | 18~20Kg | セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g | 1.80000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 205 | 23:抗菌薬 | 20~23Kg | セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g | 2.00000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 206 | 23:抗菌薬 | 23~26Kg | セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g | 2.30000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 207 | 23:抗菌薬 | 26~30Kg | セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g | 2.60000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 208 | 23:抗菌薬 | 30~35Kg | セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g | 3.00000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 209 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g | 3.00000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 210 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | セフゾン細粒小児用 1 0 % 1 0 0 m g | 3.00000 | g | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 211 | 23:抗菌薬 | ~4Kg | フロモックス錠 1 0 0 m g | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 212 | 23:抗菌薬 | 4~6Kg | フロモックス錠 1 0 0 m g | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 213 | 23:抗菌薬 | 6~8Kg | フロモックス錠 1 0 0 m g | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 214 | 23:抗菌薬 | 8~10Kg | フロモックス錠 1 0 0 m g | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |
| 215 | 23:抗菌薬 | 10~12Kg | フロモックス錠 1 0 0 m g | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1: 1 日 3 回毎食後に | 5 | |

■抗菌薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

| 処方オーダー画面での選択肢 | | | 選択した症状、薬剤から表示される処方内容 | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------|------------------------|---------|------|------|------------|------|---------|
| 症状 | 処方分類 (年齢/体重) | 薬剤名 | 薬剤量 | 単位 | 処方区分 | 用法 | 日数 /回数 | コメント | |
| 216 | 23:抗菌薬 | 12~14Kg | フロモックス錠 100mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 217 | 23:抗菌薬 | 14~16Kg | フロモックス錠 100mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 218 | 23:抗菌薬 | 16~18Kg | フロモックス錠 100mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 219 | 23:抗菌薬 | 18~20Kg | フロモックス錠 100mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 220 | 23:抗菌薬 | 20~23Kg | フロモックス錠 100mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 221 | 23:抗菌薬 | 23~26Kg | フロモックス錠 100mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 222 | 23:抗菌薬 | 26~30Kg | フロモックス錠 100mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 223 | 23:抗菌薬 | 30~35Kg | フロモックス錠 100mg | 3.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 224 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | フロモックス錠 100mg | 3.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 225 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | フロモックス錠 100mg | 3.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 226 | 23:抗菌薬 | ~4Kg | フロモックス錠 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 227 | 23:抗菌薬 | 4~6Kg | フロモックス錠 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 228 | 23:抗菌薬 | 6~8Kg | フロモックス錠 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 229 | 23:抗菌薬 | 8~10Kg | フロモックス錠 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 230 | 23:抗菌薬 | 10~12Kg | フロモックス錠 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 231 | 23:抗菌薬 | 12~14Kg | フロモックス錠 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 232 | 23:抗菌薬 | 14~16Kg | フロモックス錠 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 233 | 23:抗菌薬 | 16~18Kg | フロモックス錠 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 234 | 23:抗菌薬 | 18~20Kg | フロモックス錠 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 235 | 23:抗菌薬 | 20~23Kg | フロモックス錠 75mg | 3.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 236 | 23:抗菌薬 | 23~26Kg | フロモックス錠 75mg | 3.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 237 | 23:抗菌薬 | 26~30Kg | フロモックス錠 75mg | 3.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 238 | 23:抗菌薬 | 30~35Kg | フロモックス錠 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 239 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | フロモックス錠 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 240 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | フロモックス錠 75mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 241 | 23:抗菌薬 | ~4Kg | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「トロー」 | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 242 | 23:抗菌薬 | 4~6Kg | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「トロー」 | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 243 | 23:抗菌薬 | 6~8Kg | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「トロー」 | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 244 | 23:抗菌薬 | 8~10Kg | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「トロー」 | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 245 | 23:抗菌薬 | 10~12Kg | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「トロー」 | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 246 | 23:抗菌薬 | 12~14Kg | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「トロー」 | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 247 | 23:抗菌薬 | 14~16Kg | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「トロー」 | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 248 | 23:抗菌薬 | 16~18Kg | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「トロー」 | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 249 | 23:抗菌薬 | 18~20Kg | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「トロー」 | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 250 | 23:抗菌薬 | 20~23Kg | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「トロー」 | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 251 | 23:抗菌薬 | 23~26Kg | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「トロー」 | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 252 | 23:抗菌薬 | 26~30Kg | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「トロー」 | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 253 | 23:抗菌薬 | 30~35Kg | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「トロー」 | 1.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 254 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「トロー」 | 1.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 255 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「トロー」 | 1.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 256 | 23:抗菌薬 | ~4Kg | ミノマイシン錠 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 257 | 23:抗菌薬 | 4~6Kg | ミノマイシン錠 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 258 | 23:抗菌薬 | 6~8Kg | ミノマイシン錠 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |

■抗菌薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

| 処方オーダー画面での選択肢 | | | | 選択した症状、薬剤から表示される処方内容 | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|------------------------|----------------------|----|------|------------|-----------|---------|
| | 症状 | 処方分類 (年齢/体重) | 薬剤名 | 薬剤量 | 単位 | 処方区分 | 用法 | 日数 /回数 | コメント |
| 259 | 23:抗菌薬 | 8~10Kg | ミノマイシン錠 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 260 | 23:抗菌薬 | 10~12Kg | ミノマイシン錠 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 261 | 23:抗菌薬 | 12~14Kg | ミノマイシン錠 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 262 | 23:抗菌薬 | 14~16Kg | ミノマイシン錠 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 263 | 23:抗菌薬 | 16~18Kg | ミノマイシン錠 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 264 | 23:抗菌薬 | 18~20Kg | ミノマイシン錠 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 265 | 23:抗菌薬 | 20~23Kg | ミノマイシン錠 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 266 | 23:抗菌薬 | 23~26Kg | ミノマイシン錠 50mg | 1.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 267 | 23:抗菌薬 | 26~30Kg | ミノマイシン錠 50mg | 1.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 268 | 23:抗菌薬 | 30~35Kg | ミノマイシン錠 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 269 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | ミノマイシン錠 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 270 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | ミノマイシン錠 50mg | 0.00000 | 錠 | 1:内服 | 40:1日1回 | 5 | 処方後内服開始 |
| 271 | 23:抗菌薬 | ~4Kg | メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg | 0.27000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 272 | 23:抗菌薬 | 4~6Kg | メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg | 0.36000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 273 | 23:抗菌薬 | 6~8Kg | メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg | 0.54000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 274 | 23:抗菌薬 | 8~10Kg | メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg | 0.72000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 275 | 23:抗菌薬 | 10~12Kg | メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg | 0.90000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 276 | 23:抗菌薬 | 12~14Kg | メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg | 1.08000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 277 | 23:抗菌薬 | 14~16Kg | メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg | 1.26000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 278 | 23:抗菌薬 | 16~18Kg | メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg | 1.44000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 279 | 23:抗菌薬 | 18~20Kg | メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg | 1.62000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 280 | 23:抗菌薬 | 20~23Kg | メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg | 1.80000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 281 | 23:抗菌薬 | 23~26Kg | メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg | 2.07000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 282 | 23:抗菌薬 | 26~30Kg | メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg | 2.34000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 283 | 23:抗菌薬 | 30~35Kg | メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg | 2.70000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 284 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg | 3.00000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 285 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | メイアクトMS小児用細粒 10% 100mg | 3.00000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 286 | 23:抗菌薬 | ~4Kg | ワイドシリン細粒 20% 200mg | 0.45000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 287 | 23:抗菌薬 | 4~6Kg | ワイドシリン細粒 20% 200mg | 0.60000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 288 | 23:抗菌薬 | 6~8Kg | ワイドシリン細粒 20% 200mg | 0.90000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 289 | 23:抗菌薬 | 8~10Kg | ワイドシリン細粒 20% 200mg | 1.20000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 290 | 23:抗菌薬 | 10~12Kg | ワイドシリン細粒 20% 200mg | 1.50000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 291 | 23:抗菌薬 | 12~14Kg | ワイドシリン細粒 20% 200mg | 1.80000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 292 | 23:抗菌薬 | 14~16Kg | ワイドシリン細粒 20% 200mg | 2.10000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 293 | 23:抗菌薬 | 16~18Kg | ワイドシリン細粒 20% 200mg | 2.40000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 294 | 23:抗菌薬 | 18~20Kg | ワイドシリン細粒 20% 200mg | 2.70000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 295 | 23:抗菌薬 | 20~23Kg | ワイドシリン細粒 20% 200mg | 3.00000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 296 | 23:抗菌薬 | 23~26Kg | ワイドシリン細粒 20% 200mg | 3.45000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 297 | 23:抗菌薬 | 26~30Kg | ワイドシリン細粒 20% 200mg | 3.75000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 298 | 23:抗菌薬 | 30~35Kg | ワイドシリン細粒 20% 200mg | 3.75000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 299 | 23:抗菌薬 | 35~40Kg | ワイドシリン細粒 20% 200mg | 3.75000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |
| 300 | 23:抗菌薬 | 40Kg~ | ワイドシリン細粒 20% 200mg | 3.75000 | g | 1:内服 | 1:1日3回毎食後に | 5 | |