

■グループ症候群選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
87	24:グループ症候群	26~30Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 m g	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
88	24:グループ症候群	30~35Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 m g	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
89	24:グループ症候群	35~40Kg	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 m g	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
90	24:グループ症候群	40Kg~	カロナール錠 3 0 0 3 0 0 m g	1.00000	錠	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
91	24:グループ症候群	~4Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
92	24:グループ症候群	4~6Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
93	24:グループ症候群	6~8Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.20000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
94	24:グループ症候群	8~10Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.25000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
95	24:グループ症候群	10~12Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.30000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
96	24:グループ症候群	12~14Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.35000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
97	24:グループ症候群	14~16Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.40000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
98	24:グループ症候群	16~18Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.45000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
99	24:グループ症候群	18~20Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.50000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
100	24:グループ症候群	20~23Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.60000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
101	24:グループ症候群	23~26Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.65000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
102	24:グループ症候群	26~30Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.75000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
103	24:グループ症候群	30~35Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	0.90000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
104	24:グループ症候群	35~40Kg	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
105	24:グループ症候群	40Kg~	コカールDS 4 0 0%(カロナール)	1.00000	g	2:頓服	5:医師の指示通りに	5	38.5度以上、痛みが強い時、1日3回まで、8時間以上あけて
106	24:グループ症候群	~4Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1 %	6.00000	m L	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
107	24:グループ症候群	4~6Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1 %	6.00000	m L	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
108	24:グループ症候群	6~8Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1 %	9.00000	m L	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
109	24:グループ症候群	8~10Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1 %	12.00000	m L	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
110	24:グループ症候群	10~12Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1 %	15.00000	m L	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
111	24:グループ症候群	12~14Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1 %	18.00000	m L	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
112	24:グループ症候群	14~16Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1 %	21.00000	m L	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
113	24:グループ症候群	16~18Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1 %	24.00000	m L	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
114	24:グループ症候群	18~20Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1 %	27.00000	m L	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
115	24:グループ症候群	20~23Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1 %	30.00000	m L	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
116	24:グループ症候群	23~26Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1 %	30.00000	m L	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
117	24:グループ症候群	26~30Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1 %	30.00000	m L	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
118	24:グループ症候群	30~35Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1 %	30.00000	m L	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
119	24:グループ症候群	35~40Kg	デカドロンエリキシル 0. 0 1 %	30.00000	m L	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
120	24:グループ症候群	40Kg~	デカドロンエリキシル 0. 0 1 %	30.00000	m L	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
121	24:グループ症候群	~4Kg	デカドロン錠 0. 5 m g	0.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
122	24:グループ症候群	4~6Kg	デカドロン錠 0. 5 m g	0.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
123	24:グループ症候群	6~8Kg	デカドロン錠 0. 5 m g	0.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
124	24:グループ症候群	8~10Kg	デカドロン錠 0. 5 m g	0.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
125	24:グループ症候群	10~12Kg	デカドロン錠 0. 5 m g	0.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
126	24:グループ症候群	12~14Kg	デカドロン錠 0. 5 m g	0.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
127	24:グループ症候群	14~16Kg	デカドロン錠 0. 5 m g	4.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
128	24:グループ症候群	16~18Kg	デカドロン錠 0. 5 m g	5.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください
129	24:グループ症候群	18~20Kg	デカドロン錠 0. 5 m g	6.00000	錠	1:内服	40: 1 日 1 回	1	本日中にすべて飲みきってください

■クループ症候群選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
130	24:クループ症候群	20~23Kg	デカドロン錠 0.5mg	6.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	本日中にすべて飲みきってください
131	24:クループ症候群	23~26Kg	デカドロン錠 0.5mg	6.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	本日中にすべて飲みきってください
132	24:クループ症候群	26~30Kg	デカドロン錠 0.5mg	7.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	本日中にすべて飲みきってください
133	24:クループ症候群	30~35Kg	デカドロン錠 0.5mg	8.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	本日中にすべて飲みきってください
134	24:クループ症候群	35~40Kg	デカドロン錠 0.5mg	8.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	本日中にすべて飲みきってください
135	24:クループ症候群	40Kg~	デカドロン錠 0.5mg	8.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	本日中にすべて飲みきってください
136	24:クループ症候群	~4Kg	デカドロン錠 0.5mg (粉砕)	1.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	粉砕、本日中に服用ください
137	24:クループ症候群	4~6Kg	デカドロン錠 0.5mg (粉砕)	1.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	粉砕、本日中に服用ください
138	24:クループ症候群	6~8Kg	デカドロン錠 0.5mg (粉砕)	2.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	粉砕、本日中に服用ください
139	24:クループ症候群	8~10Kg	デカドロン錠 0.5mg (粉砕)	2.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	粉砕、本日中に服用ください
140	24:クループ症候群	10~12Kg	デカドロン錠 0.5mg (粉砕)	3.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	粉砕、本日中に服用ください
141	24:クループ症候群	12~14Kg	デカドロン錠 0.5mg (粉砕)	4.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	粉砕、本日中に服用ください
142	24:クループ症候群	14~16Kg	デカドロン錠 0.5mg (粉砕)	5.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	粉砕、本日中に服用ください
143	24:クループ症候群	16~18Kg	デカドロン錠 0.5mg (粉砕)	6.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	粉砕、本日中に服用ください
144	24:クループ症候群	18~20Kg	デカドロン錠 0.5mg (粉砕)	6.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	粉砕、本日中に服用ください
145	24:クループ症候群	20~23Kg	デカドロン錠 0.5mg (粉砕)	6.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	粉砕、本日中に服用ください
146	24:クループ症候群	23~26Kg	デカドロン錠 0.5mg (粉砕)	6.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	粉砕、本日中に服用ください
147	24:クループ症候群	26~30Kg	デカドロン錠 0.5mg (粉砕)	6.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	粉砕、本日中に服用ください
148	24:クループ症候群	30~35Kg	デカドロン錠 0.5mg (粉砕)	6.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	粉砕、本日中に服用ください
149	24:クループ症候群	35~40Kg	デカドロン錠 0.5mg (粉砕)	6.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	粉砕、本日中に服用ください
150	24:クループ症候群	40Kg~	デカドロン錠 0.5mg (粉砕)	6.00000	錠	1:内服	40:1日1回	1	粉砕、本日中に服用ください
151	24:クループ症候群	0ヶ月	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
152	24:クループ症候群	2ヶ月	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
153	24:クループ症候群	5ヶ月	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
154	24:クループ症候群	8ヶ月	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
155	24:クループ症候群	1~2歳	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
156	24:クループ症候群	3歳	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
157	24:クループ症候群	4歳	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
158	24:クループ症候群	5歳	ムコソルバン錠 1.5mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
159	24:クループ症候群	6歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
160	24:クループ症候群	7歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
161	24:クループ症候群	8歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
162	24:クループ症候群	9歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
163	24:クループ症候群	10歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
164	24:クループ症候群	11歳	ムコソルバン錠 1.5mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	5	
165	24:クループ症候群	12歳~	ムコソルバン錠 1.5mg	3.00000	錠	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
166	24:クループ症候群	~4Kg	ムコダインD S 50%	0.20000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
167	24:クループ症候群	4~6Kg	ムコダインD S 50%	0.30000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
168	24:クループ症候群	6~8Kg	ムコダインD S 50%	0.40000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
169	24:クループ症候群	8~10Kg	ムコダインD S 50%	0.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
170	24:クループ症候群	10~12Kg	ムコダインD S 50%	0.60000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
171	24:クループ症候群	12~14Kg	ムコダインD S 50%	0.70000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	
172	24:クループ症候群	14~16Kg	ムコダインD S 50%	0.80000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5	

■グループ症候群選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
173	24:グループ症候群	16~18Kg	ムコダインD S 5 0%	0.90000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
174	24:グループ症候群	18~20Kg	ムコダインD S 5 0%	1.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
175	24:グループ症候群	20~23Kg	ムコダインD S 5 0%	1.20000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
176	24:グループ症候群	23~26Kg	ムコダインD S 5 0%	1.20000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
177	24:グループ症候群	26~30Kg	ムコダインD S 5 0%	1.40000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
178	24:グループ症候群	30~35Kg	ムコダインD S 5 0%	1.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
179	24:グループ症候群	35~40Kg	ムコダインD S 5 0%	1.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
180	24:グループ症候群	40Kg~	ムコダインD S 5 0%	1.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
181	24:グループ症候群	~4Kg	ムコダインシロップ5%	2.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
182	24:グループ症候群	4~6Kg	ムコダインシロップ5%	3.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
183	24:グループ症候群	6~8Kg	ムコダインシロップ5%	4.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
184	24:グループ症候群	8~10Kg	ムコダインシロップ5%	5.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
185	24:グループ症候群	10~12Kg	ムコダインシロップ5%	6.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
186	24:グループ症候群	12~14Kg	ムコダインシロップ5%	7.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
187	24:グループ症候群	14~16Kg	ムコダインシロップ5%	8.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
188	24:グループ症候群	16~18Kg	ムコダインシロップ5%	9.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
189	24:グループ症候群	18~20Kg	ムコダインシロップ5%	10.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
190	24:グループ症候群	20~23Kg	ムコダインシロップ5%	10.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
191	24:グループ症候群	23~26Kg	ムコダインシロップ5%	12.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
192	24:グループ症候群	26~30Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
193	24:グループ症候群	30~35Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
194	24:グループ症候群	35~40Kg	ムコダインシロップ5%	14.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
195	24:グループ症候群	40Kg~	ムコダインシロップ5%	15.00000	m L	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
196	24:グループ症候群	0ヶ月	ムコダイン錠 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
197	24:グループ症候群	2ヶ月	ムコダイン錠 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
198	24:グループ症候群	5ヶ月	ムコダイン錠 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
199	24:グループ症候群	8ヶ月	ムコダイン錠 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
200	24:グループ症候群	1~2歳	ムコダイン錠 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
201	24:グループ症候群	3歳	ムコダイン錠 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
202	24:グループ症候群	4歳	ムコダイン錠 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
203	24:グループ症候群	5歳	ムコダイン錠 2 5 0 m g	0.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
204	24:グループ症候群	6歳	ムコダイン錠 2 5 0 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
205	24:グループ症候群	7歳	ムコダイン錠 2 5 0 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
206	24:グループ症候群	8歳	ムコダイン錠 2 5 0 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
207	24:グループ症候群	9歳	ムコダイン錠 2 5 0 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
208	24:グループ症候群	10歳	ムコダイン錠 2 5 0 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
209	24:グループ症候群	11歳	ムコダイン錠 2 5 0 m g	2.00000	錠	1:内服	2: 1日 2回朝夕食後に	5
210	24:グループ症候群	12歳~	ムコダイン錠 2 5 0 m g	3.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
211	24:グループ症候群	~4Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
212	24:グループ症候群	4~6Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
213	24:グループ症候群	6~8Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
214	24:グループ症候群	8~10Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
215	24:グループ症候群	10~12Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5

■グループ症候群選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
216	24:グループ症候群	12~14Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
217	24:グループ症候群	14~16Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
218	24:グループ症候群	16~18Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
219	24:グループ症候群	18~20Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
220	24:グループ症候群	20~23Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
221	24:グループ症候群	23~26Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
222	24:グループ症候群	26~30Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
223	24:グループ症候群	30~35Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
224	24:グループ症候群	35~40Kg	ムコダイン錠 5 0 0 m g	0.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
225	24:グループ症候群	40Kg~	ムコダイン錠 5 0 0 m g	3.00000	錠	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
226	24:グループ症候群	~4Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.10000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
227	24:グループ症候群	4~6Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.25000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
228	24:グループ症候群	6~8Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.30000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
229	24:グループ症候群	8~10Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.45000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
230	24:グループ症候群	10~12Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.60000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
231	24:グループ症候群	12~14Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.70000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
232	24:グループ症候群	14~16Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
233	24:グループ症候群	16~18Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	0.90000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
234	24:グループ症候群	18~20Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	1.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
235	24:グループ症候群	20~23Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
236	24:グループ症候群	23~26Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	1.20000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
237	24:グループ症候群	26~30Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	1.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
238	24:グループ症候群	30~35Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	1.80000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
239	24:グループ症候群	35~40Kg	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	2.00000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
240	24:グループ症候群	40Kg~	小児用ムコソルバンD S 1 . 5 %	2.40000	g	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
241	24:グループ症候群	~4Kg	小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	0.50000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
242	24:グループ症候群	4~6Kg	小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	1.20000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
243	24:グループ症候群	6~8Kg	小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	1.50000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
244	24:グループ症候群	8~10Kg	小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	2.50000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
245	24:グループ症候群	10~12Kg	小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	3.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
246	24:グループ症候群	12~14Kg	小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	3.50000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
247	24:グループ症候群	14~16Kg	小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	4.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
248	24:グループ症候群	16~18Kg	小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	4.50000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
249	24:グループ症候群	18~20Kg	小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	5.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
250	24:グループ症候群	20~23Kg	小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	6.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
251	24:グループ症候群	23~26Kg	小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	6.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
252	24:グループ症候群	26~30Kg	小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	7.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
253	24:グループ症候群	30~35Kg	小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	9.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
254	24:グループ症候群	35~40Kg	小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	10.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	
255	24:グループ症候群	40Kg~	小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	12.00000	m L	1:内服	1: 1 日 3 回毎食後に	5	