

■ 刺虫症選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から薬剤量を算出される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
1	25:刺虫症	~4Kg	アレジオンドライシロップ 1%	0.00000	g	1:内服	40:1日1回	5	
2	25:刺虫症	4~6Kg	アレジオンドライシロップ 1%	0.00000	g	1:内服	40:1日1回	5	
3	25:刺虫症	6~8Kg	アレジオンドライシロップ 1%	0.00000	g	1:内服	40:1日1回	5	
4	25:刺虫症	8~10Kg	アレジオンドライシロップ 1%	0.00000	g	1:内服	40:1日1回	5	
5	25:刺虫症	10~12Kg	アレジオンドライシロップ 1%	0.50000	g	1:内服	40:1日1回	5	
6	25:刺虫症	12~14Kg	アレジオンドライシロップ 1%	0.60000	g	1:内服	40:1日1回	5	
7	25:刺虫症	14~16Kg	アレジオンドライシロップ 1%	0.70000	g	1:内服	40:1日1回	5	
8	25:刺虫症	16~18Kg	アレジオンドライシロップ 1%	0.80000	g	1:内服	40:1日1回	5	
9	25:刺虫症	18~20Kg	アレジオンドライシロップ 1%	0.90000	g	1:内服	40:1日1回	5	
10	25:刺虫症	20~23Kg	アレジオンドライシロップ 1%	1.00000	g	1:内服	40:1日1回	5	
11	25:刺虫症	23~26Kg	アレジオンドライシロップ 1%	1.10000	g	1:内服	40:1日1回	5	
12	25:刺虫症	26~30Kg	アレジオンドライシロップ 1%	1.30000	g	1:内服	40:1日1回	5	
13	25:刺虫症	30~35Kg	アレジオンドライシロップ 1%	1.50000	g	1:内服	40:1日1回	5	
14	25:刺虫症	35~40Kg	アレジオンドライシロップ 1%	1.70000	g	1:内服	40:1日1回	5	
15	25:刺虫症	40Kg~	アレジオンドライシロップ 1%	2.00000	g	1:内服	40:1日1回	5	
16	25:刺虫症	0ヶ月	アレジオン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
17	25:刺虫症	2ヶ月	アレジオン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
18	25:刺虫症	5ヶ月	アレジオン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
19	25:刺虫症	8ヶ月	アレジオン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
20	25:刺虫症	1~2歳	アレジオン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
21	25:刺虫症	3歳	アレジオン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
22	25:刺虫症	4歳	アレジオン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
23	25:刺虫症	5歳	アレジオン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
24	25:刺虫症	6歳	アレジオン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
25	25:刺虫症	7歳	アレジオン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
26	25:刺虫症	8歳	アレジオン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
27	25:刺虫症	9歳	アレジオン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
28	25:刺虫症	10歳	アレジオン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
29	25:刺虫症	11歳	アレジオン錠 10 10mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
30	25:刺虫症	12歳~	アレジオン錠 10 10mg	1.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
31	25:刺虫症	0ヶ月	アレジオン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
32	25:刺虫症	2ヶ月	アレジオン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
33	25:刺虫症	5ヶ月	アレジオン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
34	25:刺虫症	8ヶ月	アレジオン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
35	25:刺虫症	1~2歳	アレジオン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
36	25:刺虫症	3歳	アレジオン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
37	25:刺虫症	4歳	アレジオン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
38	25:刺虫症	5歳	アレジオン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
39	25:刺虫症	6歳	アレジオン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
40	25:刺虫症	7歳	アレジオン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
41	25:刺虫症	8歳	アレジオン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
42	25:刺虫症	9歳	アレジオン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
43	25:刺虫症	10歳	アレジオン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	

■ 刺虫症選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
44	25:刺虫症	11歳	アレジオン錠 20 20mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
45	25:刺虫症	12歳~	アレジオン錠 20 20mg	1.00000	錠	1:内服	40:1日1回	5	
46	25:刺虫症	~4Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
47	25:刺虫症	4~6Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
48	25:刺虫症	6~8Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
49	25:刺虫症	8~10Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
50	25:刺虫症	10~12Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
51	25:刺虫症	12~14Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
52	25:刺虫症	14~16Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
53	25:刺虫症	16~18Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
54	25:刺虫症	18~20Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
55	25:刺虫症	20~23Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
56	25:刺虫症	23~26Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
57	25:刺虫症	26~30Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
58	25:刺虫症	30~35Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
59	25:刺虫症	35~40Kg	リンデロン-V軟膏0.12%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
60	25:刺虫症	40Kg~	リンデロン-V軟膏0.12%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
61	25:刺虫症	~4Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
62	25:刺虫症	4~6Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
63	25:刺虫症	6~8Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
64	25:刺虫症	8~10Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
65	25:刺虫症	10~12Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
66	25:刺虫症	12~14Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
67	25:刺虫症	14~16Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
68	25:刺虫症	16~18Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
69	25:刺虫症	18~20Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
70	25:刺虫症	20~23Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
71	25:刺虫症	23~26Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
72	25:刺虫症	26~30Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
73	25:刺虫症	30~35Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
74	25:刺虫症	35~40Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
75	25:刺虫症	40Kg~	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
76	25:刺虫症	~4Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
77	25:刺虫症	4~6Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
78	25:刺虫症	6~8Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
79	25:刺虫症	8~10Kg	ロコイド軟膏0.1%	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
80	25:刺虫症	10~12Kg	ロコイド軟膏0.1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
81	25:刺虫症	12~14Kg	ロコイド軟膏0.1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
82	25:刺虫症	14~16Kg	ロコイド軟膏0.1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
83	25:刺虫症	16~18Kg	ロコイド軟膏0.1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
84	25:刺虫症	18~20Kg	ロコイド軟膏0.1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
85	25:刺虫症	20~23Kg	ロコイド軟膏0.1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
86	25:刺虫症	23~26Kg	ロコイド軟膏0.1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日

■ 刺虫症選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
87	25:刺虫症	26~30Kg	ロコイド軟膏0.1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
88	25:刺虫症	30~35Kg	ロコイド軟膏0.1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
89	25:刺虫症	35~40Kg	ロコイド軟膏0.1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日
90	25:刺虫症	40Kg~	ロコイド軟膏0.1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	虫刺され、赤いところ、3~4日